



Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición **2012**



USO DE ANTICONCEPTIVOS Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR ENTRE MUJERES ADOLESCENTES Y ADULTAS: CERRANDO LA BRECHA ENTRE METAS Y REALIDADES

**Aremis Villalobos,¹ Betania Allen,¹ María Hernández Serrato,²
Leticia Suárez,¹ Elvia De La Vara,¹ Filipa de Castro¹**

¹ Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública, México;

² Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, Instituto Nacional de Salud Pública, México

Noviembre, 2012



METAS 2008-2012:

- Aumentar para el 2012 la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos al **75%** en mujeres en edad fértil unidas
- Disminuir la brecha en población rural-urbana de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos para el 2012 en **cuatro puntos porcentuales**, con respecto a la brecha de **16.5%** estimada para el 2006
- Alcanzar el **70%** de cobertura nacional en anticoncepción post evento obstétrico en los hospitales que atienden la mayor parte de los eventos obstétricos



Inicio de vida sexual


En 2006, 20.9% de las mujeres (15-19 años) había iniciado vida sexual

En 2012:  31.2%

En 2012: el 18.4% de las mujeres (15-19 años) con inicio de vida sexual eran solteras al momento de la encuesta



Porcentaje de mujeres con inicio de vida sexual y edad mediana






Conocimiento sobre uso del condón por adolescentes

Más de 82% de las mujeres adolescentes tienen conocimientos básicos* sobre el uso del condón.




Porcentaje de uso de condón en la última relación sexual.
Mujeres adolescentes 15-19 años. ENSANUT



*Incluye que sólo se puede usar una vez (86.8%) y que protege de ITS y embarazo (82%)




Uso del condón en la última relación sexual por adolescentes 15-19 años por región de residencia, 2006-2012. ENSANUT 2006 y 2012






Uso de métodos anticonceptivos en la última relación sexual por grupo de edad. Mujeres.






Uso de métodos anticonceptivos en la última relación sexual por grupo de edad. Mujeres.






Uso de métodos anticonceptivos en la última relación sexual por grupo de edad. Mujeres.






Uso de algún método anticonceptivo en la última relación sexual por región de residencia, ENSANUT 2012



*Área Metropolitana (100,000 habitantes), área urbana 2,500 habitantes o más, rural menos de 2,500 hab.



Distribución porcentual de uso de método anticonceptivo posterior al evento obstétrico. Mujeres ENSANUT 2012



Adolescentes: 48%

Adultas: 57.2%



Conclusiones

- Aumento de inicio de vida sexual entre adolescentes (15 a 19 años)
- Incremento de métodos anticonceptivos de barrera, uso del condón en la última relación sexual en adolescentes (15 a 19 años)
- Más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva (35-49 años) no utilizan ningún método anticonceptivo
- No se ha alcanzado la meta de cobertura de anticonceptivos post-evento obstétrico
- La brecha en el uso de métodos anticonceptivos entre rural y urbana es menor al 12 puntos porcentuales



Recomendaciones

- Fortalecer campañas, acceso y uso adecuado en métodos anticonceptivos, no sólo el condón
- Monitorear y ofrecer incentivos para la promoción y entrega de anticoncepción post-evento obstétrico
- Incorporar perspectiva de género en las políticas públicas