

Encuesta Nacional de Salud • 2000

1.

Vivienda, población
y utilización de servicios de salud



INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD PÚBLICA






INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD PÚBLICA



Encuesta Nacional de Salud • 2000

Vivienda, población y utilización
de servicios de salud



Encuesta Nacional de Salud • 2000

1.

Vivienda, población y utilización de servicios de salud

Editor General

Jaime Sepúlveda

Editores del Tomo I

José Luis Valdespino · Gustavo Olaiz · María de la Paz López

Laura Mendoza · Oswaldo Palma · Oscar Velázquez

Roberto Tapia · Jaime Sepúlveda



INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD PÚBLICA



Encuesta Nacional de Salud 2000

I. Vivienda, población y utilización de servicios de salud

Primera edición, 2003

Dirección Editorial

Carlos Oropeza Abúndez

Edición y Producción

Samuel Rivero Vázquez

Coordinador

Edición: Alonso Restrepo Restrepo; *Producción:* Liliana Rojas Trejo, Juan Pablo Luna Ramírez, Erika López Mata, Petra Montiel Martínez, Zandra Arriaga Zamora

D.R.© Instituto Nacional de Salud Pública
Av. Universidad 655, colonia Santa María Ahuacatitlán.
62508 Cuernavaca, Morelos, México.

Impreso y hecho en México

Printer and made in Mexico

ISBN de la colección completa: 968-6502-70-X

ISBN de este tomo: 968-6502-71-8

Citación sugerida:

Valdespino JL, Olaiz G, López-Barajas MP, Mendoza L, Palma O, Velázquez O, Tapia R, Sepúlveda J. Encuesta Nacional de Salud 2000. Tomo I. Vivienda, población y utilización de servicios de salud. Cuernavaca, Morelos, México. Instituto Nacional de Salud Pública, 2003.

Esta obra no puede ser reproducida total o parcialmente en ningún medio, sea mecánico, electrónico o fotográfico, sin la autorización previa por escrito del Instituto Nacional de Salud Pública.

La Encuesta Nacional de Salud 2000 fue financiada por la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública.

La información de esta publicación se puede obtener como documento PDF en la página de la Internet del Instituto Nacional de Salud Pública: www.insp.mx/ensa2000

Encuesta Nacional de Salud • 2000

Coordinación General

Jaime Sepúlveda

Director General, Instituto Nacional de Salud Pública

Roberto Tapia Conyer

Subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, SSA

Gonzalo Gutiérrez Trujillo

Coordinador de Salud Pública, IMSS

Grupo de Diseño Conceptual

José Luis Valdespino
Oscar Velázquez M.
Coordinadores

Mercedes Clavery
Aurora del Río
Esperanza García
Lourdes García
María del Carmen Herrera
Carlos Jiménez Gutiérrez
Pablo Kuri
Noemí Lam Osnaya
Agustín Lara
Miguel Ángel Lezana
Humberto Martínez
Carlos Magis
Laura Mendoza
Gustavo Olaiz
Manuel Palacios Martínez
Laura Pedroza
Ricardo Sarti Gutiérrez
Catalina Ramírez Cuadra
Mario Henry Rodríguez
Rosalba Rojas
Elsa Sarti
Javier Valdés

Grupo de Diseño Muestral

Gustavo Olaiz
Coordinador

Aurora Franco
Oswaldo Palma

Grupo de Diseño Operativo y Trabajo de Campo

Pablo Kuri
Elsa Sarti
Coordinadores

Trabajo de Campo
Mercedes Clavery
Ángel Sergio Díaz Sánchez

Arturo González Delgado
Luis González Urbán
René Hurtado Barrera
Humberto Martínez Pérez
Santos Pérez Gallardo
César Sandoval Cáceres
Elsa Sarti
Javier Valdés
Ricardo Valdez Castro

Supervisión

Eduardo Barrón López
Rodolfo Cruz Méndez
Edith Cruz Méndez
Roberto Cruz Rivera
Rubén Espinoza Peña
Lucía Gutiérrez Badillo
Reyna Juárez Villarón
Armando Ledezma Hernández
María Guadalupe Leyva Maldonado
Ángeles Luna Cervantes
Carmen Novelo Aguilar
Alejandra Peralta Gallardo
Carmen Prado García
Miriam Rodríguez Rodríguez
Mario Rodríguez Ortuño
Martina Sánchez Garay
Luis Juárez
Adrián Ciénega
Juan Carlos Torres Fariás
Marlene Torres Medina
Roberto Vega Moreno
Norma Isela Vizuet Vega

Grupo de Integración, Procesamiento y Análisis de Datos

Gustavo Olaiz
Coordinador

Integración de los datos
Salvador Contreras Contreras
Sonia Fernández Cantón
María del Carmen Herrera
Noemí Lam Osnaya

Miguel Ángel Lezana Fernández
Felipe Ruiz Reyes
Raúl Wong Luna

Procesamiento y análisis de datos

María de la Paz López Barajas
Laura Mendoza
Oswaldo Palma Coca
Paula Rivera
Rosalba Rojas
José Luis Valdespino

Grupo del Banco de Sueros y DNA

Mario Henry Rodríguez
José Luis Valdespino
Coordinadores

Carlos Conde
María del Pilar Hernández
Juan Eugenio Hernández Avila
Alberto Valladares

Participantes en el Taller de Consulta a Expertos sobre el Diseño de la Encuesta Nacional de Salud

Salvador Armendares
Pedro Arroyo
Beatriz Zurita
Rosario Cárdenas
Celia Escandón
Clicerio González
Juan Alberto Herrera Moro
Juan Pedro Lacleite
Rubén Lisker
Oswaldo Mutchinick
Gregorio Pérez Palacios
Carlos Posadas
Juan Rull
Gustavo Sánchez Torres
Manuel Urbina
Edward Sondik
Linda Youngman

Siglas

ADN	Acido desoxirribonucleico
AS	Antisarampión
BCG	Bacilo Calmette-Guérin
CNV	Cartilla Nacional de Vacunación
DPD	Diaquil-1,4 fenilendiamina
DPT	Vacuna contra la difteria, tosferina y tetanos
Dx	Diagnóstico
EDTA	Etiléndiamino-tetra acético
ENA	Encuesta Nacional de Adicciones
ENEC	Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas
ENN	Encuesta Nacional de Nutrición
ENSAMI	Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil
ENSA II	Encuesta Nacional de Salud II
ETS	Enfermedades de transmisión sexual
IMC	Indice de masa corporal
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social
IMSS Solidaridad	Instituto Mexicano del Seguro Social Solidaridad ahora IMSS
	Oportunidades
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
	Hepatitis B
HB	
Hib	<i>Haemophilus influenzae b</i>
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PEMEX	Petróleos Mexicanos
Q1	Primer cuartil
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR	Secretaría de Marina
SRP	Vacuna triple viral (sarampión rubéola y parotiditis)
SMM	Salario mínimo mensual
SSA	Secretaría de Salud
TAS	Tensión arterial sistólica
TAD	Tensión arterial diastólica
TT/Td	Toxide tetánico /toxide tetánico y diftérico
VSO	Vida Suero Oral

Contenido

Presentación	13
Introducción	15
Diseño y metodología de la encuesta	19
Capítulo 1	
Características de las viviendas y los hogares	35
Capítulo 2	
Características de la población	47
Capítulo 3	
Necesidades de salud	73
Capítulo 4	
Utilización de servicios de salud	105
Capítulo 5	
Utilización de servicios ambulatorios	125
Capítulo 6	
Utilización de servicios preventivos	139
Capítulo 7	
Utilización de servicios curativos	159
Capítulo 8	
Utilización de servicios hospitalarios	175
Capítulo 9	
Tiempos de traslado y espera para servicios de salud	195
Capítulo 10	
Gastos de bolsillo en servicios de salud	221
Capítulo 11	
Percepción de la calidad de los servicios de salud	251
Glosario de términos	281

Presentación

Entre los bienes públicos globales de la salud, la información es sin duda uno de los más importantes, por su valor intrínseco al contribuir a la generación de nuevos conocimientos, y por su valor instrumental al ser una de las herramientas más transparentes y sólidas para el diseño y la evaluación de las políticas públicas del sector. En este sentido, nuestro país ha desplegado a lo largo de las últimas dos décadas un esfuerzo sostenido para mejorar la información en salud generada por los registros estadísticos y los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Este esfuerzo se ha acompañado de la construcción de una reciente, pero vigorosa tradición de Encuestas Nacionales, como complemento indispensable para subsanar las limitaciones intrínsecas de la información rutinaria generada en los propios servicios de salud. Los ámbitos abordados por las diversas encuestas nacionales realizadas en los últimos 15 años han sido variados, reflejo de la complejidad y amplitud del campo de la salud pública en nuestro país, y como respuesta a la profunda transición epidemiológica que está experimentando la población. Así, se ha recabado información seroepidemiológica, de la prevalencia de enfermedades crónicas, del estado nutricional de la población, del consumo de sustancias adictivas y, desde luego, sobre la cobertura y utilización de los servicios de salud, entre otros.

Esta información, obtenida mediante encuestas nacionales en hogares y establecimientos de salud, ha servido para el diseño de políticas públicas y programas, cuyo éxito ha transformado el perfil de salud de nuestra población. Además, han puesto de relieve distintos problemas cuya magnitud era desconocida y, en consecuencia, no recibían la debida atención dentro de los programas implantados por el sistema de salud, como el caso de la altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad entre la población adulta, el consumo de drogas de diseño o el excesivo pago de bolsillo que hacen a las familias mexicanas para financiar los servicios de salud, por mencionar algunos ejemplos.



El Sistema de Encuestas Nacionales de Salud incluye dos categorías de encuesta. Las de carácter general – que son la base del sistema – son levantadas cada seis años y sirven como base para el diseño de una segunda categoría de encuestas temáticas, dirigidas a recabar información a profundidad sobre temas específicos.

La Encuesta Nacional de Salud 2000 es la más ambiciosa de las encuestas en salud realizadas hasta la fecha. Recoge información sociodemográfica, de utilización de servicios de salud y sobre condiciones de salud, desagregada para niños, adolescentes y adultos. Para cada uno de estos grupos se realizaron además, por primera vez en nuestro país, mediciones biológicas específicas.

La Encuesta Nacional de Salud 2000 puede considerarse como el punto de arranque de una nueva generación de encuestas de salud en nuestro país, en ella se conjugaron la amplitud y profundidad de los temas abordados, con la utilización de las herramientas estadísticas más avanzadas y, sobre todo, el talento de un grupo de profesionales de distintas instituciones apoyados por las máximas autoridades de salud del país, en dos administraciones consecutivas de gobierno.

DR. JULIO FRENK MORA
SECRETARIO DE SALUD



Introducción



Introducción

El documento que el lector tiene en sus manos constituye el primer tomo de la Encuesta Nacional de Salud 2000, que quizás es, hasta ahora, el más ambicioso proyecto del Sistema Nacional de Encuestas de Salud realizado en México. Dicho Sistema está conformado por una serie que inició en 1986 con la realización de la primera Encuesta Nacional de Salud. Esta primera encuesta nacional marcó un momento histórico para la salud pública de México pues el país contó por primera vez con información oportuna y confiable sobre aquellas condiciones sanitarias que son recogidas de manera idónea mediante el uso de encuestas, ya sea porque el sistema nacional de información no lo puede reportar de manera sistemática o cuya obtención implica un proceso muy especializado. A partir de 1986 se han realizado una multitud de encuestas nacionales, todas bajo la misma línea metodológica, pero con diferentes propósitos según el aspecto de la salud pública que cada una ha abordado. En este caso se encuentran las encuestas encaminadas a investigar las enfermedades infecciosas, en particular las diarreas, la nutrición, las adicciones, las enfermedades crónicas, la cobertura de vacunación y la utilización de servicios de salud, por ejemplo. El Sistema Nacional de Encuestas de Salud ha permitido generar, a lo largo de más de tres lustros, información que ha sido fundamental para el diseño y la evaluación de los grandes programas sanitarios del país.

La Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000) retoma los temas más relevantes de las encuestas nacionales realizadas hasta 1998 (y que requerían de actualización) e incorpora nuevas áreas de interés, tales como la prevalencia, distribución y características de la discapacidad en la población mexicana y la evaluación de algunos programas de salud pública a nivel poblacional. Un avance extraordinariamente significativo respecto a las encuestas previas es el hecho de que, por primera vez, se ha conformado un banco de muestras biológicas con las cuales será posible estudiar las características genéticas de la población mexicana.

La mayor parte de la información que contiene la ENSA 2000 fue obtenida mediante la aplicación de cinco cuestionarios diferentes. El primero, denominado cuestionario de hogar, se aplicó a todos los integrantes de la unidad doméstica; el segundo, sólo a aquellos miembros de la familia que habían usado algún servicio de salud, preventivo o curativo, en los últimos doce meses; los cuestionarios individuales se aplicaron, según correspondía, a una persona dentro de cada grupo de edad específico: niños (0 a 9 años), adolescentes (10 a 19 años) o adultos (20 años o más), seleccionándola al azar entre los integrantes del mismo grupo de edad existentes en el hogar entrevistado. Además de la

aplicación de estos cuestionarios se utilizaron otros procedimientos para recolectar información. Entre ellos destacan la somatometría de los miembros de la familia seleccionados; la toma de muestras químicas ambientales (para la medición de cloro en agua, por ejemplo), y la toma de muestras biológicas corporales para la determinación de las concentraciones de glucosa en sangre, la prevalencia de contactos con el virus de la inmunodeficiencia humana y la cobertura de protección inmunológica obtenida por los programas de vacunación, por ejemplo. Los avances obtenidos en el mapeo del genoma humano serán utilizados en breve para identificar factores genéticos asociados a enfermedades tan relevantes en la población mexicana como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de tumores malignos y otras enfermedades crónicas.

La publicación de los resultados obtenidos en la ENSA 2000 permite definir mejor y hacer más precisa la situación en la que se encuentran algunos de los problemas más acuciantes de la salud de la sociedad mexicana y de su sistema de salud. En general, el panorama está conformado por claroscuros, por lo que pueden observarse éxitos y avances combinados con inequidad, inaceptables y apremiantes necesidades de cambio. Por ejemplo, en este informe se documenta la presencia de preocupantes diferenciales en los problemas de salud clásicamente asociados con la pobreza. Se muestran notables avances en la cobertura de servicios de salud preventivos y curativos, pero también la necesidad de que la medicina preventiva y curativa se adapte a la transición demográfica, epidemiológica y de riesgos. Algunos resultados de la encuesta indican que aún existen problemas importantes en materia de gastos catastróficos en salud, necesidades de salud de la mujer, detección y atención de la discapacidad y mejoramiento de la calidad que la población percibe durante la provisión de servicios de salud.

La información contenida en la ENSA 2000 es enorme, tanto por el número de hogares y sujetos entrevistados como por la diversidad y profundidad de las variables investigadas. Así, durante la realización de la ENSA 2000 se encuestaron 45 726 viviendas en total, con un promedio de 1 429 por entidad federativa. La población encuestada fue de 190 214 personas, con un promedio de 5 944 por entidad federativa y variaciones entre 4 790 en el Distrito Federal y 6 721 en Guanajuato. En lo que toca al volumen de muestras biológicas obtenidas, basta señalar que se recolectaron 82 152 muestras de suero de sujetos mayores de un año de edad y 43 085 muestras para identificación de DNA de sujetos de 20 años de edad o más.

Detrás de cada dato presentado en un cuadro o gráfica de este informe, están las 190 mil personas encuestadas en todo el país, seleccionadas de manera tal que representan a la población mexicana en su conjunto. También se encuentra un calificado equipo de especialistas que, desde el diseño del marco conceptual de la encuesta hasta la recopilación, el análisis y la extrapolación de los datos, han aplicado una rigurosa metodología para identificar con la mayor fidelidad posible las necesidades de la población y del sistema de salud.

Con la publicación de este primer tomo la información revelada por la ENSA 2000 se pone a la disposición de los tomadores de decisiones, el personal de salud, la comunidad académica y, sobre todo, la población en su conjunto, con el fin de que pueda ser utilizada como insumo durante el diseño de sus acciones y la evaluación de sus prácticas. Para nosotros es, además, un elemento sustantivo en la rendición de cuentas de nuestra institución.

La mayor satisfacción de quien participa en la generación de información es su traducción en acciones efectivas. Consideramos que la información contenida en la ENSA 2000 puede contribuir al ajuste de los planes y programas de salud; al fortalecimiento de la investigación en salud; a la organización de nuevos y mejores programas de formación de recursos humanos y al aumento de la capacidad de la sociedad para tomar decisiones que atañen a su salud y al desempeño de los servicios encaminados a conservarla, promoverla o recuperarla. Como cualquier labor humana es perfectible, exhortamos a todos los lectores a compartir sus críticas y sugerencias con nosotros.

DR. JAIME SEPÚLVEDA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA



Diseño y metodología de la encuesta

C O N T E N I D O

- Antecedentes
- Objetivos
- Bases metodológicas
- Diseño conceptual general
- Estrategia operativa
- Capacitación

Diseño y metodología de la encuesta

Antecedentes

Como preludeo del establecimiento de un Sistema Nacional de Encuestas de Salud, en 1986 se aplicó en México la primera Encuesta Nacional de Salud (ENSA I), y a partir de entonces una serie de estudios con objetivos específicos y complementarios, entre los que cabe destacar, cronológicamente, la realización, en 1987, de la Encuesta Nacional Seroepidemiológica I (ENSE-I) y la Encuesta Nacional de Nutrición I (ENN-I); en 1988, la Encuesta Nacional de Adicciones I (ENA-I); en 1993, la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC), así como la ENA-II; en 1994, la Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación (ENCOVA) y la segunda edición de la ENSA -la cual estuvo orientada al estudio de la accesibilidad, la calidad, la utilización y la cobertura de los servicios de salud-; y en 1998, la tercera edición de la ENA y la segunda de la ENN. En esta ocasión se presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (tercera edición de la ENSA), que se llevó a cabo con el interés de actualizar la información existente sobre la prevalencia de enfermedades agudas y crónicas, (con lo que se da continuidad a la ENEC), así como sobre la utilización y la calidad de los servicios de salud. Además, es de gran importancia evaluar el cumplimiento de las metas de los programas prioritarios y las estrategias diseñadas para su instrumentación y puesta en marcha durante los últimos cinco años, con el fin de evaluar sus logros e identificar áreas que requieran reforzamiento. En este primer tomo se presentan los resultados de vivienda, características de la población, necesidades de salud y utilización de los servicios de salud.

Objetivos

Los objetivos de la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000) son:

1. Estimar la frecuencia y la distribución de algunos indicadores positivos de salud, factores de riesgo, enfermedades (agudas y crónicas), lesiones y discapacidad en el ámbito nacional.
2. Calcular la seroprevalencia de marcadores de factores de riesgo y anticuerpos contra enfermedades específicas.
3. Estimar las prevalencias estatales de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y otras enfermedades.
4. Identificar los padecimientos asociados con diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemias y otras enfermedades.
5. Contribuir en la evaluación de algunos programas de salud (por ejemplo: vacunación, detección de cáncer cervicouterino y otros).

6. Contribuir al conocimiento y a la identificación de factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, culturales y de estilos de vida, asociados con la salud y con los padecimientos estudiados.
7. Identificar algunos factores relacionados con la utilización de los servicios de salud.
8. Estimar la magnitud de los gastos de bolsillo relacionados con la atención de la salud.
9. Estimar los promedios de tiempo de traslado y de espera para recibir atención a la salud
10. Estimar los indicadores de calidad de los servicios de salud.

Bases metodológicas

Los requerimientos de información actualizada para el sector salud y el análisis de las encuestas previas del Sistema de Encuestas de Salud fueron el punto de partida para determinar la temática a incluir en la ENSA 2000, la definición de los conceptos contenidos, la formulación de las preguntas y el diseño de los instrumentos de captación.

En reuniones con especialistas en los temas y usuarios de la información fueron puestos a consideración los cuestionarios a utilizar, y la estrategias de muestreo y operativa. El resultado de estas reuniones fue una importante contribución al diseño conceptual y metodológico de la encuesta.

Las bases metodológicas de la ENSA 2000 son las siguientes:

- Es una encuesta por muestreo probabilístico.
- Se definió como una encuesta en viviendas que cubriera a todos los hogares al interior de ellas, y en ellos, en primer lugar, se consideró a todos sus integrantes; y entre ellos se seleccionaron las siguientes subpoblaciones:
- Utilizadores de servicios de salud, ambulatorios u hospitalarios, en los 12 meses previos a la entrevista.
- Un niño de 0 a 9 años de edad.
- Un adolescente de 10 a 19 años de edad.
- Un adulto de 20 ó más años de edad.

Se captó la información aplicando entrevista directa al informante adecuado, y se tomaron análisis clínicos y medidas de parámetros biológicos; la definición de informante adecuado y qué medidas y tipo de muestras de sangre, variaron de acuerdo con las necesidades de información para estas subpoblaciones.

- a) El periodo de levantamiento se definió en seis meses y medio, abarcando de septiembre de 1999 a marzo de 2000.

- b) Un periodo de capacitación, en dos fases, con una duración total de cuatro semanas.
- c) Estrategia operativa especial para el cuidado, manejo, conservación, traslado y concentración de las muestras de orina y de sangre en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
- d) Sistema inteligente de captura, desarrollo de rutinas y validación de los archivos, y creación de un banco de datos, conformado por seis bases de datos relacionadas e integradas.

Diseño conceptual general

Contenido

La Encuesta Nacional de Salud 2000 recolectó información relacionada con las características geográficas de las localidades y entidades federativas encuestadas; para ello, se utilizaron las bases de datos georreferenciales existentes en el país, como las del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del Instituto de Investigaciones Geográficas (IIG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras.

Adicionalmente, se retomaron datos de los sistemas de información pertenecientes a las instituciones de salud, relacionados con la morbilidad, la mortalidad y las características de los servicios.

En el diseño conceptual de la encuesta se consideraron como unidades de análisis, en primer término, las viviendas, y se asignó el papel de informante al ama de casa; en segundo lugar, se consideró a los demás integrantes de los hogares y, entre ellos, a los que habían utilizado servicios de salud ambulatorios u hospitalarios en los 12 meses previos a la entrevista.

En el interior de cada hogar se seleccionó aleatoriamente a: a) un niño de 0 a 9 años de edad (la informante proxy fue el ama de casa o la/el responsable del niño); b) un adolescente de entre 10 y 19 años de edad, y c) un adulto de 20 o más años de edad. Estos últimos constituyeron las unidades de análisis para el estudio de la prevalencia de factores de riesgo, enfermedades agudas y crónicas, y daños a la salud por accidentes o violencias. Asimismo, se consideró al sujeto seleccionado como informante para cada uno de los respectivos cuestionarios.

Se utilizaron los siguientes cinco cuestionarios:

1. Hogar y población
2. Utilización de servicios de salud
3. Cuestionario para niños (0-9 años de edad)

4. Cuestionario para adolescentes (10-19 años de edad)
5. Cuestionario para adultos (mayores de 20 años de edad)

Definición de variables

Características de los hogares y de la población

Las características generales más relevantes de la población que se estudiaron en la ENSA 2000 corresponden a dos apartados: las variables sociodemográficas y las características de la vivienda.

En el primer apartado se incluyeron variables como sexo, edad, parentesco, lengua indígena, alfabetismo, escolaridad y causas de abandono escolar, estado conyugal, condición de actividad, situación en el trabajo, prestaciones laborales, ingreso por trabajo, rama de actividad económica, otros ingresos y número de hijos.


En relación con las características del hogar, se incluyeron las siguientes variables: material de construcción de pisos, paredes y techos; dotación de servicios públicos, en particular de agua potable y drenaje; prácticas de almacenamiento de líquido; número de cuartos que se utilizan para dormir; disponibilidad de energía eléctrica; uso de mosquiteros; uso de pabellones; nivel de cloro libre y total en el agua de la red pública; prácticas de tratamiento o desinfección del agua para consumo humano; tipo de loza que se utiliza para consumir o almacenar alimentos y, finalmente, exposición potencial a contaminantes diversos, provenientes de plantas industriales, gasolineras, talleres de reciclado o arreglo de acumuladores, fundidoras, industrias químicas, cementeras y minas, ubicadas a menos de dos kilómetros de distancia respecto de las viviendas.

Todas estas variables fueron tomadas en cuenta debido a que se asocian con la presencia de algunas enfermedades típicas de la pobreza, como la diarrea y la desnutrición, así como con el desarrollo de padecimientos respiratorios y de enfermedades transmitidas por vector y con la intoxicación por plomo.

Necesidades de salud

Antes de que emplee los servicios de salud, una persona debe percibir que los necesita; así, la necesidad es considerada como la causa inmediata para la utilización de los servicios, y puede variar de acuerdo con factores predisponentes y habilitadores. Su medición puede hacerse a partir de la percepción del estado de salud, la frecuencia de dolor, el número de síntomas, los días de actividad perdidos, la discapacidad, la severidad percibida de un problema, etcétera.

Figura A.
Contenido del diseño conceptual de los cuestionarios de Hogar y Población y el de Utilización de servicios de salud. Encuesta Nacional de Salud 2000, México



De este modo, el capítulo sobre necesidades de salud incluyó las siguientes variables: percepción de la propia situación de salud; prevalencia lápsica de enfermedades agudas y crónicas; daños a la salud originados a partir de accidentes, violencias o adicciones; prevalencia de discapacidad; mediciones de peso y talla; tensión arterial; niveles de hemoglobina, glucosa, colesterol, lipoproteínas, metales pesados y plaguicidas, así como presencia de anticuerpos contra diversos agentes infecciosos, todo ello determinado a partir de la toma de muestras biológicas.

Utilización de los servicios de salud

Teóricamente, existe una correspondencia entre la necesidad de salud percibida por la población y el nivel de utilización de los servicios. Ante dicha necesidad, el individuo activa mecanismos en torno al deber de satisfacerla, de acuerdo con su cultura, poder de compra y personalidad. Desde la perspectiva poblacional, la utilización está en función de la percepción del estado de salud o de la enfermedad que presente la población, de las decisiones de los usuarios y de los proveedores de salud.

Así, para todos los utilizadores de servicios de salud, tanto ambulatorios como hospitalarios, se estudiaron los siguientes indicadores: motivo de la atención -incluyendo actividades preventivas-, tipo de personal que brindó la atención y tipo de institución en la que se recibió la atención.

Factores habilitadores y predisponentes para la utilización de servicios de salud

Por factores habilitadores y predisponentes para la utilización de servicios de salud se entiende el grado de ajuste entre las características de la población y las de los recursos en el proceso de búsqueda y obtención de la atención a la salud.

Tiempos de espera y traslado, gastos de bolsillo y percepción de la calidad.

Se entiende por tiempos de espera y traslado los referidos por los encuestadores para obtener atención de servicios de salud ambulatoria; y los gastos de bolsillo los utilizados en la consulta ambulatoria y en la hospitalización, que provienen del propio usuario.

Por su parte, la calidad de la atención está relacionada con el grado de mejoría esperada en el nivel de salud atribuible a la atención recibida. Para el análisis de esta variable se consideraron tres dimensiones:

1. Estructura. Incluyó todos los recursos humanos, materiales y financieros. Para el diseño de la encuesta sólo se consideraron los recursos materiales.
2. Proceso. Se consideró todo lo que los médicos y otros proveedores de los servicios de salud hacen por los pacientes, incluyendo la habilidad con la que otorgan la atención; también se incluyeron las acciones que los individuos realizaron para sí mismos.
3. Resultado. En esta dimensión se tomó en cuenta todo aquello que se obtiene para el paciente en términos de un cambio en el estado de salud, ya sea de manera positiva o negativa y que se pueda atribuir a la atención. Sin embargo, la ENSA 2000 sólo identificó la calidad de la atención desde el punto de vista y el criterio de los usuarios de los servicios de salud.

Diseño muestral

El diseño muestral de la ENSA 2000 fue probabilístico, polietápico, estratificado y de conglomerados.

Para garantizar que las estimaciones obtenidas por la encuesta tuvieran calidad aceptable, fue necesario, entre otros elementos, que el tamaño de muestra que se definió para cada parámetro de interés fuera suficiente. Por ello, el cálculo de dicho tamaño estuvo en función de los parámetros que se deseaban estimar, el nivel de confianza deseado y el error relativo máximo que se estuvo dispuesto a aceptar. Además, fue necesario incluir una corrección por no respuesta y, como el esquema de selección fue diferente al aleatorio simple, el efecto de diseño.

Así, el tamaño se calculó mediante la fórmula:

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 (1-P) deff}{r^2 P TR}$$

donde

n Tamaño de muestra

P Proporción a estimar

$Z^2_{\alpha/2}$ Cuantil de una distribución normal asociado a un nivel de confianza deseado

r Error relativo máximo que se está dispuesto a aceptar

$deff$ Efecto del diseño, que es la pérdida o ganancia en la eficiencia de diseño, por tratarse de uno complejo

TR Tasa de respuesta

La fórmula anterior se aplicó bajo los siguientes supuestos:

- Proporción más pequeña a estimar: $P= 5\%$
- Valor en tablas para una confianza de 95%: $Z^2_{\alpha/2} = 1.96$
- Error relativo máximo: $r= 0.3$
- Efecto de diseño: $deff= 3$
- Tasa máxima de no respuesta del 30%: $TR= 70\%$

Así, el tamaño de muestra fue de 1 473 viviendas por estado. Este tamaño fue redondeado a 1 470, lo que derivó en 47 040 viviendas a escala nacional.

Esquema de selección

Los pasos del proceso de selección fueron los siguientes:

- Asignación proporcional del número de viviendas en muestra, por estrato urbano rural.
- Selección de 14 municipios por estado, con reemplazo y con probabilidad proporcional de número de viviendas en el mismo.
- Selección de cinco AGEB's por municipio, con probabilidad proporcional al tamaño.
- Selección de tres manzanas por AGEB, con igual probabilidad.
- Selección de siete viviendas por manzana, con igual probabilidad.
- Selección de un individuo en el grupo de edad de interés, con igual probabilidad.

Factores de expansión

De acuerdo con el esquema de selección de la muestra, las probabilidades de selección de una vivienda están dadas por:

$$P(V_{hi}) = \frac{n_h \cdot 5 \cdot 21}{N_h}$$

donde

$$h = \begin{cases} 0 & \text{si el estrato es rural} \\ 1 & \text{si el estrato es urbano} \end{cases}$$

n_h Es el número de municipios seleccionados en el estrato h , para $h = 0, 1$

N_h Es el número de viviendas habitadas en el estrato h

Por otro lado, la probabilidad de selección de un individuo perteneciente al grupo de edad de interés es:

$$P(I_{hij}) = P(V_{hi}) \cdot \frac{1}{H_{hig}} = \frac{n_h \cdot 5 \cdot 21}{N_h} \cdot \frac{1}{H_{hig}}$$

donde

$$h = \begin{cases} 0 & \text{para el grupo de edad de 0 a 9 años} \\ 1 & \text{para el grupo de edad de 10 a 19 años} \\ 2 & \text{para el grupo de edad de 20 años y más} \end{cases}$$

H_{hig} Es el número de individuos en la vivienda i -ésima del estrato h y perteneciente al grupo de edad $g = 0, 1, 2$

De esta manera el factor de expansión para obtener estimadores sobre características de la vivienda es:

$$F_{hi} = \frac{N_h}{n_h \cdot 5 \cdot 21}$$

Si se desean obtener estimaciones sobre características de los individuos se debe utilizar el factor

$$F_{hig} = \frac{N_h \cdot H_{hig}}{n_h \cdot 5 \cdot 21}$$

Ajuste por no respuesta y post-estratificación

Los factores de expansión fueron multiplicados por dos factores adicionales. El primero de ellos, denotado por $A_{1(hig)}$, fue incluido para ajustar el efecto de la falta de respuesta. De esta manera el factor de expansión con el ajuste por no respuesta resulta ser

$$\bar{F}_{hig} = A_{1(hig)} \cdot F_{hig}$$

El segundo es un factor para calibrar los factores de expansión del diseño muestral. Los factores de expansión calibrados son usados frecuentemente para mejorar las estimaciones obtenidas a partir de una encuesta mediante el uso de información auxiliar.¹ En el caso de la ENSA 2000 los pesos calibrados se usaron para ajustar el efecto de subrepresentación o sobrerepresentación de ciertos grupos, y permitir la estimación de totales actualizados según las cifras del XII Censo de Población y Vivienda 2000. El método de calibración empleado aparece en el trabajo de Lee,² y es conocido como post-estratificación.

Si denotamos por $A_{2(hig)}$ el factor de calibración, el factor de expansión final es:

$$\bar{F}_{hig} = A_{2(hig)} \cdot \bar{F}_{hig} = A_{1(hig)} \cdot A_{2(hig)} \cdot F_{hig}$$

Cabe señalar que para aquellos grupos subrepresentados el factor $A_{2(hig)}$ es mayor a la unidad, y en aquellos grupos sobrerepresentados se tiene que $A_{2(hig)}$ es menor que uno, es decir, los individuos de grupos subrepresentados tienen un ponderador mayor que los individuos de grupos sobrerepresentados.

De lo anteriormente expuesto, se observa que el esquema de muestreo es no autoponderado, lo que significa que cada vivienda en la muestra representa a un número diferente de viviendas. Por ello, cualquier indicador o tabulación requiere para su construcción el uso de los factores de expansión. Los resultados presentados en esta publicación fueron obtenidos mediante el uso de los ponderadores correspondientes. En caso de que los usuarios de las bases de datos de la encuesta no utilizaran el ponderador para hacer algún análisis pueden obtener estimadores erróneos y sobreestimar o subestimar las varianzas. Es decir, si se ignoran los ponderadores en el análisis y se realizan pruebas

de hipótesis estas pueden aceptarse o rechazarse cuando no deberían y el investigador estaría llegando a conclusiones erróneas.

Estrategia operativa

La captación de la información se llevó a cabo en ocho etapas que comprendieron levantamiento simultáneo de datos en cinco entidades en general, excepto en la última, que sólo abarcó al Distrito Federal, por sus características propias. El tiempo promedio de permanencia en una entidad fue de 23 días; y el trabajo de campo para cubrir el país se desarrolló durante los meses de septiembre de 1999 a marzo de 2000.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la ENSA 2000 se contrató personal, con perfil de enfermería, en todos los niveles de la estructura operativa. En cada entidad se formaron 20 equipos integrados por dos entrevistadores; un supervisor tuvo a su cargo cinco equipos que distribuyó en dos vehículos; cada una de las entidades fue cubierta por cuatro supervisores. La estructura operativa se presenta a continuación.

La carga promedio de trabajo diaria fue de cuatro viviendas por equipo, con un promedio de dos horas por entrevista; en promedio, se visitó tres veces cada vivienda. Sin embargo, una vez finalizadas las actividades en la entidad, el coordinador general tuvo una reunión con la estructura de levantamiento para evaluar las actividades desarrolladas y asegurar las tasas de respuesta esperadas. En caso de existir algún problema, dos equipos y un supervisor permanecían en la entidad revisitando las viviendas, hasta lograr la calidad y la tasa de respuesta requeridas.

Cada equipo contó con una mochila con los siguientes materiales:

- Cuestionarios de: hogar, de niños, de adolescentes y de adulto.
- Toma de sangre venosa: tubos vacutainer SST y EDTA, ligadura, guantes, torunderos, torundas, adaptadores para agujas esterilizadas desechables.
- Toma de muestra capilar: disparador de lancetas, tiras reactivas y lancetas.
- Tensión arterial: baumanómetro de mercurio, estetoscopio, banco plegable y brazaletes.
- Medidas somatométricas: cinta métrica, escuadra de madera, sanitas y báscula.
- Toma de muestra de orina: vasos para recolección de orina y tiras reactivas.
- Muestra de cloro en agua: equipos Hach y sus correspondientes reactivos.

Adicionalmente, se incluyeron hieleras, gel refrigerante, termo, guantes, material de asepsia, etiquetas para identificar las muestras, entre los principales insumos.



Al finalizar la jornada diaria, cada equipo entregaba los cuestionarios y las muestras biológicas a los supervisores, para que ellos revisaran y empacaran los cuestionarios para ser enviados a la Ciudad de México. En el laboratorio de campo se concentraron las muestras biológicas para su centrifugación, verificando que se encontraban en condiciones óptimas y etiquetadas, se empacaban en hieleras con gel refrigerante para enviarlas por mensajería al Laboratorio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Para llevar a cabo el levantamiento de la información se diseñaron estrategias especiales acordes con la captación de entrevistas directas a través de cuestionario, toma de muestras serológicas y mediciones somatométricas y del medio ambiente.

A continuación se presenta una breve descripción de las estrategias adoptadas en cada una de las vertientes del trabajo de campo.

Entrevistas directas con base en cuestionario. La captación de información se hizo a través de cuatro cuestionarios aplicados por los entrevistadores al informante adecuado, una vez obtenida la carta de consentimiento.

Determinación de cloro residual libre. El procedimiento para la toma de agua en la vivienda fue el siguiente: a) selección de la toma de agua domiciliaria, para la muestra de agua; b) dejar correr el agua para llenar un recipiente con capacidad de 10 litros; c) enjuagar las celdas dos veces con el agua que está corriendo; d) llenar la celda izquierda del comparador hasta el límite marcado; e) colocar la pastilla de DPD en la celda con agua, tapan la celda y agitar hasta que la pastilla se disuelva; f) buscar un sitio iluminado con luz solar, obtener ángulo de contraste y efectuar la comparación visual; g) registrar en el cuestionario de hogar el resultado obtenido, al comparar el color adquirido por el agua contra la escala de colores, y h) ante la menor duda, repetir la operación.

Glucosa por sangre capilar. Se utilizaron biosensores, que consisten básicamente en la medición del número de electrones que se liberan después de una reacción química. Lo que implica insertar una tira en un biosensor y aplicar una gota de sangre. El sensor mide a través de pequeñas corrientes eléctricas y luego indica el resultado de la glucosa sanguínea. Se requiere de un dispositivo para lancetas y lancetas desechables, para obtener la gota de sangre de un dedo. Las manos deben estar completamente limpias y secas antes de manipular la tira y hacer la medición.

Hemoglobina por sangre capilar. La determinación de hemoglobina se realizó utilizando lanceta y disparador, algodón con alcohol, pipetas de Salí, tubos pirex con reactivos Drabkin, gradillas y espectrofotómetro. La gota de sangre se obtiene del dedo medio o anular.

Sangre venosa. Los tubos al vacío se identificaron mediante códigos de barras. Se obtuvo una muestra de aproximadamente 19 ml. de sangre repartida de la siguiente forma. En un primer tubo (SST), 9.5ml de suero, que contenía silicato y gel de poliéster inerte, con el fin de acelerar la coagulación, reducir la presencia de células y fibrina en suero y favorecer la separación de las células. Un segundo tubo (EDTA), con otros 9.5 ml de sangre, el cual contenía ácido etiléndiamino-tetra acético, que impide la coagulación.

Se observaron los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos biológico infecciosos comprendidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995.

Examen general de orina. Se recogieron en vasos recolectores, directamente del chorro de la orina de la mañana o en su defecto casual, dos muestras de 10 a 20 ml. La primera, para urianálisis y la segunda, para albuminuria, evitando la contaminación de la muestra con la piel. El examen se realizó en el mismo domicilio.

Capacitación

Dadas las estrategias especiales para efectuar la captación de información, y para garantizar la calidad y veracidad de los datos, se llevó a cabo un programa de capacitación en dos fases, con la finalidad de asegurar la estandarización y manejo de los procedimientos para la toma de muestras biológicas, toma de medidas somatométricas, así como el manejo y llenado adecuado de los cuestionarios.

El periodo de capacitación fue de 30 días, dividido en dos etapas. La primera, comprendió el manejo de cuestionarios, procedimiento y estandarización para la toma de muestras y de medidas antropométricas, con una duración de 20 días.

La capacitación comprendió los siguientes aspectos:

- Adecuado manejo la técnica de la entrevista, de los conceptos y de los cuestionarios empleando, tanto trabajo en aula, como práctica de campo.
- Conocimiento y ubicación en campo con base en la cartografía del marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 1995.
- Manejo y estandarización en la medición de tensión arterial, peso y talla, con base en el correcto manejo y calibración del baumanómetro de columna de mercurio (Hg), y la aplicación de la técnica de toma de presión, y su registro en el cuestionario. El adecuado manejo y calibración de la báscula solar y la aplicación de la técnica para pesar, y su registro en el cuestionario. La talla de pie, empleando el flexómetro y una escuadra, así como la correcta aplicación del procedimiento para medir la distancia máxima comprendida entre el suelo y el verter (punto más alto de la cabeza), cuando la persona descalza permanece, sobre una superficie plana, completamente recta y de espaldas a la pared.
- El procedimiento de toma domiciliaria de la muestra de cloro, su lectura y el registro en el cuestionario.
- Los requerimientos de bioseguridad, tanto del entrevistador como del entrevistado, para el uso de los biosensores, lancetas, tiras reactivas, así como su interpretación y registro de la información.
- La técnica de toma de sangre venosa, contemplando todo los aspectos de bioseguridad, entrenamiento en laboratorio para la toma eficiente y sin dañar a la persona, así como empleo de guantes y bata; conservación, almacenamiento, centrifugación, etiquetado y envío al laboratorio.

La segunda etapa se cumplió después de la prueba piloto, una vez ajustados los cuestionarios, enfocada hacia los cambios en ellos y a la corrección de los errores en la toma de muestras y en las mediciones durante la prueba piloto. Este proceso se realizó en diferentes momentos del levantamiento, de acuerdo con los problemas y necesidades detectados al personal de campo.

Prueba piloto

Al término de la primera fase de capacitación se realizó la prueba piloto en el estado de Morelos, con una duración de siete días, con la finalidad de evaluar tanto los cuestionarios, como la aplicación correcta y estandarizada de la toma de medidas somatométricas, de sangre y de orina.

Tratamiento de la información

Esta etapa consistió en varios procesos manuales y automáticos de los que fueron objeto los cuestionarios, y que comprendieron: empaquetado y envío, revisión y crítica, almacenamiento, captura, limpieza y construcción de base de datos.

Una vez recibidos los cuestionarios fueron objeto de revisión y crítica exhaustivas por parte de un equipo centralizado y especialmente capacitado, para identificar y, en su caso, corregir problemas en la información.

La captura se llevó a cabo mediante un sistema de captura inteligente, con el fin de reducir al mínimo errores en su digitación, y obtener bases de datos limpias. Como resultado se obtuvo un banco de datos conformado por seis bases de datos relacionadas e integradas, una por cada cuestionario, y otras dos con la información para la identificación y administración de las alícuotas contenidas en los bancos de sueros y ADN; bajo el concepto de “data warehouse”, según el cual el cuestionario de hogar será el eje del banco de datos.

Posterior a la captura se procedió a limpiar la información en dos etapas: la primera consistió en realizar un diagnóstico general de la congruencia de la información, y la segunda, en aplicar tratamientos con el fin de garantizar relaciones lógicas y congruentes entre las variables de cada cuestionario, y entre los cuestionarios y los bancos de sueros.

Referencias

- Tinajero M, Eslava G. Calibración en muestreo: una aplicación a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares 1992 y 1996, Serie Monografías IIMAS-UNAM, Volumen 9, No.21, México, 2000.
- Lee E, Forthofer R, Lorimer R. Analyzing Complex Survey Data, SAGE Publications, California, 1989.



Características de las viviendas y los hogares

C O N T E N I D O

- Número de viviendas y hogares, según entidad federativa.
- Hogares, según material predominante en los pisos de la vivienda, por entidad federativa.
- Hogares, según disponibilidad de agua en la vivienda, por entidad federativa.
- Hogares, según disponibilidad de drenaje en la vivienda, por entidad federativa.
- Hogares, según nivel de cloración de agua en la vivienda, por entidad federativa y tamaño de la localidad.

Características de las viviendas y los hogares

- Se encuestaron 45 726 viviendas y 45 870 hogares en todo el país.
- El número estimado mediante la ponderación fue de 21.833 millones de viviendas y 21.857 millones de hogares.
- En este reporte se consideran localidades urbanas aquellas con un número igual o mayor a 15 000 habitantes y localidades rurales, aquellas con un número menor de habitantes (localidades entre 1 a 14 999 habitantes).
- De acuerdo con este criterio, 61.2% de los hogares correspondieron a localidades urbanas y 38.8%, a las de tipo rural.
- El piso de tierra estuvo presente en 23.9% de los hogares de localidades rurales, y en 3% en las correspondientes a las localidades urbanas.
- En los hogares ubicados en el medio rural 32.7% tenían agua entubada dentro de la vivienda, 44.5% agua entubada fuera de la vivienda, y 22.8% no disponían de agua entubada.
- En el medio urbano la frecuencia es la siguiente: 73% disponían de agua entubada dentro de la vivienda, 25% fuera de la vivienda y sólo 2% no disponía de agua entubada.
- En las viviendas urbanas 4.7% no disponía de drenaje, y en las localidades rurales, 41.7%. En conjunto, 19% no disponían de este servicio.
- Sólo se realizaron estudios de los niveles de cloración en los hogares que disponían de agua en el momento de la encuesta; por esta razón, la medición sólo se pudo realizar en 75% de los hogares estudiados.


- La entidad federativa con el nivel más alto de concentración de cloro fue el Distrito Federal con 90%; 49.7% de las observaciones correspondieron a valores dentro de la norma, y 40.7% presentaron resultados con concentraciones por encima de la norma.
- En el otro extremo se encuentra Oaxaca, donde 82.6% de las mediciones indicaron valores por debajo de la norma.
- La medición de cloro en el agua disponible en los hogares encuestados tuvo importantes diferenciales según el tamaño de la localidad; en las localidades rurales, en 60% de las mediciones los valores estuvieron por debajo de la norma, en cambio en el medio urbano se reportó en 24%.
- Por otro lado, en 26% de las mediciones se identificaron valores por encima de la norma en el medio urbano.
- Existen estudios que señalan que los niveles de cloro por debajo de la norma pueden representar un riesgo de contaminación de microorganismos causantes de infecciones gastrointestinales.



Figura 1.1
Distribución porcentual de los hogares, según material predominante en pisos de la vivienda, por entidad federativa y tamaño de localidad

Material predominante

- Cemento o firme
- Madera, mosaico u otro recubrimiento
- Tierra




N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 1.2
Distribución porcentual de los hogares, según disponibilidad de agua en la vivienda, por entidad federativa y tamaño de localidad


Disponibilidad de agua

- Agua entubada dentro de la vivienda
- Agua entubada fuera de la vivienda
- Otra fuente no entubada



N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




N* = Frecuencia ponderada en miles
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 1.3
Distribución porcentual de los hogares, según disponibilidad de drenaje en la vivienda, por entidad federativa y tipo de localidad

Disponibilidad de drenaje

- A la red pública
- A una fosa séptica
- Sin drenaje




N* = Frecuencia ponderada en miles
 ** Sólo se consideran aquellas viviendas que disponían de agua en el momento de la entrevista
 *** Se consideran dentro de la norma aquellas mediciones en el rango de 0.2 a 1.5 ppm
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 1.4
Distribución porcentual de los hogares, ** según nivel de cloración de agua* en la vivienda, por entidad federativa y tamaño de localidad**

Niveles de cloración del agua

- Abajo de la norma
- Dentro de la norma
- Arriba de la norma

Figura 1.5
Distribución porcentual de los hogares, según nivel de cloración de agua*** en la vivienda, por entidad federativa**



N*=16 466 hogares

N*=Frecuencia ponderada en miles

** Solo se consideran aquellas viviendas que disponían de agua en el momento de la entrevista

*** Se consideran dentro de la norma aquellas mediciones en el rango de 0.2 a 1.5 ppm

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 1.1
Número de viviendas y hogares, según entidad federativa

Entidad federativa	Viviendas		Hogares	
	Muestral	Ponderado*	Muestral	Ponderado*
Aguascalientes	1 376	197.6	1 389	198.5
Baja California	1 446	601.6	1 446	601.6
Baja California Sur	1 317	104.8	1 318	104.8
Campeche	1 465	158.0	1 468	158.1
Coahuila	1 431	542.1	1 435	542.9
Colima	1 468	132.6	1 471	132.8
Chiapas	1 398	800.7	1 401	801.4
Chihuahua	1 422	756.4	1 424	756.9
Distrito Federal	1 306	2 124.8	1 306	2 124.8
Durango	1 468	324.4	1 468	324.4
Guanajuato	1 427	911.5	1 465	921.5
Guerrero	1 421	654.0	1 422	654.2
Hidalgo	1 422	493.9	1 422	493.9
Jalisco	1 466	1 392.0	1 468	1 393.0
México	1 467	2 862.0	1 469	2 864.1
Michoacán	1 435	852.6	1 435	852.6
Morelos	1 469	364.7	1 473	365.2
Nayarit	1 469	218.2	1 470	218.3
Nuevo León	1 428	886.9	1 429	887.2
Oaxaca	1 445	738.3	1 445	738.3
Puebla	1 464	1 057.8	1 464	1 057.8
Querétaro	1 352	294.1	1 369	295.9
Quintana Roo	1 438	211.1	1 446	211.6
San Luis Potosí	1 465	492.4	1 480	493.4
Sinaloa	1 456	574.2	1 459	574.8
Sonora	1 404	530.5	1 404	530.5
Tabasco	1 447	411.3	1 450	411.6
Tamaulipas	1 461	677.8	1 463	678.3
Tlaxcala	1 434	192.7	1 440	193.0
Veracruz	1 416	1 605.0	1 418	1 606.1
Yucatán	1 434	370.8	1 442	371.9
Zacatecas	1 409	298.0	1 411	298.2
Estados Unidos Mexicanos	45 726	21 832.71	45 870	21 857.2

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 1.2
Distribución porcentual de los hogares, según material predominante en pisos de la vivienda, por entidad federativa

Entidad federativa	Material predominante				Frecuencia*	Por ciento
	Tierra	Cemento o firme	Madera, mosaico u otro recubrimiento	No especificado		
Aguascalientes	2.8	52.3	44.4	0.4	198.5	0.9
Baja California	4.6	63.9	31.1	0.3	601.6	2.8
Baja California Sur	4.2	70.4	25.3	0.2	104.8	0.5
Campeche	9.1	56.5	34.3	0.1	158.1	0.7
Coahuila	2.2	57.3	40.5	0.1	542.9	2.5
Colima	8.6	53.2	38.0	0.2	132.8	0.6
Chiapas	40.8	48.0	10.9	0.3	801.4	3.7
Chihuahua	1.6	57.3	41.1	0.0	756.9	3.5
Distrito Federal	1.2	47.3	51.4	0.2	2 124.8	9.7
Durango	10.7	60.2	28.9	0.3	324.4	1.5
Guanajuato	5.3	52.9	41.8	0.1	921.5	4.2
Guerrero	31.6	59.3	9.0	0.1	654.2	3.0
Hidalgo	13.8	63.7	22.2	0.2	493.9	2.3
Jalisco	7.7	28.0	64.0	0.4	1 393.0	6.4
México	3.7	67.9	28.1	0.3	2 864.1	13.1
Michoacán	13.6	53.5	32.7	0.2	852.6	3.9
Morelos	10.3	71.1	18.5	0.1	365.2	1.7
Nayarit	7.6	55.6	36.5	0.4	218.3	1.0
Nuevo León	2.2	49.2	48.3	0.3	887.2	4.1
Oaxaca	46.9	43.1	9.9	0.1	738.3	3.4
Puebla	15.7	52.6	31.5	0.3	1 057.8	4.8
Querétaro	6.6	65.0	28.2	0.2	295.9	1.4
Quintana Roo	7.7	57.4	34.7	0.2	211.6	1.0
San Luis Potosí	15.6	48.5	35.6	0.3	493.4	2.3
Sinaloa	10.9	62.8	26.0	0.3	574.8	2.6
Sonora	12.8	53.4	33.6	0.2	530.5	2.4
Tabasco	8.8	68.9	21.8	0.5	411.6	1.9
Tamaulipas	5.5	62.7	31.7	0.1	678.3	3.1
Tlaxcala	3.1	76.4	20.2	0.3	193.0	0.9
Veracruz	21.9	58.6	19.2	0.3	1 606.1	7.3
Yucatán	4.0	51.3	44.5	0.2	371.9	1.7
Zacatecas	7.5	66.1	26.2	0.2	298.2	1.4
Estados Unidos Mexicanos						
Localidades con 15 000 habitantes o más						
	3.0	51.0	45.7	0.3	13 386.0	61.2
Estados Unidos Mexicanos						
Localidades con 1 a 14 999						
	23.8	62.3	13.7	0.2	8 471.2	38.8
Total	11.1	55.4	33.3	0.2	21 857.2	100.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 1.3

Distribución porcentual de los hogares, según disponibilidad de agua en la vivienda, por entidad federativa

Entidad Federativa	Disponibilidad de agua				Frecuencia*	Por ciento
	Agua entubada dentro de la vivienda	Agua entubada fuera de la vivienda	Otra fuente no entubada	No especificado		
Aguascalientes	85.5	14.0	0.1	0.4	198.5	0.9
Baja California	77.9	21.1	0.9	0.1	601.6	2.8
Baja California Sur	70.6	27.1	2.3	0.0	104.8	0.5
Campeche	41.5	49.8	8.7	0.0	158.1	0.7
Coahuila	78.2	19.8	2.1	0.0	542.9	2.5
Colima	65.7	32.5	1.5	0.3	132.8	0.6
Chiapas	30.0	41.8	28.2	0.1	801.4	3.7
Chihuahua	81.8	17.6	0.6	0.0	756.9	3.5
Distrito Federal	75.9	23.9	0.1	0.0	2 124.8	9.7
Durango	46.8	46.1	7.0	0.1	324.4	1.5
Guanajuato	63.5	33.7	2.7	0.0	921.5	4.2
Guerrero	29.1	32.3	38.5	0.1	654.2	3.0
Hidalgo	44.1	51.5	4.3	0.1	493.9	2.3
Jalisco	70.9	28.0	1.1	0.0	1 393.0	6.4
México	56.8	38.6	4.6	0.0	2 864.1	13.1
Michoacán	52.3	36.5	11.1	0.1	852.6	3.9
Morelos	45.8	50.5	3.6	0.0	365.2	1.7
Nayarit	45.4	44.0	10.6	0.0	218.3	1.0
Nuevo León	84.2	14.4	1.2	0.2	887.2	4.1
Oaxaca	20.9	30.3	48.8	0.0	738.3	3.4
Puebla	40.2	38.9	20.9	0.1	1 057.8	4.8
Querétaro	61.3	35.4	3.2	0.1	295.9	1.4
Quintana Roo	47.5	50.5	2.0	0.0	211.6	1.0
San Luis Potosí	50.8	31.4	17.5	0.3	493.4	2.3
Sinaloa	62.6	34.1	3.2	0.1	574.8	2.6
Sonora	72.7	27.1	0.2	0.1	530.5	2.4
Tabasco	48.4	34.8	16.6	0.2	411.6	1.9
Tamaulipas	64.7	33.2	1.9	0.1	678.3	3.1
Tlaxcala	47.0	51.9	1.1	0.1	193.0	0.9
Veracruz	36.8	32.3	30.9	0.0	1 606.1	7.3
Yucatán	50.7	46.9	2.3	0.1	371.9	1.7
Zacatecas	61.3	27.2	11.3	0.1	298.2	1.4
Estados Unidos Mexicanos						
Localidades con 15000 habitantes o más	72.9	25.0	2.0	0.1	13 386.0	61.2
Estados Unidos Mexicanos						
Localidades con 1 a 14,999	32.7	44.5	22.8	0.0	8 471.2	38.8
Total	57.4	32.6	10.1	0.1	21 857.2	100.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de Hogar. México 2000

Cuadro 1.4
Distribución porcentual de los hogares, según disponibilidad de drenaje en la vivienda, por entidad federativa

Entidad Federativa	Disponibilidad de drenaje				Frecuencia*	Por ciento
	A la red pública	A una fosa séptica	Sin drenaje	No especificado		
Aguascalientes	92.4	1.5	5.6	0.4	198.5	0.9
Baja California	75.6	10.5	13.5	0.4	601.6	2.8
Baja California Sur	61.9	22.1	15.7	0.3	104.8	0.5
Campeche	19.1	51.7	28.9	0.2	158.1	0.7
Coahuila	67.8	26.7	5.4	0.1	542.9	2.5
Colima	83.9	10.5	5.5	0.1	132.8	0.6
Chiapas	38.4	21.8	39.7	0.1	801.4	3.7
Chihuahua	72.9	19.6	7.5	0.0	756.9	3.5
Distrito Federal	96.6	1.6	1.7	0.1	2 124.8	9.7
Durango	53.3	26.6	20.0	0.1	324.4	1.5
Guanajuato	74.7	4.6	20.7	0.0	921.5	4.2
Guerrero	29.7	16.8	53.1	0.4	654.2	3.0
Hidalgo	57.4	16.9	25.6	0.1	493.9	2.3
Jalisco	92.5	3.1	4.2	0.1	1 393.0	6.4
México	79.1	5.7	15.1	0.1	2 864.1	13.1
Michoacán	60.5	5.6	33.9	0.1	852.6	3.9
Morelos	62.4	22.5	15.0	0.1	365.2	1.7
Nayarit	45.1	44.5	10.3	0.1	218.3	1.0
Nuevo León	84.7	11.8	3.4	0.1	887.2	4.1
Oaxaca	22.1	16.5	61.3	0.1	738.3	3.4
Puebla	50.4	21.4	28.2	0.1	1 057.8	4.8
Querétaro	61.2	12.4	26.3	0.1	295.9	1.4
Quintana Roo	35.2	47.9	16.5	0.4	211.6	1.0
San Luis Potosí	55.8	15.9	28.2	0.1	493.4	2.3
Sinaloa	58.9	20.5	20.4	0.1	574.8	2.6
Sonora	72.9	8.1	18.8	0.2	530.5	2.4
Tabasco	44.5	41.9	13.1	0.5	411.6	1.9
Tamaulipas	70.4	16.4	12.9	0.4	678.3	3.1
Tlaxcala	77.6	4.9	17.1	0.3	193.0	0.9
Veracruz	38.8	41.1	19.4	0.7	1 606.1	7.3
Yucatán	7.8	55.4	36.7	0.1	371.9	1.7
Zacatecas	59.1	10.3	30.3	0.3	298.2	1.4
Estados Unidos Mexicanos						
Localidades con 15000 habitantes o más	87.8	7.4	4.7	0.1	13 386.0	61.2
Localidades con 1 a 14,999	28.9	29.3	41.6	0.3	8 471.2	38.8
Total	65.0	15.9	19.0	0.2	21 857.2	100.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de Hogar. México 2000

Cuadro 1.5

Distribución porcentual de los hogares, según nivel de cloración de agua en la vivienda,* por entidad federativa y tamaño de localidad

Entidad federativa	Tamaño de localidad	Nivel de cloración del agua**			Frecuencias***
		Abajo de la norma	Dentro de la norma	Arriba de la norma	
Aguascalientes	15 000 habitantes o más	5.7	73.7	20.5	124.7
	1 a 14 999 habitantes	13.1	54.3	32.6	44.8
	Total	7.7	68.6	23.7	169.5
Baja California	15 000 habitantes o más	9.6	34.1	56.3	471.5
	1 a 14 999 habitantes	59.7	19.3	20.9	87.0
	Total	17.4	31.8	50.8	558.5
Baja California Sur	15 000 habitantes o más	32.9	53.5	13.6	44.5
	1 a 14 999 habitantes	61.0	20.9	18.0	28.2
	Total	43.8	40.8	15.3	72.8
Campeche	15 000 habitantes o más	18.2	63.0	18.8	83.8
	1 a 14 999 habitantes	47.8	33.1	19.1	39.9
	Total	27.7	53.4	18.9	123.7
Coahuila	15 000 habitantes o más	27.0	55.3	17.7	364.9
	1 a 14 999 habitantes	30.0	53.8	16.2	88.1
	Total	27.6	55.0	17.4	453.0
Colima	15 000 habitantes o más	51.9	27.9	20.2	88.1
	1 a 14 999 habitantes	72.3	10.4	17.3	38.6
	Total	58.1	22.6	19.3	126.7
Chiapas	15 000 habitantes o más	28.8	49.0	22.2	85.2
	1 a 14 999 habitantes	92.5	3.4	4.1	310.6
	Total	78.8	13.2	8.0	395.8
Chihuahua	15 000 habitantes o más	17.7	60.8	21.5	520.7
	1 a 14 999 habitantes	82.9	12.3	4.8	194.3
	Total	35.4	47.6	17.0	715.0
Distrito Federal	15 000 habitantes o más	9.6	49.7	40.7	1 956.6
	Total	9.6	49.7	40.7	1 956.6
Durango	15 000 habitantes o más	46.3	32.4	21.3	142.0
	1 a 14 999 habitantes	88.8	9.1	2.0	113.2
	Total	65.2	22.1	12.8	255.2
Guanajuato	15 000 habitantes o más	16.8	47.8	35.4	475.1
	1 a 14 999 habitantes	87.4	6.6	6.0	358.9
	Total	47.2	30.1	22.7	834.0
Guerrero	15 000 habitantes o más	43.1	27.9	29.0	151.8
	1 a 14 999 habitantes	82.8	14.1	3.1	72.5
	Total	55.9	23.4	20.6	224.4
Hidalgo	15 000 habitantes o más	12.7	53.0	34.4	128.1
	1 a 14 999 habitantes	50.5	37.1	12.4	225.0
	Total	36.8	42.8	20.4	353.1
Jalisco	15 000 habitantes o más	39.8	38.1	22.0	849.6
	1 a 14 999 habitantes	67.3	21.4	11.3	418.1
	Total	48.9	32.6	18.5	1 267.7
México	15 000 habitantes o más	34.3	42.0	23.7	1 795.4
	1 a 14 999 habitantes	75.2	14.6	10.2	430.1
	Total	42.2	36.7	21.1	2 225.5
Michoacán	15 000 habitantes o más	44.8	38.9	16.3	291.4
	1 a 14 999 habitantes	78.4	17.5	4.1	263.5
	Total	60.8	28.7	10.5	555.0
Morelos	15 000 habitantes o más	20.1	51.2	28.8	182.7
	1 a 14 999 habitantes	23.3	55.4	21.3	113.3
	Total	21.3	52.8	25.9	296.0
Nayarit	15 000 habitantes o más	69.4	23.0	7.6	70.5
	1 a 14 999 habitantes	70.7	17.8	11.5	75.8
	Total	70.1	20.3	9.6	146.3

Continúa

Cuadro 1.5
Distribución porcentual de los hogares, según nivel de cloración de agua en la vivienda,* por entidad federativa y tamaño de localidad

(Continuación)

Entidad federativa	Tamaño de localidad	Nivel de cloración del agua**			Frecuencias***
		Abajo de la norma	Dentro de la norma	Arriba de la norma	
Nuevo León	15 000 habitantes o más	9.7	54.4	35.8	740.8
	1 a 14 999 habitantes	19.7	69.5	10.8	117.1
	Total	11.1	56.5	32.4	857.9
Oaxaca	15 000 habitantes o más	66.0	17.1	16.9	94.1
	1 a 14 999 habitantes	95.5	0.8	3.6	120.5
	Total	82.6	8.0	9.4	214.6
Puebla	15 000 habitantes o más	31.4	38.4	30.2	300.9
	1 a 14 999 habitantes	73.1	16.5	10.4	150.6
	Total	45.3	31.1	23.6	451.5
Querétaro	15 000 habitantes o más	6.5	59.1	34.4	120.9
	1 a 14 999 habitantes	26.0	49.6	24.4	125.3
	Total	16.4	54.3	29.3	246.2
Quintana Roo	15 000 habitantes o más	11.2	67.1	21.7	112.9
	1 a 14 999 habitantes	49.4	35.0	15.6	43.4
	Total	21.8	58.2	20.0	156.3
San Luis Potosí	15 000 habitantes o más	23.8	55.2	20.9	227.3
	1 a 14 999 habitantes	42.3	29.8	27.9	120.2
	Total	30.2	46.5	23.3	347.5
Sinaloa	15 000 habitantes o más	14.8	61.9	23.3	244.8
	1 a 14 999 habitantes	49.7	27.8	22.5	248.7
	Total	32.4	44.7	22.9	493.5
Sonora	15 000 habitantes o más	34.5	55.1	10.4	359.9
	1 a 14 999 habitantes	79.3	12.4	8.3	127.6
	Total	46.2	43.9	9.8	487.5
Tabasco	15 000 habitantes o más	39.8	34.8	25.5	118.2
	1 a 14 999 habitantes	51.9	26.2	21.9	186.4
	Total	47.2	29.5	23.3	304.6
Tamaulipas	15 000 habitantes o más	19.9	52.3	27.7	483.1
	1 a 14 999 habitantes	50.1	36.4	13.5	147.0
	Total	27.0	48.6	24.4	630.1
Tlaxcala	15 000 habitantes o más	22.6	59.0	18.4	51.2
	1 a 14 999 habitantes	42.5	37.1	20.4	81.1
	Total	34.8	45.6	19.6	132.3
Veracruz	15 000 habitantes o más	21.6	57.4	21.0	603.6
	1 a 14 999 habitantes	63.6	31.9	4.4	288.0
	Total	35.2	49.2	15.7	891.6
Yucatán	15 000 habitantes o más	18.5	55.8	25.7	212.7
	1 a 14 999 habitantes	74.0	13.5	12.5	81.9
	Total	33.9	44.1	22.0	294.5
Zacatecas	15 000 habitantes o más	17.2	70.0	12.8	64.5
	1 a 14 999 habitantes	65.1	18.8	16.2	164.2
	Total	51.6	33.2	15.2	228.6
Estados Unidos Mexicanos	15 000 habitantes o más	24.5	49.8	25.7	11 561.5
	1 a 14 999 habitantes	59.7	25.7	14.6	4 904.0
	Total	37.6	40.9	21.6	16 465.6

* Sólo se consideran aquellas viviendas que disponían de agua en el momento de la entrevista

** Se consideran dentro de la norma aquellas mediciones en el rango de 0.2 a 1.5 p.p.m.

*** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Características de la población

C O N T E N I D O

- Distribución porcentual de la población, según entidad federativa.
- Población, según grupos de edad y sexo.
- Población, por sexo e índice de masculinidad, según entidad federativa.
- Población por grupos de edad, según entidad federativa.
- Población de 0 a 5 años y de 65 años o más de edad, por sexo, según entidad federativa.
- Número promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más de edad, por entidad federativa.
- Población de 12 años o más de edad, por sexo, según nivel de instrucción.
- Población de 6 a 14 años de edad, por sexo, según aptitud para leer y escribir.
- Población mayor de 15 años de edad, por sexo, según condición de alfabetismo.
- Población de 7 a 14 años, por sexo, según condición de asistencia a la escuela.
- Población de 7 a 14 años de edad, por sexo, que no asiste a la escuela actualmente, según razones de inasistencia.
- Población de 12 años o más de edad, por sexo, según condición de actividad.
- Participación en la actividad económica, por sexo, según grupos de edad.
- Hogares y habitantes, según ingreso mensual del hogar en salarios mínimos.
- Hogares y sus habitantes, por cuartiles de ingreso en el hogar.
- Características de la población.
- Población, según condición de derechohabiencia y entidad federativa.
- Población por sexo, según condición de derechohabiencia.
- Población por edad, según condición de derechohabiencia.
- Población de derechohabientes y sin derechohabiencia (población abierta), según factores poblacionales.


Características de la población

- Se encuestaron 190 214 personas y, a partir de la expansión de los datos muestrales, se estima una población de 96.9 millones para el año 2000. Las cifras que se presentan en el resto del documento corresponden a los valores expandidos.
- La distribución de la población por sexo y edad, que se observa en el cuadro y pirámide de población, fue semejante a los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (XII CGPV, 2000).
- El 49.3% de la población fue del sexo masculino y, por tanto, 50.7% correspondió a mujeres. El índice de masculinidad general fue de 97.1.
- Las diferencias observadas en la distribución porcentual de la población por sexo e índice de masculinidad, por entidad federativa, deben ser consideradas en la interpretación de los resultados.
- También se observa que existieron diferencias en la distribución de la población por edad, por entidades federativas. En un extremo se tiene al Distrito Federal en donde los niños de 0 a 5 años de edad representaron sólo 11.3% y, en cambio, los mayores de 65 años son 5.2%. En el otro extremo tenemos entidades como Chiapas en donde 16.7% de la población fue de niños de 0 a 5 años de edad y los mayores de 65 años representaron sólo 3.3% de toda la población. La transición demográfica tiene momentos diferentes en las entidades federativas.
- Las tasas y proporciones que se presentan en los resultados reflejan la composición demográfica de cada entidad federativa, por lo que es importante que estas diferencias sean contempladas por los usuarios de la información.
- El número promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más de edad fue de 2.4 (En el XII CGPV, 2000 fue de 2.59).
- La proporción de la población de 6 a 14 años de edad que no tenía aptitud para leer y escribir, fue de 11%.
- La proporción de la población de 15 años y más de edad que no sabía leer y escribir en mujeres fue de 10%, y en hombres de 6%.
- La distribución porcentual del nivel de instrucción en población de 12 años y más de edad, indicó que la mediana de escolaridad corresponde al nivel de educación secundaria. Las mayores diferencias entre sexo y escolaridad se observaron en educación media superior y educación superior. En estas categorías los hombres tuvieron una mayor proporción de este nivel de instrucción.

- De los 18.3 millones de población de 7 a 14 años de edad un poco más de un millón (5.6%) no asistió a la escuela.
- De este millón de escolares y adolescentes, que no asistía a la escuela, 64 mil (6.3%) señalaron que los motivos están relacionados con la salud.
- La proporción de la población mayor de 12 años de edad que trabajaba fue de 71.9% en los hombres, y 31.7% en las mujeres. Los que se dedicaban a labores del hogar fueron 0.5% hombres y 46.5% mujeres. En conjunto, 0.4% de la población mayor de 12 años de edad refirió tener incapacidad permanente para trabajar (28 000 personas).
- El 22.5% de los hogares y 20.5 de la población, tuvieron ingresos económicos de menos de un salario mínimo mensual.
- El 44.4% de los hogares y 40.8% de la población tuvieron ingresos económicos que los ubicaron en la categoría de ingresos de menos de dos salarios mínimos mensuales.
- El análisis por cuartiles de ingreso por hogar permite identificar que 25% de los hogares con los ingresos más bajos tienen un intervalo de 0 a 1 100 pesos; el segundo cuartil (25.1% a 50% de los hogares) tienen un ingreso entre 1 101 pesos y 2 383; para el tercer cuartil (50.1% a 75%) su intervalo es de 2 384 a 4 549 pesos; al último cuartil (75.1% a 100% de los ingresos por hogar) corresponden los hogares con ingresos de 4 550 pesos y más.
- La mediana de ingreso mensual por hogar fue de 2 383 pesos.
- La distribución de los ingresos por hogar, en salarios mínimos mensuales, es semejante al anterior.
- No se analizó el autoconsumo y se sabe que el medio rural permite la provisión de algunos bienes.
- La proporción de la población que declaró no tener derecho a instituciones de seguridad social fue de 58.9% (57.1 millones). Esta proporción es semejante a la reportada en el XII CGPV 2000 (56.99%).
- La proporción de la población derechohabiente por tipo de institución fue la siguiente: IMSS 31.8%, ISSSTE 5.7%, otras instituciones de seguridad social que incluyen PEMEX, SEDENA, SEMAR y gobiernos estatales 2.1%, privadas y otras instituciones 1.8%. Los resultados del XII CGPV 2000 son semejantes y tienen la


siguiente distribución: IMSS 32.3%, ISSSTE 5.9%, otras instituciones de seguridad social que incluyen PEMEX, SEDENA y SEMAR 3.7%, privadas y otras 2.7%.

- La mayor proporción de población derechohabiente se observó en las siguientes entidades federativas: Coahuila 74.2%, Nuevo León 70%, Baja California 58.5%, Aguascalientes 56.8% y el Distrito Federal 55.8%.
- La menor proporción de población derechohabiente se observó en las siguientes entidades: Chiapas 15.7%, Oaxaca 18.8%, Guerrero 21%, Michoacán 20.6% e Hidalgo 26.4%. Por tanto, estas entidades preferentemente son atendidas principalmente por la SSA y el IMSS-Solidaridad.
- Las mayores diferencias de las poblaciones derechohabiente y no derechohabiente fueron las siguientes: 1) *El tipo de localidad*. Los no derechohabientes se distribuyeron más en localidades rurales en 54.4%, mientras que los derechohabientes fueron menos de la mitad (22.4%). 2) *Analfabetismo*. Cerca de tres veces más se concentraron los analfabetas en la población no derechohabiente. 3) *Nivel de escolaridad*. La proporción de educación básica fue mayor en los no derechohabientes, y la población con educación media superior y superior en los derechohabientes. 4) *Población económicamente inactiva*. Fueron no derechohabientes 19.1 millones y 13.5 millones son derechohabientes. 5) *Pensionados y jubilados*. Proporcionalmente hay 23 veces más en la categoría de no derechohabientes. 6) *Jornaleros, peones y trabajadores por su cuenta*. Proporcionalmente, hubo cuatro veces más jornaleros y el doble de los que trabajan por su cuenta en la categoría de no derechohabientes. 7) *Ingresos bajos en el hogar*. Proporcionalmente más de tres veces de los sujetos de hogares con ingresos menores a un salario mínimo mensual, y el doble de los sujetos de hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos pertenecen a la categoría de no derechohabientes.
- En el último cuadro de esta sección se presentan de manera resumida algunas de las características de la población que posteriormente serán utilizadas para explicar los diferenciales de riesgo de los daños a la salud, así como sobre la equidad de los sistemas de salud.



N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




N* = 13 750

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000


Figura 2.3
Porcentaje de personas mayores de 65 años de edad, según entidad federativa




N* = 4 245
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 2.4
Distribución porcentual de la población de 12 años o más de edad, por sexo, según nivel de instrucción




N* = Frecuencia ponderada en miles
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de Hogar. México 2000



N* = Frecuencia ponderada en miles
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 2.5
Distribución porcentual de la población de 6 a 14 años de edad, por sexo, según aptitud para leer y escribir

■ Sí ■ No específico
■ No




N* = Frecuencia ponderada en miles
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 2.6
Distribución porcentual de la población de 15 años o más de edad por sexo, según condición de alfabetismo

■ Sí sabe leer y escribir
■ No sabe leer y escribir

Figura 2.7
Distribución porcentual de la población de 7 a 14 años de edad, por sexo, que no asiste a la escuela actualmente, según razones de inasistencia




N*=1 016 habitantes
 N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 2.8
Distribución porcentual de la población de 12 años o más de edad, por sexo, según condición de actividad

- Trabajo**
- Se dedica a quehaceres del hogar
- Es estudiante
- Es jubilado
- Tenía trabajo, pero no trabajó
- Buscó trabajo
- Está incapacitado(a) permanentemente para trabajar
- No trabaja por otras razones
- No especificado



N*= Frecuencia ponderada en miles
 ** Incluye a las personas que se declararon sin trabajo en la pregunta de condición de actividad, pero que realizaron alguna de las actividades citadas en la pregunta de verificación de actividad
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de Hogar. México 2000




Figura 2.9
Distribución porcentual de los hogares y sus habitantes, según ingreso mensual del hogar en salarios mínimos

N*=21 536 hogares
N*=96 449 población
N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000





Figura 2.10
Porcentaje de la población, según condición de derechohabiente*

N*=96 959 población
N*=Frecuencia ponderada en miles
* Incluye múltiples derechohabientes
** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales
*** Otras instituciones sin especificar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 2.11
Porcentaje de la población por edad, según su condición de derechohabiencia*



N*=96 959 población

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Incluye multiples derechohabiencias

** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

*** Otras instituciones sin especificar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.1

Distribución porcentual de la población, según entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Muestral</i>	<i>Ponderado</i>	
		<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>
Aguascalientes	6 351	940.0	1.0
Baja California	5 748	2 464.0	2.5
Baja California Sur	5 157	418.3	0.4
Campeche	6 096	687.7	0.7
Coahuila	5 621	2 285.2	2.4
Colima	5 725	536.8	0.6
Chiapas	5 812	3 901.9	4.0
Chihuahua	5 041	3 036.0	3.1
Distrito Federal	4 790	8 549.4	8.8
Durango	6 140	1 440.4	1.5
Guanajuato	6 721	4 647.8	4.8
Guerrero	6 154	3 063.4	3.2
Hidalgo	6 206	2 226.6	2.3
Jalisco	6 267	6 293.1	6.5
México	5 995	13 055.8	13.5
Michoacán	6 083	3 958.4	4.1
Morelos	5 739	1 544.7	1.6
Nayarit	5 803	909.8	0.9
Nuevo León	5 855	3 810.6	3.9
Oaxaca	6 334	3 419.0	3.5
Puebla	6 115	5 052.7	5.2
Querétaro	6 221	1 397.9	1.4
Quintana Roo	5 869	870.3	0.9
San Luis Potosí	6 486	2 289.7	2.4
Sinaloa	5 950	2 520.1	2.6
Sonora	5 490	2 188.7	2.3
Tabasco	6 384	1 883.5	1.9
Tamaulipas	5 684	2 733.4	2.8
Tlaxcala	6 229	956.9	1.0
Veracruz	5 604	6 879.2	7.1
Yucatán	6 454	1 650.6	1.7
Zacatecas	6 090	1 347.1	1.4
Estados Unidos Mexicanos	190 214	96 959.0	100.0

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.2
Población según grupos de edad y sexo

Grupo de edad	Hombre		Mujer		Total	
	Frecuencia*	Por ciento	Frecuencia*	Por ciento	Frecuencia*	Por ciento
0-4	5 808.6	6.0	5 621.7	5.8	11 430.3	11.8
5-9	5 875.1	6.1	5 700.5	5.9	11 575.6	11.9
10-14	5 752.8	5.9	5 605.3	5.8	11 358.1	11.7
15-19	5 346.3	5.5	5 449.1	5.6	10 795.3	11.1
20-24	4 835.7	5.0	5 173.7	5.3	10 009.5	10.3
25-29	3 893.7	4.0	4 217.4	4.3	8 111.1	8.4
30-34	3 358.6	3.5	3 632.2	3.7	6 990.8	7.2
35-39	2 986.0	3.1	3 208.1	3.3	6 194.2	6.4
40-44	2 311.9	2.4	2 403.4	2.5	4 715.3	4.9
45-49	1 874.9	1.9	1 964.0	2.0	3 838.9	4.0
50-54	1 507.1	1.6	1 568.1	1.6	3 075.2	3.2
55-59	1 150.1	1.2	1 218.4	1.3	2 368.4	2.4
60-64	986.3	1.0	1 073.0	1.1	2 059.3	2.1
65-69	714.8	0.7	796.4	0.8	1 511.2	1.6
70-74	552.1	0.6	591.4	0.6	1 143.5	1.2
75-79	336.4	0.3	369.0	0.4	705.4	0.7
80 y más	385.7	0.4	499.1	0.5	884.8	0.9
No especificado	96.0	0.1	96.1	0.1	192.1	0.2
Estados Unidos Mexicanos	47 772.2	49.3	49 186.8	50.7	96 959.0	100.0

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.3
Distribución porcentual de la población, por sexo e índice de masculinidad, según entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Índice de masculinidad*</i>
Aguascalientes	48.9	51.1	95.7
Baja California	50.4	49.6	101.6
Baja California Sur	50.9	49.1	103.7
Campeche	50.3	49.7	101.2
Coahuila	49.8	50.2	99.0
Colima	49.7	50.3	98.9
Chiapas	50.1	49.9	100.3
Chihuahua	49.8	50.2	99.3
Distrito Federal	48.0	52.0	92.3
Durango	49.5	50.5	98.1
Guanajuato	48.5	51.5	94.3
Guerrero	49.2	50.9	96.7
Hidalgo	49.4	50.6	97.5
Jalisco	48.8	51.2	95.4
México	49.3	50.7	97.4
Michoacán	48.7	51.3	94.8
Morelos	48.9	51.1	95.7
Nayarit	50.1	50.0	100.2
Nuevo León	50.0	50.0	100.0
Oaxaca	49.0	51.0	96.1
Puebla	48.7	51.3	95.0
Querétaro	49.2	50.8	96.9
Quintana Roo	51.4	48.6	105.8
San Luis Potosí	49.4	50.6	97.7
Sinaloa	50.1	49.9	100.4
Sonora	50.3	49.7	101.1
Tabasco	49.9	50.1	99.5
Tamaulipas	49.6	50.4	98.5
Tlaxcala	49.3	50.7	97.1
Veracruz	49.3	50.7	97.3
Yucatán	49.7	50.3	98.7
Zacatecas	49.1	50.9	96.3
Estados Unidos Mexicanos	49.3	50.7	97.1

*Resultado de dividir la población masculina entre la femenina, multiplicado por cien
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.4
Distribución porcentual de la población, por grupos de edad, según entidad federativa

Entidad Federativa	Años										Total
	0 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 y más	No especificado	
Agascalientes	25.5	23.3	18.7	13.3	8.3	4.9	3.2	1.8	0.9	0.1	100
Baja California	23.6	20.2	21.3	15.1	8.9	5.3	3.3	1.6	0.6	0.0	100
Baja California Sur	22.8	21.8	19.7	15.4	9.2	5.4	3.2	1.6	0.7	0.2	100
Campeche	25.0	23.3	18.2	13.4	8.6	5.2	3.5	1.8	0.8	0.3	100
Coahuila	22.8	22.0	19.3	14.2	9.2	5.9	3.8	1.9	0.8	0.1	100
Colima	22.9	23.2	18.4	13.9	9.0	5.6	3.6	2.2	1.1	0.1	100
Chiapas	28.3	24.9	17.2	12.0	7.7	4.7	2.9	1.4	0.7	0.2	100
Chihuahua	23.3	21.0	19.9	14.2	8.8	6.0	3.9	1.9	0.8	0.3	100
Distrito Federal	18.5	19.2	21.1	16.1	10.6	6.6	4.4	2.3	1.0	0.2	100
Durango	24.8	23.8	17.4	12.5	8.3	5.8	4.1	2.0	1.0	0.2	100
Guanajuato	25.5	24.3	17.9	12.4	8.0	5.1	3.6	1.9	1.1	0.2	100
Guerrero	27.0	24.8	16.1	11.8	8.0	5.3	3.7	1.9	1.0	0.4	100
Hidalgo	24.5	24.1	17.2	13.0	8.6	5.6	3.7	2.1	1.0	0.2	100
Jalisco	23.7	23.2	18.3	13.0	8.8	5.6	3.7	2.2	1.1	0.3	100
México	23.5	22.6	20.1	14.6	8.9	5.1	3.0	1.4	0.6	0.2	100
Michoacán	25.0	24.8	16.8	12.0	8.2	5.4	4.0	2.3	1.2	0.4	100
Morelos	23.1	22.8	18.4	13.8	9.0	5.8	4.1	2.0	1.0	0.1	100
Nayarit	23.9	23.8	17.0	12.5	8.8	6.1	4.1	2.3	1.2	0.2	100
Nuevo León	20.7	21.2	21.1	14.9	9.4	6.2	3.8	1.9	0.9	0.1	100
Oaxaca	26.0	24.6	15.6	11.8	8.3	5.8	4.2	2.2	1.1	0.5	100
Puebla	25.3	24.2	17.3	12.4	8.3	5.5	3.8	2.1	1.0	0.1	100
Querétaro	25.5	24.1	18.7	13.3	8.0	4.7	3.0	1.6	0.8	0.2	100
Quintana Roo	26.2	21.8	21.9	14.9	7.8	3.9	2.1	1.0	0.4	0.1	100
San Luis Potosí	25.4	23.8	16.9	12.3	8.3	5.7	4.1	2.1	1.1	0.3	100
Sinaloa	23.3	23.4	18.6	13.3	9.0	5.9	3.7	1.9	0.9	0.1	100
Sonora	22.7	21.6	19.2	14.5	9.3	6.0	3.8	1.9	0.8	0.0	100
Tabasco	25.2	24.8	18.6	13.3	8.1	4.7	3.0	1.4	0.7	0.2	100
Tamaulipas	21.9	21.3	20.0	14.4	9.1	6.2	4.1	2.0	0.9	0.1	100
Tlaxcala	24.5	24.3	18.3	13.1	7.9	5.1	3.7	2.1	1.1	0.0	100
Veracruz	23.5	22.9	17.7	13.5	9.2	6.1	4.0	2.0	0.9	0.2	100
Yucatán	23.2	22.6	17.8	12.9	9.5	6.0	4.1	2.6	1.2	0.2	100
Zacatecas	24.9	24.9	16.9	11.8	7.8	5.7	4.3	2.3	1.3	0.2	100
Estados Unidos Mexicanos	23.7	22.8	18.7	13.6	8.8	5.6	3.7	1.9	0.9	0.2	100.0
Porcentaje*	23 005.9	22 153.4	18 120.6	13 185.0	8 554.2	5 443.6	3 570.6	1 848.9	884.8	192.1	96 959.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.5

Porcentaje de personas de 0 a 5 años y de 65 años o más de edad, por sexo, según entidad federativa

Entidad federativa	0 a 5 años			65 años o más		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Aguascalientes	7.7	7.7	15.4	1.8	2.2	4.0
Baja California	7.3	7.4	14.8	1.7	1.9	3.6
Baja California Sur	6.7	6.4	13.1	1.8	1.8	3.6
Campeche	7.5	7.0	14.6	2.2	1.9	4.1
Coahuila	7.2	6.8	14.0	2.1	2.3	4.3
Colima	6.9	6.8	13.7	2.3	2.5	4.8
Chiapas	8.4	8.3	16.7	1.7	1.6	3.3
Chihuahua	7.2	7.2	14.4	2.1	2.2	4.3
Distrito Federal	5.7	5.6	11.3	2.1	3.1	5.2
Durango	7.5	7.2	14.7	2.3	2.4	4.7
Guanajuato	8.0	7.7	15.7	2.1	2.4	4.5
Guerrero	8.1	8.2	16.3	2.1	2.3	4.4
Hidalgo	7.3	7.0	14.3	2.2	2.5	4.6
Jalisco	7.1	6.8	13.9	2.3	2.6	4.9
México	7.0	6.8	13.8	1.4	1.8	3.2
Michoacán	7.3	7.3	14.6	2.4	2.7	5.1
Morelos	7.0	7.0	14.0	2.3	2.5	4.8
Nayarit	7.2	7.0	14.1	2.7	2.6	5.3
Nuevo León	6.6	6.2	12.8	2.0	2.3	4.3
Oaxaca	7.8	7.5	15.3	2.4	2.6	5.0
Puebla	7.8	7.5	15.3	2.2	2.6	4.7
Querétaro	7.7	7.6	15.3	1.7	2.0	3.7
Quintana Roo	8.3	8.0	16.3	1.2	0.9	2.1
San Luis Potosí	7.9	7.6	15.4	2.5	2.5	5.0
Sinaloa	7.0	6.7	13.7	2.2	2.2	4.4
Sonora	6.9	6.9	13.7	2.1	2.2	4.3
Tabasco	7.7	7.2	14.9	1.7	1.6	3.4
Tamaulipas	7.0	6.7	13.7	2.2	2.4	4.6
Tlaxcala	7.5	7.3	14.8	2.3	2.5	4.8
Veracruz	6.8	6.6	13.4	2.2	2.4	4.6
Yucatán	7.1	6.9	14.1	2.8	2.8	5.6
Zacatecas	7.4	7.2	14.6	2.7	2.7	5.5
Estados Unidos Mexicanos						
Porcentaje	7.2	7.0	14.2	2.1	2.3	4.4
Frecuencia*	6 970.1	6 780.4	13 750.5	1 989.0	2 255.9	4 244.9

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.6
Número promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más de edad, por entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Mujeres*</i>	<i>Número promedio de hijos</i>
Aguascalientes	330.2	2.5
Baja California	875.1	2.5
Baja California Sur	147.8	2.2
Campeche	234.7	2.4
Coahuila	839.3	2.3
Colima	193.8	2.3
Chiapas	1 272.2	2.5
Chihuahua	1 089.2	2.3
Distrito Federal	3 439.5	1.9
Durango	506.6	2.8
Guanajuato	1 672.3	2.4
Guerrero	1 045.6	2.8
Hidalgo	786.9	2.6
Jalisco	2 310.5	2.6
México	4 684.9	2.3
Michoacán	1 410.5	2.8
Morelos	568.3	2.5
Nayarit	319.0	2.8
Nuevo León	1 413.7	2.1
Oaxaca	1 187.5	2.9
Puebla	1 787.2	2.8
Querétaro	487.2	2.6
Quintana Roo	285.2	2.2
San Luis Potosí	792.6	2.7
Sinaloa	894.8	2.5
Sonora	781.6	2.3
Tabasco	647.4	2.4
Tamaulipas	1 008.5	2.3
Tlaxcala	341.3	2.5
Veracruz	2 486.7	2.4
Yucatán	591.7	2.5
Zacatecas	482.8	2.9
Estados Unidos Mexicanos	34 914.9	2.4

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.7

Distribución porcentual de la población de 12 o más de edad, por sexo, según nivel de instrucción

<i>Nivel de instrucción</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Sin instrucción	3.0	4.5	3.8
Con primaria incompleta	20.0	21.2	20.6
Con primaria completa	18.4	20.4	19.4
Con secundaria	28.1	23.6	25.8
Carrera técnica o comercial	4.9	9.7	7.4
Preparatoria o normal básica	12.5	9.7	11.1
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	8.8	5.9	7.3
No especificado	4.3	5.0	4.7
Población de 12 años o más de edad			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	33 660.6	35 522.1	69 182.7

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.8

Distribución porcentual de la población de 6 a 14 años, por sexo, según aptitud para leer y escribir

<i>Aptitud para leer y escribir</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Sí	87.9	89.4	88.6
No	11.4	10.0	10.7
No especificado	0.7	0.6	0.7
Población de 6 a 14 años			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	10 466.4	10 147.0	20 613.4

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.9

Distribución porcentual de la población de 15 años o más, por sexo, según condición de alfabetismo

<i>Condición de alfabetismo</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Sí sabe leer y escribir	93.8	89.9	91.8
No sabe leer ni escribir	6.1	9.9	8.1
No sabe o no responde	0.1	0.2	0.1
Población de 15 años o más			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	30 239.7	32 163.2	62 402.9

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.10
Distribución porcentual de la población de 7 a 14 años, por sexo, según condiciones de asistencia actual a la escuela

<i>Asistencia actual a la escuela</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Sí	94.4	94.1	94.2
No	5.5	5.7	5.6
No especificado	0.1	0.2	0.2
Población de 7 a 14 años			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	9 254.9	9 018.2	18 273.1

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.11
Distribución de la población de 7 a 14 años, por sexo que no asiste a la escuela actualmente, según razones de inasistencia

<i>Razones de inasistencia</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
No quiso o no le gustó estudiar	40.7	37.4	39.1
Falta de dinero o recursos	16.4	18.8	17.6
Nunca ha ido a la escuela	15.2	13.4	14.3
Motivos de salud	5.7	6.9	6.3
Tenía que trabajar	5.4	2.3	3.9
Su familia ya no lo(a) dejó	1.0	3.8	2.4
No había escuela o estaba muy lejos	1.9	1.5	1.7
Por ayudar a las tareas del hogar	0.5	1.1	0.8
Se casó (unió)	0.1	0.8	0.5
Otro motivo	6.7	8.1	7.4
No especificado	6.2	5.7	6.0
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	504.5	511.1	1 015.6

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.12

Distribución porcentual de la población de 12 o más, por sexo, según condición de actividad

<i>Condición de actividad</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Trabajo*	71.9	31.7	51.2
Se dedica a quehaceres del hogar	0.5	46.5	24.1
Es estudiante	16.3	16.0	16.2
Es jubilado	2.0	0.8	1.4
Tenía trabajo, pero no trabajó	1.2	0.4	0.7
Buscó trabajo	0.7	0.2	0.5
Está incapacitado(a) permanente para trabajar	0.6	0.3	0.4
No trabaja por otras razones	6.5	4.0	5.2
No especificado	0.3	0.1	0.3
Porciento	100	100	100.0
Frecuencia**	33 660.6	35 522.1	69 182.7

* Incluye a las personas que se declararon sin trabajo en la pregunta de condición de actividad, pero que realizaron alguna de las actividades citadas en la pregunta de verificación de actividad

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.13

Tasas específicas para la población de 12 años o más con participación en la actividad económica,* por sexo, según grupos de edad

<i>Grupos de edad</i>	<i>Tasas específicas de participación económica</i>		<i>Total</i>
	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	
12 a 14 años	13.7	6.1	9.9
15 a 19 años	49.3	25.2	37.1
20 a 24 años	82.5	39.9	60.5
25 a 29 años	94.4	40.7	66.5
30 a 34 años	95.7	40.0	66.8
35 a 39 años	95.8	44.1	69.0
40 a 44 años	95.9	40.5	67.7
45 a 49 años	94.5	39.3	66.3
50 a 54 años	88.4	34.8	61.1
55 a 59 años	84.8	28.5	55.8
60 a 64 años	72.7	24.2	47.4
65 y más años	48.1	14.7	30.3
Tasas de participación en la actividad económica	73.7	32.3	52.4
Población de 12 años o más con participación en actividad económica**	24 818.1	11 456.6	36 274.7

*Es la proporción de la población de 12 años o más disponible para la actividad económica: PEA/Población de 12 años o más

** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.14
**Distribución de los hogares y sus habitantes,
 según ingreso mensual del hogar en salarios mínimos**

<i>Ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos</i>	<i>Hogares</i>		<i>Habitantes</i>	
	<i>Frecuencias*</i>	<i>Por ciento</i>	<i>Frecuencias*</i>	<i>Por ciento</i>
Menos de un salario mínimo mensual	4 852.0	22.5	19 755.3	20.5
De 1 a 1.9	4 714.1	21.9	19 540.3	20.3
De 2 a 2.9	3 410.9	15.8	15 131.0	15.7
De 3 a 4.9	3 992.8	18.5	19 060.4	19.8
De 5 a 9.9	3 142.4	14.6	15 873.0	16.5
De 10 o más	1 423.6	6.6	7 088.8	7.3
Estados Unidos Mexicanos	21 535.7	100.0	96 448.8	100.0

Se excluye 1.5% de No Respuesta

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.15
Distribución de los hogares y sus habitantes por cuartiles de ingreso mensual en el hogar

<i>Cuartil</i>	<i>Intervalo de ingreso**</i>	<i>Hogares</i>		<i>Habitantes</i>	
		<i>Frecuencias*</i>	<i>Por ciento</i>	<i>Frecuencias*</i>	<i>Por ciento</i>
I	0 a 1100	5 104.3	23.7	21 894.4	22.7
II	1 101 a 2 383	5 481.5	25.5	22 667.3	23.5
III	2 384 a 4 549	5 476.9	25.4	24 830.4	25.7
IV	4 550 y más	5 472.9	25.4	27 056.7	28.1
	Estados Unidos Mexicanos	21 535.7	100.0	96 448.8	100.0

Se excluye 1.5% de No Respuesta

*Cantidad en miles

** Cantidad en pesos

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.16

Porcentaje de población según condición de derechohabiencia* y entidad federativa

Entidad federativa	IMSS	ISSSTE	Otras instituciones de seguridad social**	Privadas	Otras***	Ninguna
Aguascalientes	46.7	7.4	1.2	1.3	1.1	43.2
Baja California	49.0	6.4	0.5	1.9	1.0	41.5
Baja California Sur	41.3	16.7	2.6	1.0	0.8	39.0
Campeche	24.1	8.5	4.2	0.1	0.3	63.0
Coahuila	65.1	6.4	1.4	1.3	0.5	26.8
Colima	42.4	7.8	1.5	0.4	0.5	48.9
Chiapas	9.2	4.3	1.6	0.5	0.2	84.3
Chihuahua	47.5	4.6	2.0	1.3	1.0	44.2
Distrito Federal	36.4	11.4	2.2	2.0	0.5	48.4
Durango	36.8	9.1	1.0	0.5	1.2	52.1
Guanajuato	26.8	5.3	0.7	1.8	1.7	64.2
Guerrero	13.0	6.7	0.9	0.3	0.1	79.0
Hidalgo	17.7	5.8	1.4	0.6	1.2	73.4
Jalisco	41.0	2.4	0.9	1.0	0.4	55.3
México	36.3	3.9	3.0	0.5	0.5	55.3
Michoacán	14.6	4.4	0.8	0.3	0.7	79.4
Morelos	26.8	8.1	2.5	0.5	0.5	62.2
Nayarit	30.1	8.7	1.2	0.4	1.5	58.7
Nuevo León	60.9	2.6	3.2	3.7	1.1	30.0
Oaxaca	9.3	5.6	3.3	0.2	0.2	81.2
Puebla	19.7	5.0	1.4	0.7	1.3	72.2
Querétaro	42.2	3.6	0.8	0.9	1.1	51.1
Quintana Roo	33.3	7.1	1.6	0.7	0.4	56.9
San Luis Potosí	28.3	5.7	1.4	1.6	2.9	61.0
Sinaloa	42.1	6.3	1.7	0.8	0.4	49.6
Sonora	38.9	9.1	0.8	3.0	1.1	47.5
Tabasco	14.4	6.2	8.6	0.4	1.4	69.5
Tamaulipas	40.8	7.2	4.2	1.1	0.8	47.5
Tlaxcala	25.6	7.5	1.3	1.4	0.8	63.5
Veracruz	21.7	3.3	4.0	0.3	0.8	69.8
Yucatán	37.5	6.0	1.2	0.7	0.4	54.5
Zacatecas	21.9	5.4	0.9	0.2	0.3	72.0
Estados Unidos Mexicanos						
Porcentaje	31.8	5.7	2.1	1.0	0.8	58.9
Frecuencia****	30 872.9	5 513.9	2 066.8	1 001.0	750.9	57 143.0

*Incluye múltiples derechohabiencias

** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

***Otras instituciones sin especificar

****Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.17
Porcentaje de la población, por sexo, según condición de derechohabiencia*

<i>Derechohabiencia</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
IMSS	31.8	31.8	31.8
ISSSTE	5.3	6.1	5.7
Otras instituciones de seguridad social**	2.1	2.2	2.1
Privadas	1.0	1.0	1.0
Otras***	0.8	0.8	0.8
Ninguna	59.3	58.6	58.9
Estados Unidos Mexicanos	100.3	100.5	100.3
Frecuencia****	47 772.2	49 186.8	96 959.0

*Incluye múltiples derechohabiencias

** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

***Otras instituciones sin especificar

**** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.18
Porcentaje de la población, por edad, según condición de derechohabiencia*

<i>Derechohabiencia</i>	<i>0 a 9 años</i>	<i>10 a 19 años</i>	<i>20 años</i>	<i>No o más</i>	<i>Total especificado</i>
IMSS	28.2	27.9	35.3	12.4	31.8
ISSSTE	4.5	5.3	6.4	7.3	5.7
Otras de seguridad social**	2.0	1.8	2.3	2.6	2.1
Privadas	0.9	0.8	1.2	0.6	1.0
Otras***	0.8	0.9	0.7	0.0	0.8
Ninguna	63.8	63.6	54.7	76.0	58.9
No especificado	0.5	0.4	0.4	1.1	0.5
Estados Unidos Mexicanos					
Porcentaje	100.6	100.8	101.0	100.0	100.9
Frecuencias****	23 005.9	22 153.4	51 607.6	192.1	96 959.0

*Incluye múltiples derechohabiencias

** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

***Otras instituciones sin especificar

****Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.19

Distribución de la población derechohabiente* y no derechohabiente, según características demográficas

<i>Factores poblacionales</i>	<i>Proporción de la población derechohabiente (por cien)</i>	<i>Frecuencia ponderada de la población derechohabiente**</i>	<i>Proporción de la población abierta (por cien)</i>	<i>Frecuencia ponderada de la población abierta**</i>
Edad				
0-9	20.8	8 190.2	25.7	14 686.1
10-19	20.3	7 969.8	24.7	14 094.7
20 o más	58.8	23 146.7	49.3	28 216.0
No especificado	0.1	44.0	0.3	145.9
Total	100.0	39 350.6	100.0	57 142.9
Sexo				
Hombre	48.8	19 218.5	49.5	28 308.4
Mujer	51.2	20 132.1	50.5	28 834.5
Total	100.0	39 350.6	100.0	57 142.9
Tamaño de localidad				
1 a 14 999 habitantes	22.4	8 829.9	54.4	31 071.6
15 000 habitantes o más	77.6	30 520.7	45.6	26 071.3
Total	100.0	39 350.6	100.0	57 143.0
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años)				
Sí	92.0	6 595.6	86.8	11 612.0
No	7.5	535.8	12.5	1 663.8
No especificado	0.6	40.9	0.7	87.1
Total	100.0	7 172.3	100.0	13 362.9
Alfabeta (Población de 15 años o más)				
Sí	95.9	26 008.7	88.6	31 022.2
No	4	1 073.8	11.3	3 925.3
No especificado	0.1	25.4	0.1	49.3
Total	100.0	27 108.0	100.0	34 996.8
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más)				
Sin instrucción	1.8	543.1	5.2	2 052.6
Con primaria incompleta	14.9	4 398.5	24.9	9 806.6
Con primaria completa	16.9	4 970.4	21.3	8 406.9
Con secundaria	25.8	7 606.0	25.7	10 152.5
Carrera técnica o comercial	10.7	3 142.0	4.9	1 931.2
Preparatoria o normal básica	14.5	4 272.8	8.5	3 332.5
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	11.7	3 458.8	4.0	1 586.5
No especificado	3.6	1 055.7	5.5	2 151.2
Total	100.0	29 447.3	100.0	39 419.9
Condición de actividad (Población de 12 años o más)				
Total			Total	
Población económicamente activa	54.1	15 926.3	51.1	20 149.6
Población económicamente inactiva	45.7	13 471.4	48.7	19 174.4
No especificado	0.2	49.6	0.2	95.9
Total	100.0	29 447.3	100.0	39 419.9
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más)				
Pensionados o jubilados	6.8	910.2	0.3	62.3
Estudiantes	36.7	4 948.3	32.4	6 203.3
Actividades del hogar	47	6 333.1	53.8	10 314.4
Discapacitados	0.9	118.9	0.9	173.4
No trabajan por otras razones	8.6	1 160.8	12.6	2 421.0
Total	100.0	13 471.4	100.0	19 174.4

Continúa

Cuadro 2.19
**Distribución de la población derechohabiente* y no derechohabiente,
 según características demográficas**

(Continuación)				
<i>Factores poblacionales</i>	<i>Proporción de la población derechohabiente (por cien)</i>	<i>Frecuencia ponderada de la población derechohabiente**</i>	<i>Proporción de la población abierta (por cien)</i>	<i>Frecuencia ponderada de la población abierta**</i>
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)				
Jornaleros o peones	3	481.9	12.9	2 558.9
Empleados u obreros	78.6	1 2468.7	34.2	6 802.6
Trabajadores sin pago	1.8	287.0	8.0	1 598.6
Trabajadores por su cuenta	15.5	2460.1	43.4	8 647.9
Patrones	0.8	123.7	1.1	221.9
No especificado	0.3	43.1	0.4	70.8
Total	100.0	1 5864.6	100.0	19 900.7
Población según ingreso en el hogar en salarios mínimos				
Menos de un salario mínimo mensual	10.2	3977.1	27.5	15 648.0
De 1 a 1.9	15.0	5864.9	23.9	13 596.0
De 2 a 2.9	15.9	6223.2	15.6	8 852.8
De 3 a 4.9	23.2	9079.9	17.4	9 915.3
De 5 a 9.9	23.9	9352.6	11.4	6 444.7
De 10 o más	11.9	4659.7	4.2	2 391.6
Total	100.0	3 9157.4	100.0	56 848.4
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar				
Cuartil	(Intervalos de ingreso en pesos)			
I	0 a 1100	11.5	4499.2	30.4
II	1 101 a 2 383	18.1	7085.8	27.2
III	2 384 a 4 549	29.0	1 1354.9	23.6
IV	4 550 y más	41.4	1 6217.5	18.9
Total		100.0	39 157.4	100.0

*Como derechohabientes se consideran aquellas persona que tiene derecho a servicio médico en el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex, en alguna clínica u hospital particular o en alguna otra institución de seguridad social estatal

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 2.20
Resumen de las características poblacionales

<i>Características poblacionales</i>	<i>Proporción de la población (por cien)</i>	<i>Frecuencia ponderada de la población *</i>
Edad		
0-9	23.7	23 005.9
10-19	22.8	22 153.4
20 o más	53.3	51 607.6
No especificado	0.2	192.1
Total	100.0	96 959.0
Sexo		
Hombre	49.3	47 772.2
Mujer	50.7	49 186.8
Total	100.0	96 959.0
Tamaño de localidad		
1 a 14 999 habitantes	41.4	40 107.5
15 000 habitantes o más	58.6	56 851.5
Total	100.0	96 959.0
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años)		
Sí	88.6	18 271.2
No	10.7	2 208.0
No especificado	0.7	134.2
Total	100.0	20 613.4
Alfabeta (Población de 15 años o más)		
Sí	91.8	57 294.9
No	8.1	5 025.6
No especificado	0.1	82.4
Total	100.0	62 402.9
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	3.8	2 610.3
Con primaria incompleta	20.6	14 249.1
Con primaria completa	19.4	13 431.9
Con secundaria	25.8	17 835.8
Carrera técnica o comercial	7.4	5 103.2
Preparatoria o normal básica	11.1	7 647.1
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	7.3	5 072.3
No especificado	4.7	3 232.9
Total	100.0	69 182.7
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Total		
Población económicamente activa	52.4	36 274.7
Población económicamente inactiva	47.3	32 750.2
No especificado	0.2	157.9
Total	100.0	69 182.7
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más de edad)		
Pensionados o jubilados	3.0	974.4
Estudiantes	34.1	11 180.1
Actividades del hogar	51.0	16 702.0
Discapacitados	0.9	296.9
No trabajan por otras razones	11.0	3 596.7
Total	100.0	32 750.2

Continúa

Cuadro 2.20
Resumen de las características poblacionales

(Continuación)

<i>Características poblacionales</i>	<i>Proporción de la población (por cien)</i>	<i>Frecuencia ponderada de la población *</i>
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)		
Jornaleros o peones	8.5	3 050.9
Empleados u obreros	53.9	19 387.2
Trabajadores sin pago	5.3	1 894.5
Trabajadores por su cuenta	31.0	11 158.4
Patrones	1.0	346.1
No especificado	0.3	125.3
Total	100.0	35 962.3
Población según ingreso en el hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo mensual	20.5	19 755.3
De 1 a 1.9	20.3	19 540.3
De 2 a 2.9	15.7	15 131.0
De 3 a 4.9	19.8	19 060.4
De 5 a 9.9	16.5	15 873.0
De 10 o más	7.2	7 088.8
Total	100.0	96 448.8
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar		
Cuartil (Intervalos de ingreso en pesos)		
I 0 a 1100	22.7	21 894.4
II 1 101 a 2 383	23.5	22 667.3
III 2 384 a 4 549	25.7	24 830.4
IV 4 550 y más	28.1	27 056.7
Total	100.0	96 448.8

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Necesidades de salud

C O N T E N I D O

Percepción sobre condición de salud

- Población por sexo, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses.
- Población, por grupos de edad, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses.
- Población según percepción del estado de salud, por entidad federativa.
- Población de cinco años o más de edad, por nivel de escolaridad, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses.
- Percepción del estado de salud de la población, según factores poblacionales.

Morbilidad

- Prevalencia lápsica según grupos de edad y sexo, de algún problema de salud en las dos semanas previas.
- Prevalencia lápsica de algún problema de salud en las dos semanas previas a la encuesta, según entidad federativa y grupos de edad.
- Prevalencia lápsica de algún problema de salud en las dos semanas previas, según entidad federativa y tipo de localidad.
- Prevalencia lápsica de algún problema de salud en las dos semanas previas para la población de cinco años de edad o más, según percepción de su estado de salud y nivel de escolaridad .

- Población que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según tipo de problema y grupo de edad.
- Población por sexo, que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según tipo de problema.
- Población que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según percepción de la gravedad.
- Tasas de prevalencia lápsica de problemas de salud, según factores poblacionales .

Discapacidad

- Población total, por sexo, según existencia de algún tipo de discapacidad.
- Población discapacitada, por sexo, según tipo de discapacidad.
- Población discapacitada, por sexo, según tipo de discapacidad por grupos de edad.
- Población discapacitada, por sexo, según tipo de discapacidad y grupos de edad.
- Población discapacitada, por sexo, según percepción de la severidad de su discapacidad.
- Población discapacitada, por sexo, según causa de discapacidad.
- Población discapacitada, por sexo, según percepción de la severidad y tipo de la discapacidad.
- Tasa de discapacidad, según características de la población.

Necesidades de salud

Percepción sobre condición de salud

- De los 96.9 millones de mexicanos, 57.6 millones (59.5%) consideraron que gozaban de buena salud, 33.8 millones (34.9%) consideraron que su estado de salud es regular, y 4.8 millones (4.9%) percibieron que su salud es mala o muy mala.
- La proporción de mujeres con mala percepción de salud fue mayor (5.7%), en relación con los hombres (4.1%).
- La proporción de adultos con mala percepción de salud fue mayor (7.3%), en relación con los niños (2.4%) y los adolescentes (2%).
- Las entidades federativas que tuvieron los mayores porcentajes de población con buena percepción de salud se ubican en el norte del país y son: Chihuahua (74.9%), Coahuila (74.7%), Nuevo León (73.2%), Baja California Sur (71.6%) y Sonora (71.3%).
- Las entidades federativas que tuvieron los más altos porcentajes de población con mala percepción de salud fueron: Durango (6.9%), Zacatecas (6.4%), Guerrero (6.3%), Chiapas (6.2%) y Michoacán (6.1%).
- Las tasas que se presentan no están ajustadas por edad, sexo u otras condiciones, por tanto reflejan los diferenciales y la composición demográfica de cada entidad federativa. Es importante que esto lo consideren los usuarios de la información.
- Se observa una asociación positiva entre el nivel de escolaridad y la percepción de mejor estado de salud. La población sin instrucción tuvo una percepción de mala salud del doble, en relación con los que tienen educación superior. Al mismo tiempo, la proporción de la población con educación superior que tuvo una buena percepción sobre su estado de salud en una cuarta parte mayor que los que tienen educación media, básica o sin instrucción.
- Las variables poblacionales que se asociaron a una mala percepción del estado de salud fueron:
 - Analfabetismo (15.2%)
 - Jubilación (14.6%)

- Discapacidad (13.4%)
- Bajos ingresos en el hogar (6.9%)
- Trabajar como jornaleros (6.1%) y trabajadores por su cuenta (4.4%)
- Edad adulta (6.7%)
- Sexo femenino (5.3%)
- Ruralidad (5.2%)

Morbilidad

- De los 96.9 millones de mexicanos, se estima que 14.1 millones (14.6%) informaron haber estado enfermos en las últimas dos semanas previas a la encuesta.
- Las diferencias de las tasas de morbilidad pueden ser explicables debido también a las variaciones estacionales de infecciones respiratorias y gastrointestinales. Es importante considerar que la recolección de los datos no fue simultánea en todas las entidades federativas.
- El porcentaje de mujeres que refirieron estar enfermas en ese periodo es mayor (16.3%) al de los hombres (12.9%).
- Los niños tuvieron tasas más elevadas de morbilidad. Prácticamente uno de cuatro niños de 0 a 4 años de edad estaba enfermo, y uno de cada siete de los niños de 5 a 9 años de edad.
- Los adolescentes tuvieron tasas bajas de enfermedad (10.4%).
- En los adultos, a mayor edad, mayor frecuencia de enfermedad. A partir de los 60 años uno de cada cuatro individuos estaba enfermo.
- A partir de los cinco años de edad las mujeres tuvieron tasas de morbilidad más elevadas que los hombres.
- Las variaciones de las tasas de morbilidad por entidad federativa reflejaron las diferencias en la magnitud de las enfermedades, pero también pueden ser atribuibles a las diferencias estacionales de las enfermedades transmisibles agudas.
- En general, se observaron mayores tasas de morbilidad percibida en la población de localidades urbanas que en las del medio rural.
- Las enfermedades transmisibles continúan representando una causa importante de enfermedad. Al analizar el porcentaje de enfermos por estas causas, y grupos

de edad, se encuentra que en los niños representaron 87.3%, en adolescentes 69.1% y en adultos, 45.8%.

- En cambio, las enfermedades no transmisibles como causa de enfermedad referida por la población representaron 14.6% en adultos, 5.2 en adolescentes y sólo 1% en niños.
- Los adolescentes presentaron el porcentaje más alto por lesiones con el 4.8%, seguidos por los adultos, 4.4% y por los niños, 2.2%.
- El porcentaje por lesiones asociadas a violencia, como causa de enfermedad, fue de 0.3%. Preocupa que este porcentaje es el doble en adolescentes, en relación con los adultos.
- La proporción de enfermedades no transmisibles fue mayor en las mujeres (10.6%) que en los hombres (6.7%). En cambio, las lesiones por accidentes y violencias fueron mayores en los hombres (5.2%) que en las mujeres (2.7%).
- La distribución de la proporción de la población que enfermó en las últimas dos semanas, de acuerdo con la percepción de gravedad, indica que 17.2% consideraron que es grave, 30% moderado y 51.7% leve.
- La distribución porcentual de la percepción de gravedad fue semejante en ambos sexos.
- Los factores poblacionales asociados a tasas de morbilidad más elevadas fueron:
 - ▶ Discapacitados inactivos (27.1%)
 - ▶ Ser pensionado (19.8%)
 - ▶ Edad (menor de 10 años) (18.7%)
 - ▶ Sexo femenino (16.3%)
 - ▶ Instrucción de nivel básico ($\geq 15.2\%$)
 - ▶ Analfabeta (12.9%)
 - ▶ Bajo nivel de ingreso (14.2%)

Discapacidad

- De los 96.9 millones de mexicanos se estima que 2.2 millones están discapacitados (2.3%). Esta proporción es mayor a la indicada por el XII CGPV 2000, el que reportó una tasa de 1.84 individuos con discapacidad por cada 100 habitantes.

- La tasa de discapacidad en hombres (2.5%) es mayor que en mujeres (2.2%).
- La distribución porcentual según tipo de discapacidad fue la siguiente: motriz (46.6%), mental (16.5%), auditiva (16.4%), visual (14.6%) y de lenguaje (2.2%). No hubo diferencias importantes por sexo.
- A mayor edad, mayor proporción de discapacidad de tipo motriz, auditiva y visual, pero menor proporción de discapacidad de tipo mental.
- El grupo de edad con la mayor proporción de discapacidad por lenguaje fue el de adolescentes (4.6%).
- Respecto a la proporción de severidad de la discapacidad, una cuarta parte la consideraron leve, 32.7% moderada, 34.7% grave y sólo 3.7% muy grave.
- La proporción de causas de discapacidad fueron las siguientes: congénita (24.6%), adquirida por enfermedad (36.1%), adquirida por accidente (20.1%), adquirida por edad avanzada 14.1% y adquirida por alcohol o drogas 0.7%.
- Las mayores diferencias de la proporción de casos de discapacidad por sexo y edad se observaron en las causadas por accidentes y por alcohol y drogas. En ambos casos fue mayor en hombres; en cambio, en las causadas por edad avanzada se observó una mayor proporción en mujeres. Esto es explicable en parte por la mayor esperanza de vida de las mujeres.
- Los factores poblacionales que se asociaron a tasas de discapacidad más elevadas fueron:
 - Población económicamente inactiva por razones de salud (62.0%)
 - Pensionados y jubilados (13.8%)
 - Sin instrucción escolar (12.5%)
 - Analfabetas (>15 años de edad) (11.4%)
 - No aptos para leer y escribir (6 a 14 años de edad) (5.4%)
 - Bajo nivel de ingreso (3.2%)

En la mayoría de los casos la asociación fue de tipo bidireccional, lo que genera círculos viciosos.

Figura 3.1.1
Distribución de la población, por sexo, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses






Figura 3.1.2
Distribución de la población, por grupos de edad, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses






N*=57 618
N*= Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 3.1.3
Distribución porcentual de la población, por entidad federativa, según muy buena y buena percepción del estado de salud



N*=4 781
N*= Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 3.1.4
Distribución porcentual de la población, por entidad federativa, según mala y muy mala percepción del estado de salud

Figura 3.1.5
Distribución de la población de cinco años o más de edad, por nivel de escolaridad, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses





Figura 3.2.1
Prevalencia lápsica de algún problema de salud* en las dos semanas previas, según grupo de edad y sexo



N* = 14 145 población
 N* = Frecuencia ponderada en miles
 * Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias, lesiones físicas por accidente en las dos semanas previas respecto a la población de cada grupo, multiplicado por cien.

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




Figura 3.2.2
Prevalencia lápsica de algún problema de salud* en las dos semanas previas a la encuesta, según entidad federativa

N*=14 123 población
 N*=Frecuencia ponderada en miles
 * Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias o lesiones físicas por accidente en las dos semanas previas respecto a la población en cada grupo, multiplicado por 100

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




Figura 3.2.3
Prevalencia lápsica de algún problema de salud* en las dos semanas previas de la población de cinco años o más, según nivel de escolaridad

N*=85 337
 N*=Frecuencia ponderada en miles
 * Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias o lesiones físicas por accidente en las dos semanas previas respecto a la población en cada grupo, multiplicado por 100

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 3.2.4
Distribución porcentual de la población, según tipo de problema y grupos de edad, que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas,






Figura 3.2.5
Distribución porcentual de la población, por sexo, que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según tipo de problema de salud






N* = Frecuencia ponderada en miles
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México 2000

Figura 3.2.6
Distribución porcentual de la población, por sexo, que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según percepción de la gravedad

- Muy leve
- Leve
- Moderado
- Grave
- Muy grave
- No especificado



N* = Frecuencia ponderada en miles
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México 2000

Figura 3.3.1
Distribución porcentual de la población, por sexo, total, según condición de discapacidad

- Sí
- No
- No especificado

Figura 3.3.2
Distribución porcentual de la población discapacitada, por sexo, según tipo de discapacidad





Figura 3.3.3
Distribución porcentual de la población discapacitada, por grupo de edad, según tipo de discapacidad



N* = 2 275
N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




Figura 3.3.4
Distribución porcentual de la población discapacitada, por sexo, según percepción de la severidad de su capacidad

- Muy leve
- Leve
- Moderado
- Grave
- Muy grave
- No especificado

N* = Frecuencia ponderada en miles
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México 2000




Figura 3.3.5
Distribución porcentual de la población discapacitada, por sexo, según causa de discapacidad

- Congénita
- Por enfermedad
- Por accidente
- Por alcohol/drogas
- Por edad avanzada
- Otra causa
- No especificado

N* = Frecuencia ponderada en miles
Nota: Los datos estadísticos cuyos valores fueron menores de 0.5 no se reflejan en las gráficas
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México 2000

Cuadro 3.1.1
Distribución de la población, por sexo, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses

<i>Estado de salud</i>	<i>Hombre</i>		<i>Mujer</i>		<i>Total</i>	
	<i>Frecuencia*</i>	<i>Por ciento</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Por ciento</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Por ciento</i>
Muy buena	2 001.4	4.2	1 732.5	3.5	3 733.9	3.9
Buena	27 481.5	57.5	26 402.2	53.7	53 883.7	55.6
Regular	15 924.4	33.3	17 889.8	36.4	33 814.2	34.9
Mala	1 831.7	3.8	2 613.4	5.3	4 445.1	4.6
Muy mala	140.6	0.3	195.6	0.4	336.2	0.3
No especificado	392.6	0.9	353.3	0.7	745.9	0.7
Estados Unidos Mexicanos	47 772.2	100.0	49 186.8	100.0	96 959.0	100.0

* Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.1.2
Distribución de la población, por grupos de edad, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses

<i>Estado de salud</i>	<i>0 a 9 años</i>	<i>10 a 19 años</i>	<i>20 a 29 años</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Muy buena	3.8	3.5	4.0	4.0	3.9
Buena	62.5	63.2	49.3	44.0	55.6
Regular	30.3	30.7	38.7	33.7	34.9
Mala	2.3	1.9	6.7	11.5	4.6
Muy mala	0.1	0.1	0.6	0.0	0.3
No especificado	1.0	0.6	0.7	6.8	0.8
Estados Unidos Mexicanos	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	23 005.9	22 153.4	51 607.6	192.1	96 959.0

* Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.1.3
**Distribución porcentual de la población, por entidad federativa,
 según percepción del estado de salud**

Entidad federativa	Percepción del estado de salud						Total
	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	No especificado	
Aguascalientes	8.9	56.6	29.2	4.1	0.5	0.8	100
Baja California	6.3	61.8	27.0	3.7	0.6	0.7	100
Baja California Sur	6.8	64.8	23.9	3.6	0.3	0.7	100
Campeche	2.3	56.7	36.4	3.4	0.4	0.8	100
Coahuila	6.8	67.9	21.3	3.1	0.3	0.6	100
Colima	4.5	59.8	31.1	3.8	0.2	0.6	100
Chiapas	1.2	55.7	36.0	6.1	0.1	0.9	100
Chihuahua	9.5	65.4	20.5	3.6	0.3	0.7	100
Distrito Federal	4.8	55.9	33.5	4.9	0.3	0.6	100
Durango	2.4	57.0	33.1	6.7	0.2	0.6	100
Guanajuato	5.8	49.6	37.5	6.0	0.9	0.2	100
Guerrero	1.1	58.9	33.2	6.1	0.2	0.6	100
Hidalgo	1.3	54.9	38.3	4.8	0.3	0.5	100
Jalisco	3.6	55.2	34.4	5.4	0.4	1.0	100
México	3.0	48.1	43.4	4.2	0.5	0.9	100
Michoacán	2.4	52.9	37.3	5.6	0.5	1.3	100
Morelos	3.6	53.2	37.7	4.8	0.4	0.3	100
Nayarit	3.7	54.0	36.6	5.0	0.1	0.6	100
Nuevo León	8.2	65.0	23.3	2.7	0.2	0.6	100
Oaxaca	1.1	57.8	36.1	3.9	0.1	0.9	100
Puebla	1.6	54.5	38.7	4.5	0.2	0.6	100
Querétaro	4.9	52.4	36.9	4.8	0.6	0.4	100
Quintana Roo	2.9	58.4	34.9	2.4	0.2	1.2	100
San Luis Potosí	5.4	55.6	33.8	4.3	0.3	0.5	100
Sinaloa	3.1	59.4	31.7	4.8	0.3	0.7	100
Sonora	8.7	62.6	24.5	3.0	0.4	0.7	100
Tabasco	2.0	47.2	41.9	7.0	0.4	1.4	100
Tamaulipas	4.4	64.7	27.0	3.0	0.2	0.6	100
Tlaxcala	2.3	52.7	40.0	3.7	0.3	1.0	100
Veracruz	2.2	53.3	38.3	4.6	0.2	1.4	100
Yucatán	2.7	55.9	38.4	2.0	0.3	0.7	100
Zacatecas	4.8	52.5	35.9	5.9	0.5	0.4	100
Estados Unidos Mexicanos							
Porcentaje	3.9	55.6	34.9	4.6	0.3	0.8	100.0
Frecuencia*	3 733.9	53 883.7	33 814.2	4 445.1	336.2	745.9	96 959.0

* Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.1.4

Distribución de la población de cinco años o más de edad, por nivel de escolaridad, según percepción de su estado de salud durante los últimos doce meses

<i>Estado de salud</i>	<i>Sin instrucción</i>	<i>Primaria incompleta</i>	<i>Primaria completa</i>	<i>Secundaria</i>	<i>Carrera técnica o comercial</i>	<i>Preparatoria o normal básica</i>	<i>Licenciatura y posgrado</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Muy buena	2.7	2.8	2.9	3.7	5.8	5.5	10.4	2.1	3.8
Buena	55.8	53.3	50.8	57.1	56.7	60.8	61.8	41.3	54.8
Regular	34.7	36.8	39.9	35.4	33.4	30.5	24.6	40.9	35.5
Mala	5.7	5.9	5.3	3.0	3.2	2.5	2.5	13.5	4.8
Muy mala	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	1.3	0.4
No especificado	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	1.0	0.7
Total									
Por ciento	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	7 246.5	24 924.2	13 740.5	17 835.8	5 103.2	7 646.3	5 072.3	3 767.7	85 336.6

* Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.1.5
Percepción del estado de salud de la población, según factores poblacionales

Características poblacionales	Frecuencia*	Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala	No especificado	Total
Edad								
0-9	23 005.9	3.8	62.5	30.3	2.3	0.1	1.0	100
10-19	22 153.4	3.5	63.2	30.7	1.9	0.1	0.6	100
20 o más	51 607.5	4.0	49.3	38.7	6.7	0.6	0.7	100
No especificado	192.1	4.0	44.0	33.7	11.5	0.0	6.8	100
Total	96 958.9	3.9	55.6	34.9	4.6	0.3	0.7	100
Sexo								
Hombre	47 772.1	4.2	57.5	33.3	3.8	0.3	0.8	100
Mujer	49 186.8	3.5	53.7	36.4	5.3	0.4	0.7	100
Total	96 958.9	3.9	55.6	34.9	4.6	0.3	0.8	100
Tamaño de localidad								
1 a 14 999 habitantes	40 107.4	2.0	54.1	37.7	5.2	0.3	0.7	100
15 000 habitantes o más	56 851.4	5.1	56.6	32.9	4.1	0.4	0.8	100
Total	96 958.9	3.9	55.6	34.9	4.6	0.3	0.8	100
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años)								
Sí	18 271.2	3.8	63.6	30.1	1.9	0.1	0.6	100
No	2 207.9	2.0	63.1	31.1	3.0	0.2	0.6	100
No especificado	134.2	1.6	59.4	33.2	3.6	0.0	2.1	100
Total	20 613.4	3.6	63.5	30.2	2.0	0.1	0.6	100
Alfabeta (Población de 15 años o más)								
Sí	57 294.9	4.2	52.5	37.1	5.2	0.4	0.7	100
No	5 025.5	1.2	41.5	41.4	14.2	1.0	0.8	100
No especificado	82.4	1.2	55.9	31.6	3.6	0.7	7.0	100
Total	62 402.9	3.9	51.6	37.4	5.9	0.5	0.7	100
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más)								
Sin instrucción	2 610.3	1.7	43.4	41.3	12.1	0.8	0.7	100
Con primaria incompleta	14 249.1	2.2	45.6	41.9	8.9	0.8	0.7	100
Con primaria completa	13 431.9	2.9	50.5	40.1	5.4	0.4	0.7	100
Con secundaria	17 835.8	3.7	57.1	35.4	3.0	0.2	0.7	100
Carrera técnica o comercial	5 103.1	5.8	56.7	33.4	3.2	0.3	0.5	100
Preparatoria o normal básica	7 647.1	5.5	60.8	30.5	2.5	0.1	0.6	100
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	5 072.3	10.4	61.8	24.6	2.5	0.3	0.4	100
No especificado	3 232.9	1.9	37.8	42.6	15.3	1.5	0.9	100
Total	69 182.7	3.9	52.8	36.7	5.5	0.4	0.7	100
Condición de actividad (Población de 12 años o más)								
Población económicamente activa		4.3	53.4	36.6	4.6	0.3	0.7	100
Población económicamente inactiva		3.4	52.0	36.8	6.5	0.6	0.6	100
No especificado		1.0	50.7	35.5	7.3	0.0	5.5	100
Total	69 182.7	2.9	52.0	36.3	6.1	0.3	2.3	100
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más)								
Pensionados o jubilados	974.4	4.8	36.7	44.8	12.3	1.3	0.1	100
Estudiantes	11 180.1	4.3	64.8	28.7	1.7	0.1	0.5	100
Actividades del hogar	16 701.9	2.7	46.3	41.9	7.8	0.6	0.7	100
Discapacitados	296.9	1.1	24.7	39.1	31.2	3.0	0.9	100
No trabaja por otras razones	3 596.7	3.7	45.7	36.5	12.0	1.4	0.6	100
Total	32 750.1	3.4	52.0	36.8	6.5	0.6	0.6	100

Continúa

Cuadro 3.1.5
Percepción del estado de salud de la población, según factores poblacionales

(Continuación)

<i>Características poblacionales</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Muy buena</i>	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala</i>	<i>Muy mala</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>	
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)									
Jornaleros o peones	3 050.8	2.1	50.8	40.1	5.8	0.3	0.9	100	
Empleados u obreros	19 387.1	5.0	56.6	34.1	3.3	0.2	0.7	100	
Trabajadores sin pago	1 894.4	2.2	54.3	35.6	7.0	0.5	0.5	100	
Trabajadores por su cuenta	11 158.3	3.9	48.4	40.3	6.2	0.5	0.6	100	
Patrones	346.1	11.4	52.0	32.1	3.9	0.5	0.1	100	
No especificado	125.3	2.3	51.2	41.1	4.1	0.2	1.1	100	
Total	35 962.3	4.3	53.4	36.6	4.6	0.3	0.7	100	
Población según ingreso en el hogar en salarios mínimos									
Menos de un salario mínimo mensual	19 755.3	2.2	53.6	36.7	6.3	0.5	0.7	100	
De 1 a 1.9	19 540.2	2.6	52.8	38.1	5.4	0.4	0.7	100	
De 2 a 2.9	15 130.9	3.1	53.8	37.5	4.4	0.3	0.8	100	
De 3 a 4.9	19 060.4	3.5	56.6	35.0	3.7	0.3	0.9	100	
De 5 a 9.9	15 872.9	5.6	59.1	31.1	3.4	0.2	0.6	100	
De 10 o más	7 088.8	10.4	62.8	23.1	2.4	0.2	1.0	100	
Total	96 448.7	3.8	55.7	34.9	4.5	0.3	0.8	100	
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar									
Cuartil (Intervalos de ingreso en pesos)									
I	0 a 1083	21 894.4	2.1	53.3	37.0	6.4	0.5	0.7	100
II	1084 a 2259	22 667.2	2.7	53.3	37.9	5.0	0.4	0.7	100
III	2260 a 4499	24 830.4	3.4	55.0	36.4	4.1	0.3	0.9	100
IV	4500 y más	27 056.7	6.6	60.1	29.2	3.1	0.2	0.8	100
Total		96 448.7	3.8	55.7	34.9	4.5	0.3	0.8	100

* Frecuencia en miles

** Cantidad en pesos

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.1

Prevalencia lápsica, según grupo de edad y sexo, de algún problema de salud* en las dos semanas previas

Grupo de edad	Hombre		Mujer		Total	
	Porcentaje	Frecuencia**	Porcentaje	Frecuencia**	Porcentaje	Frecuencia**
0-4	23.4	1 361.8	22.9	1 287.2	23.2	2 649.0
5-9	13.6	799.5	14.8	844.9	14.2	1 644.4
10-14	10.2	586.5	12.0	670.2	11.1	1 256.8
15-19	8.8	468.3	10.9	593.1	9.8	1 061.4
20-24	8.1	392.5	11.7	606.3	10.0	998.8
25-29	9.5	368.6	13.9	586.5	11.8	955.0
30-34	11.1	373.1	14.4	523.0	12.8	896.1
35-39	11.7	348.8	17.8	569.5	14.8	918.3
40-44	13.1	302.9	19.4	467.1	16.3	769.9
45-49	12.6	235.9	20.7	406.4	16.7	642.3
50-54	13.3	200.6	21.5	336.7	17.5	537.3
55-59	13.8	158.6	22.0	267.6	18.0	426.3
60-64	15.0	147.5	23.6	253.4	19.5	400.9
65-69	17.2	123.2	25.1	199.7	21.4	322.9
70-74	19.9	109.7	26.1	154.5	23.1	264.2
75-79	18.3	61.6	28.4	104.7	23.6	166.3
80 y más	22.7	87.7	25.1	125.2	24.1	212.9
No especificado	12.9	12.4	10.8	10.4	11.9	22.8
Total	12.9	6 139.3	16.3	8 006.4	14.6	14 145.6

*Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias, lesiones físicas por accidente o agresiones en las dos semanas previas respecto a la población en cada grupo, multiplicada por 100

** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.2

Prevalencia lápsica, por grupos de edad, de algún problema de salud en las dos semanas previas a la encuesta, según entidad federativa

Entidad federativa	0-9 años	10-19 años	20 o más años	Total	Frecuencia**
Aguascalientes	18.2	8.3	12.7	13.1	122.8
Baja California	11.5	5.8	9.1	9.0	222.1
Baja California Sur	13.8	7.4	11.5	11.1	46.5
Campeche	15.0	6.6	10.1	10.5	72.2
Coahuila	19.1	10.4	13.3	14.0	319.8
Colima	22.7	10.2	15.0	15.6	83.9
Chiapas	15.2	8.0	13.8	12.7	496.1
Chihuahua	18.0	6.3	10.7	11.4	346.9
Distrito Federal	20.6	15.6	13.8	15.4	1 314.2
Durango	21.4	11.5	17.8	17.1	247.0
Guanajuato	18.2	8.7	16.4	15.0	695.7
Guerrero	14.2	6.2	11.4	10.8	330.5
Hidalgo	16.0	8.7	13.2	12.8	284.8
Jalisco	21.6	15.1	18.3	18.3	1 150.8
México	26.1	14.4	18.8	19.5	2 545.7
Michoacán	15.3	7.8	13.5	12.5	494.8
Morelos	22.4	11.6	15.9	16.4	253.9
Nayarit	28.4	14.3	19.0	20.1	182.6
Nuevo León	21.3	8.5	13.1	13.8	526.0
Oaxaca	11.6	4.9	9.7	9.0	306.7
Puebla	16.6	8.0	14.4	13.4	676.4
Querétaro	22.1	9.9	15.5	15.8	220.9
Quintana Roo	18.7	8.4	11.1	12.5	108.6
San Luis Potosí	15.5	9.1	14.9	13.6	312.3
Sinaloa	15.8	8.0	13.1	12.5	315.7
Sonora	18.1	9.8	13.0	13.4	294.3
Tabasco	20.2	12.9	14.8	15.6	294.5
Tamaulipas	16.3	10.0	14.2	13.8	376.0
Tlaxcala	17.0	11.1	14.0	14.0	134.2
Veracruz	14.6	11.1	14.0	13.4	925.2
Yucatán	21.2	7.1	10.2	12.0	198.8
Zacatecas	16.7	12.7	18.5	16.5	222.7
Prevalencia lápsica	18.7	10.5	14.6	14.6	14 122.9
Población total con algún problema de salud en las dos semanas previas**	4 293.4	2 318.2	7 511.3	14 122.9	

*Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias, lesiones físicas por accidente o agresiones en las dos semanas previas respecto a la población en cada grupo, multiplicada por 100

** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.3

Prevalencia lápsica* en porcentaje de algún problema de salud en las dos semanas previas, según entidad federativa y tamaño de localidad

Entidad federativa	Tamaño de localidad		Total	Frecuencia**
	1 a 14 999 habitantes	15 000 habitantes o más		
Aguascalientes	12.0	13.6	13.1	123.2
Baja California	10.2	8.8	9.0	222.1
Baja California Sur	11.3	11.2	11.3	47.1
Campeche	9.4	11.6	10.5	72.2
Coahuila	10.8	14.8	14.0	319.8
Colima	16.4	15.2	15.6	83.9
Chiapas	11.9	15.4	12.7	496.1
Chihuahua	16.1	9.5	11.4	346.9
Distrito Federal		15.4	15.4	1 314.2
Durango	17.2	17.1	17.2	247.3
Guanajuato	14.6	15.3	15.0	695.7
Guerrero	10.6	11.5	10.9	334.2
Hidalgo	11.7	16.0	12.8	284.8
Jalisco	17.5	18.6	18.3	1 150.8
México	18.7	19.8	19.6	2 555.1
Michoacán	11.7	13.9	12.6	498.0
Morelos	16.4	16.5	16.4	253.9
Nayarit	18.6	22.6	20.1	183.3
Nuevo León	14.0	13.8	13.8	526.0
Oaxaca	8.5	10.9	9.0	306.7
Puebla	11.4	16.3	13.4	676.4
Querétaro	15.0	16.9	15.9	222.4
Quintana Roo	10.3	13.9	12.5	108.6
San Luis Potosí	13.9	13.4	13.7	313.5
Sinaloa	13.9	11.1	12.5	315.7
Sonora	15.1	12.7	13.4	294.3
Tabasco	14.6	17.8	15.6	294.5
Tamaulipas	10.8	14.8	13.8	376.0
Tlaxcala	12.2	17.4	14.0	134.2
Veracruz	11.5	16.4	13.4	925.2
Yucatán	10.4	13.3	12.1	199.1
Zacatecas	17.6	14.1	16.6	224.3
Estados Unidos Mexicanos	13.2	15.5	14.6	14 145.6

*Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias, lesiones físicas por accidente o agresiones en las dos semanas previas respecto a la población en cada grupo, multiplicada por 100

** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.4

Prevalencia lápsica de algún problema de salud* en las dos semanas previas, para la población de cinco años o más, según nivel de escolaridad

	<i>Sin instrucción</i>	<i>Primaria incompleta</i>	<i>Primaria completa</i>	<i>Secundaria</i>	<i>Carrera técnica preparatoria o normal básica</i>	<i>Licenciatura y posgrado</i>	<i>Total</i>
Prevalencia lápsica	16.1	14.0	12.8	12.1	13.1	11.9	13.4
Población de 5 años o más de edad con algún problema de salud en las dos semanas previas**	1 167.2	3 481.3	1 755.1	2 163.1	1 626.6	605.8	10 799.1

*Se define como la relación de personas que presentaron alguna enfermedad, molestias, lesiones físicas por accidente o agresiones en las dos semanas previas respecto a la población en cada grupo, multiplicada por 100

**Cantidades en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.5

Distribución porcentual de la población que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según tipo de problema y grupos de edad

Tipo de problema	Grupo de edad			Total
	0 a 9	10 a 19	20 y más	
Padecimientos transmisibles				
Infecciones respiratorias	71.9	59.7	39.6	52.7
Enfermedades diarreicas	8.3	4.2	3.8	5.2
Enfermedades exantemáticas	2.8	2.1	0.3	1.4
Fiebre	2.2	1.5	0.7	1.3
Parasitosis Intestinal	1.7	1.2	1.0	1.3
Otitis media	0.6	0.4	0.3	0.4
Subtotal	87.3	69.1	45.8	62.3
Padecimientos no transmisibles				
Cefalea	0.5	4.1	4.8	3.3
Hipertensión arterial		0.3	4.5	2.4
Diabetes mellitus		0.1	2.7	1.5
Artritis		0.0	1.3	0.7
Asma	0.5	0.7	0.4	0.5
Colecistitis/Colelitiasis			0.5	0.3
Gota			0.3	0.1
Colesterol			0.2	0.1
Subtotal	1.0	5.2	14.6	8.9
Lesiones				
Lesión por accidente	2.1	4.2	4.1	3.5
Lesión por violencia	0.1	0.6	0.3	0.3
Subtotal	2.2	4.8	4.4	3.8
Otro problema	9.1	20.7	34.8	24.7
No sabe	0.0	0.1	0.1	0.1
No especificado	0.3	0.1	0.2	0.2
Total				
Por ciento	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	4 293.4	2 318.2	7 511.3	14 122.9

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.6
Distribución porcentual de la población, por sexo, que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según tipo de problema

<i>Tipo de problema</i>	<i>Sexo</i>		<i>Total</i>
	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	
Padecimientos transmisibles			
Infecciones respiratorias	56.4	49.9	52.7
Enfermedades diarreicas	5.7	4.9	5.2
Enfermedades exantemáticas	1.5	1.3	1.4
Fiebre	1.51.2	1.3	
Parasitosis Intestinal	1.3	1.2	1.3
Otitis media	0.4	0.5	0.4
Subtotal	66.8	58.8	62.3
Padecimientos no transmisibles			
Cefalea	2.3	4.1	3.3
Hipertensión arterial	1.4	3.2	2.4
Diabetes mellitus	1.4	1.5	1.5
Artritis	0.5	0.9	0.7
Asma	0.6	0.4	0.5
Colecistitis/Colelitiasis	0.2	0.3	0.3
Gota	0.2	0.0	0.1
Colesterol	0.1	0.1	0.1
Subtotal	6.7	10.6	8.9
Lesiones			
Lesión por accidente	4.9	2.5	3.5
Lesión por violencia	0.4	0.2	0.3
Subtotal	5.2	2.7	3.8
Otro problema			
No especificado	21.0	27.5	24.7
	0.3	0.4	0.3
Total			
Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	6 139.3	8 006.4	14 145.6

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.7
Distribución porcentual de la población que refirió algún problema de salud en las dos semanas previas, según percepción de la gravedad

<i>Percepción de la gravedad</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Muy leve	2.7	2.5	2.6
Leve	51.3	47.4	49.1
Moderado	28.9	30.9	30.0
Grave	14.7	16.4	15.7
Muy grave	1.4	1.6	1.5
No especificado	1.0	1.1	1.1
Total			
Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	6 139.3	8 006.4	14 145.6

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.2.8

Tasas de prevalencia lápsica de problemas de salud, según factores poblacionales

<i>Características poblacionales</i>	<i>Tasas por cien</i>	<i>Frecuencia ponderada*</i>
Edad		
0-9	18.7	4 293.4
10-19	10.5	2 318.2
20 o más	14.6	7 511.3
No especificado	11.9	22.8
Total	14.6	14 145.6
Sexo		
Hombre	12.9	6 139.3
Mujer	16.3	8 006.4
Total	14.6	14 145.6
Tamaño de localidad		
1 a 14 999 habitantes	13.2	5 311.3
15 000 habitantes o más	15.5	8 834.3
Total	14.6	14 145.6
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 de edad años)		
Sí	11.9	2 174.3
No	12.9	285.1
No especificado	12.7	17.0
Total	12.0	2 476.3
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)		
Sí	13.4	7 672.3
No	17.8	892.2
No especificado	10.0	8.2
Total	13.7	8 572.7
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	15.9	415.8
Con primaria incompleta	15.2	2 171.1
Con primaria completa	12.8	1 721.8
Con secundaria	12.1	2 163.1
Carrera técnica o comercial	15.3	778.3
Preparatoria o normal básica	11.1	848.3
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	11.9	605.8
No especificado	18.7	605.0
Total	13.5	9 309.3
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Población económicamente activa	12.5	4 546.1
Población económicamente inactiva	14.4	4 730.6
No especificado	20.6	32.5
Total	13.5	9 309.3

Continúa

Cuadro 3.2.8

Tasas de prevalencia lápsica de problemas de salud, según factores poblacionales

(Continuación)

<i>Características poblacionales</i>	<i>Tasas por cien</i>	<i>Frecuencia ponderada*</i>
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más de edad)		
Pensionados o jubilados	19.8	192.5
Estudiantes	10.5	1 171.6
Actividades del hogar	16.5	2 757.6
Discapacitados	27.1	80.3
No trabajan por otras razones	14.7	528.7
Total	14.4	4 730.6
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)		
Jornaleros o peones	10.6	322.2
Empleados u obreros	11.6	2 248.7
Trabajadores sin pago	13.9	263.3
Trabajadores por su cuenta	14.4	1 608.3
Patrones	14.8	51.1
No especificado	9.0	11.3
Total	12.5	4 504.9
Población según ingreso en el hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo mensual	14.2	2 796.3
De 1 a 1.9	15.5	3 020.2
De 2 a 2.9	16.0	2 426.0
De 3 a 4.9	14.4	2 752.4
De 5 a 9.9	13.6	2 166.1
De 10 o más	12.4	877.3
Total	14.6	14 038.2
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar		
Cuartil	(Intervalos de ingreso en pesos)	
I	0 a 1 100	14.2
II	1 101 a 2 383	15.4
III	2 384 a 4 549	15.3
IV	4 550 y más	13.5
Total		14.6

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.1
Distribución porcentual de la población total, por sexo,
según existencia de algún tipo de discapacidad

Condición de discapacidad	Hombre	Mujer	Total
Sí	2.5	2.2	2.3
No	97.2	97.4	97.3
No especificado	0.3	0.4	0.4
Total			
Por ciento	100	100	100
Frecuencia*	47 772.2	49 186.8	96 959.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.2
Distribución porcentual de la población discapacitada,
por sexo, según tipo de discapacidad

Tipo de discapacidad	Hombre	Mujer	Total
Motriz	45.3	48.0	46.6
Mental	17.8	15.1	16.5
Auditiva	16.6	16.3	16.4
Visual	13.8	15.5	14.6
Lenguaje	2.5	1.8	2.2
Otra	4.0	3.3	3.7
Total			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia**	1 186.371	1 089.003	2 275.4

*La distribución porcentual suma 100 por columna

** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.3
Distribución porcentual de la población discapacitada,
por grupos de edad, según tipo de discapacidad

Tipo de discapacidad*	Años				No especificado	Total
	0 a 9	10 a 19	20 a 59	60 o más		
Motriz	27.8	24.5	42.1	64.7	37.9	46.6
Mental	38.1	35.2	19.1	1.5	9.7	16.5
Auditiva	13.1	13.3	16.8	17.8	32.9	16.4
Visual	12.4	14.2	15.1	14.6	19.5	14.6
Lenguaje	2.9	4.6	2.7	0.5	0.0	2.2
Otra	5.8	8.2	4.1	0.9	0.0	3.6
Población discapacitada						
Por ciento	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia**	202.3	308.0	925.3	826.6	13.2	2 275.4

*Se consideró la primera opción de respuesta

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.4
**Distribución porcentual de la población discapacitada, por sexo,¹
 según tipo de discapacidad y grupos de edad**

Discapacidad*	Años				No especificado	Total
	0 a 9	10 a 19	20 a 59	60 o más		
Motriz						
Hombres	26.1	24.9	45.1	61.8	13.7	45.7
Mujeres	30.0	24.3	39.7	69.9	59.3	49.2
Total	27.9	24.6	42.7	66.1	37.9	47.4
Auditiva						
Hombres	10.6	14.3	15.2	25.7	58.9	18.3
Mujeres	17.2	13.4	20.3	17.6	9.9	18.0
Total	13.7	13.9	17.5	21.4	32.9	18.2
Visual						
Hombres	15.5	12.2	15.8	20.0	22.0	16.6
Mujeres	12.5	16.8	17.5	23.4	19.7	19.4
Total	14.1	14.2	16.6	21.8	20.8	18.0
Mental						
Hombres	43.0	38.1	19.6	2.6	5.5	18.8
Mujeres	38.4	40.3	21.0	2.1	13.5	17.3
Total	40.8	39.1	20.2	2.3	9.7	18.1
Lenguaje y otras						
Hombres	15.8	17.3	11.4	3.6	0.0	10.0
Mujeres	18.7	17.6	8.8	2.8	0.0	8.3
Total	17.2	17.4	10.2	3.2	0.0	9.2
Hombres						
Por ciento	9.0	14.5	43.4	32.6	0.5	100.0
Frecuencia**	106.9	171.6	514.6	387.0	6.2	1 186.4
Mujeres						
Por ciento	8.8	12.5	37.7	40.4	0.6	100.0
Frecuencia**	95.3	136.3	410.7	439.6	7.0	1 089.0
Total						
Por ciento	8.9	13.5	40.7	36.3	0.6	100.0
Frecuencia**	202.3	308.0	925.3	826.6	13.2	2 275.4

*Las categorías se fusionaron por razones de tamaño de muestra

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.5
**Distribución porcentual de la población discapacitada,
 según percepción de la severidad de su discapacidad, por sexo**

<i>Percepción de la severidad de la discapacidad</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Muy leve	2.5	1.8	2.2
Leve	24.2	25.2	24.7
Moderado	32.0	33.3	32.6
Grave	35.9	33.3	34.7
Muy grave	3.5	4.0	3.7
No especificado	1.9	2.4	2.1
Total			
Por ciento	100	100	100
Frecuencia*	1 186.4	1 089.0	2 275.4

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.6
**Distribución porcentual de la población discapacitada,
 por sexo, según causa de discapacidad**

<i>Causa de discapacidad</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Congénita	24.9	24.3	24.6
Adquirida por enfermedad	34.2	38.2	36.1
Adquirida por accidente	24.7	14.9	20.1
Adquirida por edad avanzada	11.6	16.8	14.1
Adquirida por alcohol/drogas	1.1	0.2	0.7
Adquirida por otra causa	1.1	1.7	1.3
No especificado	2.4	3.9	3.1
Total			
Por ciento	100	100	100
Frecuencia*	1 186.4	1 089.0	2 275.4

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.7

Distribución porcentual de la población discapacitada, por sexo, según percepción de la severidad y tipo de la discapacidad

Severidad de la discapacidad	Motriz		Mental		Audiitiva		Visual		Lenguaje		Otra		Total	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Muy leve	4.7	1.9	1.8	2.4	2.4	1.9	1.3	2.6	2.3	3.5	10.7	1.5	2.5	1.8
Leve	51.3	68.7	29.6	23.9	24.9	23.1	24.6	22.2	27.8	33.2	25.4	28.1	24.2	25.2
Moderado	61.8	60.2	32.7	36.9	34.8	37.0	28.9	27.2	35.2	20.9	20.5	35.4	32.0	33.3
Grave	74.2	53.5	29.3	29.7	32.8	33.5	40.2	41.3	30.3	41.1	34.1	31.9	35.9	33.3
Muy grave	6.6	12.7	3.9	4.1	3.2	0.4	3.6	5.1	0.0	1.3	4.4	3.1	3.5	4.0
No especificado	1.4	3.0	2.7	3.0	1.9	4.1	1.4	1.6	4.3	0.0	4.9	0.0	1.9	2.4
Total														
Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100
Frecuencia*	537.9	523.1	211.6	164.5	196.4	177.5	163.5	168.9	29.9	19.3	47.1	35.8	1 186.4	1 089.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 3.3.8
Tasas de discapacidad, según características de la población

<i>Características poblacionales</i>	<i>Tasa de discapacidad por cien</i>	<i>Frecuencia ponderada*</i>
Edad		
0-9	0.9	202.3
10-19	1.4	308.0
20 o más	3.4	1 751.9
No especificado	6.9	13.2
Total	2.3	2 275.4
Sexo		
Hombre	2.5	1 186.4
Mujer	2.2	1 089.0
Total	2.3	2 275.4
Tamaño de localidad		
1 a 14 999 habitantes	2.3	921.5
15 000 habitantes o más	2.4	1 353.9
Total	2.3	2 275.4
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)		
Sí	0.8	142.9
No	5.4	118.2
No especificado	0.3	0.4
Total	1.3	261.5
Alfabeta (Población de 15 años o más)		
Sí	2.3	1 325.1
No	11.4	575.4
No especificado	9.8	8.1
Total	3.1	1 908.6
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	12.5	325.5
Con primaria incompleta	4.0	568.3
Con primaria completa	2.1	282.3
Con secundaria	1.2	212.2
Carrera técnica o comercial	1.4	71.9
Preparatoria o normal básica	1.3	97.8
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	1.2	62.6
No especificado	11.3	366.2
Total	2.9	1 986.9
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Total		
Población económicamente activa	1.7	598.6
Población económicamente inactiva	4.2	1 380.7
No especificado	4.8	7.6
Total	2.9	1 986.9
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más de edad)		
Pensionados o jubilados	13.8	134.3
Estudiantes	0.7	80.8
Actividades del hogar	2.8	468.2
Discapacitados	62.0	184.0
No trabajan por otras razones	14.3	513.4
Total	4.2	1 380.7

Continúa

Cuadro 3.3.8
Tasas de discapacidad, según características de la población

(Continuación)

<i>Características poblacionales</i>	<i>Tasa de discapacidad por cien</i>	<i>Frecuencia ponderada*</i>
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)		
Jornaleros o peones	1.5	46.9
Empleados u obreros	1.1	216.6
Trabajadores sin pago	3.1	59.1
Trabajadores por su cuenta	2.3	257.1
Patrones	2.9	9.9
No especificado	3.1	3.9
Total	1.7	593.5
Población según ingreso en el hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo mensual	3.2	625.3
De 1 a 1.9	2.6	513.7
De 2 a 2.9	2.1	319.9
De 3 a 4.9	2.0	377.8
De 5 a 9.9	1.6	259.7
De 10 o más	1.8	125.5
Total	2.3	2 221.9
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar		
Cuartil (Intervalos de ingreso en pesos)		
I 0 a 1100	3.2	703.2
II 1 101 a 2 383	2.4	555.1
III 2 384 a 4 549	2.0	504.6
IV 4 550 y más	1.7	459.1
Total	2.3	2 221.9

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Utilización de servicios de salud

C O N T E N I D O

Utilización en las últimas dos semanas

- Población, según tipo de recurso humano que la atendió, por entidad federativa.
- Población, por sexo, con problemas de salud en las últimas dos semanas, según tipo de recurso humano que la atendió.
- Población, por edad, con problemas de salud en las últimas dos semanas, según tipo de recursos humanos que la atendió.
- Población, por sexo, con problemas de salud en las últimas dos semanas que no fue atendida por un profesional de salud, según motivo de no atención.
- Población con problemas de salud en las últimas dos semanas, por tipo de atención solicitada, según características poblacionales.

Preferencia por institución de salud

- Población por preferencia de servicios de salud, según entidad federativa.
- Población, por sexo, según preferencia de servicios de salud.
- Población, según preferencia de servicio de salud y grupos de edad.
- Población, por sexo, según preferencia de servicios de salud y derechohabiencia.
- Población derechohabiente, según preferencia de servicios, por factores poblacionales.
- Población por preferencia de servicios de salud para población derechohabiente y factores poblacionales.

Utilización de servicios de salud

Utilización en las últimas dos semanas

- Se estima que 14.1 millones de mexicanos tuvieron un problema de salud en las últimas dos semanas. De ellos, 59.3% solicitaron atención por personal profesional de salud y 2.1% se atendieron con personal de salud tradicional. El 38.2% no solicitó atención.
- Las entidades con la mayor frecuencia de solicitud de atención por personal profesional de salud fueron: Yucatán (76%), Baja California (70%), Coahuila (70%), Sinaloa (69%) y Nuevo León (66%).
- La población de las entidades con la mayor proporción de falta de solicitud de atención al personal de salud fueron: Puebla (46.4%), Veracruz (44.7%), Nayarit (44.1%), Distrito Federal (49.9%) y Chiapas (40.6%).
- Las entidades con la mayor proporción de solicitud de atención por personal de salud tradicional fueron: Oaxaca (6%), Aguascalientes (6%), Chiapas (5.8%), Querétaro (4.9%) y Zacatecas (4.7%).
- No hubo diferencias entre el tipo de personal al que se solicitó atención de salud y el sexo.
- Los niños con mayor frecuencia fueron atendidos por personal profesional de salud.
- Los adolescentes y adultos con mayor frecuencia no utilizaron servicios de salud.
- En los individuos que no utilizaron servicios de salud los principales motivos fueron: no lo consideraron necesario (57.8%), razones económicas (14.3%), no tenían tiempo (8.1%), falta de confianza (2.6%) y asistió pero no lo atendieron (1.6%).
- Los principales factores poblacionales asociados con la falta de atención de servicios de salud fueron:
 1. Jornalero o peón (53.0%)
 2. Sin instrucción educativa (44.5%)
 3. Estudiantes (44.2%)
 4. Población económicamente activa (43.3%)
 5. Ingresos económicos bajos (40%)


Preferencia por institución de salud

- La preferencia de la población por institución de servicios de salud fue la siguiente: SSA (33.8%), servicios privados (27.4%), IMSS (24.2%), ISSSTE (3.9%) e IMSS-Solidaridad (3.3%). Estos porcentajes reflejaron la preferencia de la población y la infraestructura de las instituciones.
- En nueve entidades federativas la institución preferente es el IMSS, éstas fueron: Coahuila (54.1%), Nuevo León (45.6%), Chihuahua (38.6%), Aguascalientes (38.2%), Baja California

(37.9%), Sinaloa (35.3%), Baja California Sur (33.8%), Colima (33.6%) y Tamaulipas (30.6%).

- En tres entidades federativas la institución preferente fueron los servicios privados, éstas fueron: Guanajuato (42.6%), Michoacán (40.0%) y el Distrito Federal (33%).
- En tres cuartas partes del país (20 entidades federativas) la mayor preferencia de la población se concentró en la SSA.
- No hubo diferencias importantes en la preferencia de institución, por sexo de la población.
- Para la atención de niños, 40.4% prefirieron la SSA, 25% el IMSS y 11% los servicios privados.
- Para la atención de los adultos, la población prefirió prácticamente por igual la atención de la SSA, del IMSS o de los servicios privados.
- La comparación de la preferencia institucional según la derechohabiencia permite señalar que los derechohabientes del IMSS prefirieron a esa misma institución en 73%, en el caso del ISSSTE es de 65%, de los seguros privados es de 81%. La población no derechohabiente prefirió en 52% de los casos los servicios de la SSA.
- La preferencia de servicios privados por institución de seguridad social a la que tienen derecho indica que los derechohabientes del IMSS prefirieron en 16% los servicios privados, los del ISSSTE en 21% y los no derechohabientes en 28%.
- Los principales factores poblacionales asociados a la preferencia de la SSA en población derechohabiente fueron los siguientes:
 1. Población rural (15.2%)
 2. Jornalero (13.7%)
 3. Ingresos económicos en el segundo cuartil que van de 1 101 a 2 383 pesos (10.5%)
 4. Instrucción básica (9.4%)
 5. Analfabetismo (9.2%)
- Los principales factores poblacionales por la preferencia de servicios privados en los derechohabientes fueron los siguientes:
 1. Educación superior (33.9%)
 2. Ingresos económicos altos (18.2%)
- Los principales factores poblacionales por la preferencia por la SSA en la población no derechohabiente, fueron los siguientes:
 1. Población rural (61.1%)
 2. Jornalero (60.7%)
 3. Analfabetismo (56.0%)
 4. Instrucción básica (56.7%)
 5. Ingresos bajos correspondientes a los dos primeros cuartiles (de 0 a 2,383 pesos) ($\geq 58.4\%$)

Figura 4.1
Distribución porcentual de la población que solicitó atención de personal profesional de salud*, por entidad federativa




N*=8 390

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/promotor/auxiliar, farmacéutico y otro personal de salud

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 4.2
Distribución de la población, con problemas de salud en las últimas dos semanas, según tipo de recurso humano que lo atendió



N*=14 146 población

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/promotor/auxiliar, farmacéutico y otro personal de salud

** Incluye las características de curandero/partera/yerbero y familiar/amigo/vecino

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




Figura 4.3
Distribución de la población, por edad, con problemas de salud en las últimas dos semanas, según tipo de recurso humano que lo atendió

N*=14 145

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/promotor/auxiliar, farmacéutico y otro personal de salud

** Incluye las características de curandero/partera/yerbero y familiar/amigo/vecino

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000




Figura 4.4
Distribución de la población, por sexo, con problemas de salud en las últimas dos semanas que no fue atendida por un profesional de salud,* según motivo de no atención

N*= 5 834 población

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Médico, dentista, enfermera, homeópata, naturista, acupunturista y encargado de la comunidad, promotor y auxiliar de salud

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 4.5
Distribución porcentual de la población, por preferencia de servicios de salud de la SSA, según entidad federativa





Figura 4.6
Distribución porcentual de la población, por preferencia de servicios de salud por el IMSS, según entidad federativa






Figura 4.7
Distribución porcentual de la población, según preferencia de servicios de salud*

N*=96 959
N*=Frecuencia ponderada en miles
* Incluye dobles derechohacencias
** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000





Figura 4.8
Distribución porcentual de la población, por sexo, según preferencia de servicios de salud

N*=96 959
N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 4.9
Distribución porcentual de la población, por grupos de edad, según preferencia de servicios de salud




N*=96 959
N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Figura 4.10
Porcentaje de preferencia de servicios de salud en población derechohabiente

7.4% de la población derechohabiente prefiere los servicios de la SSA

16.7% de la población derechohabiente de instituciones públicas prefiere servicios privados



N*=Frecuencia ponderada en miles
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.1

Distribución porcentual de la población, según tipo de recurso humano que lo atendió, por entidad federativa

Entidad federativa	Profesional de salud*	Personal de salud tradicional u otra**	No se atendió	No especificado	Total
Aguascalientes	62.4	6.0	31.5	0.1	100
Baja California	66.1	1.4	30.4	2.1	100
Baja California Sur	70.4	0.5	25.0	4.1	100
Campeche	64.7	3.4	31.8	0.1	100
Coahuila	70.2	1.8	28.0		100
Colima	61.7	1.4	36.4	0.5	100
Chiapas	52.9	5.8	40.6	0.7	100
Chihuahua	60.1	4.6	35.3		100
Distrito Federal	57.8	1.0	40.9	0.3	100
Durango	53.0	2.3	44.5	0.3	100
Guanajuato	61.5	1.7	36.6	0.1	100
Guerrero	60.5	1.5	37.7	0.3	100
Hidalgo	65.9	1.4	32.2	0.5	100
Jalisco	59.4	1.3	39.0	0.3	100
México	58.2	1.7	39.4	0.6	100
Michoacán	58.8	2.1	38.8	0.3	100
Morelos	56.7	2.8	40.2	0.4	100
Nayarit	53.9	1.5	44.1	0.5	100
Nuevo León	66.3	1.2	32.1	0.4	100
Oaxaca	54.4	6.0	39.5	0.2	100
Puebla	51.8	1.6	46.4	0.1	100
Querétaro	63.3	4.9	31.7	0.1	100
Quintana Roo	61.0	0.8	37.8	0.4	100
San Luis Potosí	57.9	3.9	36.0	2.2	100
Sinaloa	69.2	1.0	29.3	0.5	100
Sonora	63.1	1.9	34.8	0.2	100
Tabasco	60.6	0.4	38.6	0.4	100
Tamaulipas	60.4	1.5	37.6	0.5	100
Tlaxcala	60.3	3.6	35.3	0.9	100
Veracruz	53.0	1.9	44.7	0.4	100
Yucatán	76.0	1.9	22.0	0.1	100
Zacatecas	60.7	4.7	34.5	0.1	100
Estados Unidos Mexicanos					
Porcentaje	59.3	2.1	38.2	0.4	100
Frecuencia***	8 389.9	297.4	5 396.6	61.8	14 145.6

*Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/promotor/auxiliar, farmacéutico y otro personal de salud

** Incluye las categorías de curandero/partera/yerberero y familiar/ amigo/ vecino

*** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.2
Distribución de la población, por sexo, con problemas de salud en las últimas dos semanas, según tipo de recurso humano que le atendió

<i>Tipo de recurso humano</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Profesional de salud*	57.8	60.4	59.3
Personal de salud tradicional u otra persona**	2.3	1.9	2.1
No se atendió	39.5	37.2	38.2
No especificado	0.4	0.5	0.4
Total			
Porcentaje	100.0	100.0	100.0
Frecuencia***	6 139.3	8 006.4	14 145.6

*Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/promotor/ auxiliar, farmacéutico y otro personal profesional de salud

** Incluye las categorías de curandero/partera/yerbero y familiar/ amigo/ vecino

*** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.3
Distribución de la población, por edad, con problemas de salud en las últimas dos semanas, según tipo de recurso humano que le atendió

<i>Tipo de recurso humano</i>	<i>Años</i>			<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
	<i>0 a 9</i>	<i>10 a 19</i>	<i>20 a 29</i>		
Profesional de salud*	64.7	50.4	58.9	66.5	59.3
Personal de salud tradicional u otra persona**	2.5	3.3	1.5	2.5	2.1
No se atendió	32.2	46.0	39.1	30.9	38.2
No especificado	0.5	0.4	0.4		0.4
Total					
Porcentaje	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia***	4 293.4	2 318.2	7 511.3		14 145.6

*Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/ promotor/ auxiliar, farmacéutico y otro personal

** Incluye las categorías de curandero/partera/yerbero y familiar/ amigo/ vecino

*** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.4

Distribución de la población, por sexo, con problemas de salud en las últimas dos semanas que no fue atendida por un profesional de salud*, según motivo de no atención

<i>Motivo de no atención</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
No fue necesario	58.5	57.2	57.8
No tenía dinero	13.0	15.3	14.3
No tuvo tiempo	8.7	7.6	8.1
Falta de confianza	3.0	2.3	2.6
Fue pero no la atendieron	1.5	1.8	1.6
No hay donde atenderse	1.2	1.6	1.4
Está muy lejos	0.8	1.1	0.9
Es caro	0.7	0.8	0.8
Tratan mal	0.2	0.3	0.3
Otro	7.6	7.1	7.4
No especificado	4.8	4.9	4.8
Total			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia**	2 626.3	3 207.4	5 833.7

*Médico, dentista, enfermera, homeópata, naturista, acupunturista y encargado de la comunidad, promotor y auxiliar de salud

** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.5
Población que presentó problemas de salud durante las dos semanas previas a la entrevista,
según tipo de recurso humano para la salud que le atendió y características poblacionales

<i>Características poblacionales</i>	<i>Profesional de salud*</i>	<i>Personal de salud tradicional u otra persona**</i>	<i>No se atendió</i>	<i>No especificado</i>	<i>Frecuencia***</i>	<i>Total</i>
Edad						
0-9	64.7	2.5	32.2	0.5	4 293.4	100
10-19	50.4	3.3	46.0	0.4	2 318.2	100
20 o más	58.9	1.5	39.1	0.4	7 511.3	100
No especificado	66.5	2.5	30.9		22.8	100
Total	59.3	2.1	38.2	0.4	14 145.6	100
Sexo						
Hombre	57.8	2.3	39.5	0.4	6 139.3	100
Mujer	60.4	1.9	37.2	0.5	8 006.4	100
Total	59.3	2.1	38.2	0.4	14 145.6	100
Tamaño de localidad						
1 a 14 999 habitantes	57.3	3.2	39.1	0.4	5 311.3	100
15 000 habitantes o más	60.5	1.5	37.5	0.5	8 834.3	100
Total	59.3	2.1	38.2	0.4	14 145.6	100
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)						
Sí	55.0	3.0	41.7	0.4	2 174.3	100
No	58.2	3.1	38.6	0.1	285.1	100
No especificado	67.3	1.3	31.3		17.0	100
Total	55.4	3.0	41.3	0.3	2 476.3	100
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)						
Sí	57.9	1.7	40.1	0.4	7 672.3	100
No	57.4	1.9	40.1	0.5	892.2	100
No especificado	53.7	12.3	34.0		8.2	100
Total	57.8	1.7	40.1	0.4	8 572.7	100
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)						
Sin instrucción	53.1	1.7	44.5	0.7	415.8	100
Con primaria incompleta	56.4	2.1	41.1	0.3	2 171.1	100
Con primaria completa	58.8	1.8	38.9	0.6	1 721.8	100
Con secundaria	52.8	1.9	45.2	0.1	2 163.1	100
Carrera técnica o comercial	57.3	1.1	41.3	0.3	778.3	100
Preparatoria o normal básica	59.6	1.4	38.2	0.8	848.3	100
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	67.7	1.7	30.4	0.3	605.8	100
No especificado	59.7	2.4	37.2	0.6	605.0	100
Total	57.2	1.8	40.6	0.4	9 309.3	100
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)						
Total						
Población económicamente activa	54.6	1.8	43.3	0.3	4 546.1	100
Población económicamente inactiva	59.6	1.9	38.0	0.5	4 763.2	100
57.2	1.8	40.6	0.4	9309.3	100.0	
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más de edad)						
Pensionados o jubilados	74.1	1.0	24.7	0.2	192.5	100
Estudiantes	52.1	3.1	44.2	0.6	1 171.6	100
Actividades del hogar	60.6	1.4	37.5	0.4	2 757.6	100
Discapacitados	79.4	0.6	18.1	1.8	80.3	100
No trabajan por otras razones	63.2	2.3	33.9	0.6	528.7	100
Total	59.6	1.9	37.9	0.5	4 730.6	100

Continúa

Cuadro 4.5

Población que presentó problemas de salud durante las dos semanas previas a la entrevista, según tipo de recurso humano para la salud que le atendió y características poblacionales

(Continuación)

<i>Características poblacionales</i>	<i>Profesional de salud*</i>	<i>Personal de salud tradicional u otra persona**</i>	<i>No se atendió</i>	<i>No especificado</i>	<i>Frecuencia***</i>	<i>Total</i>	
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)							
Jornaleros o peones	45.0	1.8	53.0	0.2	322.2	100	
Empleados u obreros	56.9	1.5	41.3	0.3	2 248.7	100	
Trabajadores sin pago	54.2	3.2	42.6		263.3	100	
Trabajadores por su cuenta	53.5	2.0	44.4	0.2	1 608.3	100	
Patrones	65.6	1.0	32.8	0.6	51.1	100	
No especificado	51.6	1.6	43.8	3.0	11.3	100	
Total	54.8	1.8	43.2	0.3	4 504.9	100	
Población, según ingreso en el hogar en salarios mínimos							
Menos de un salario mínimo mensual	56.6	2.8	40.0	0.6	2 796.3	100	
De 1 a 1.9	56.4	2.3	40.9	0.4	3 020.2	100	
De 2 a 2.9	58.4	1.8	39.4	0.4	2 426.0	100	
De 3 a 4.9	59.5	1.5	38.4	0.6	2 752.4	100	
De 5 a 9.9	64.0	2.2	33.5	0.3	2 166.1	100	
De 10 o más	68.1	1.4	30.3	0.2	877.3	100	
Total	59.3	2.1	38.2	0.4	14 038.2	100	
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar							
Cuartil	(Intervalos de ingreso en pesos)						
I	0 a 1100	56.7	2.8	39.9	0.6	3 104.7	100
II	1101 a 2383	57.3	2.2	40.1	0.4	3 479.5	100
III	2384 a 4549	58.7	1.5	39.2	0.5	3 790.9	100
IV	4550 y más	64.0	2.0	33.8	0.3	3 663.1	100
Total		59.3	2.1	38.2	0.4	14 038.2	100

*Incluye las categorías de médico, enfermera, dentista, naturista/acupunturista, encargado de la comunidad/promotor/auxiliar, farmacéutico y otro personal de salud

** Incluye las categorías de curandero/partera/yerbero y familiar/ amigo/ vecino

*** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.6
Distribución porcentual de la población por preferencia de servicios de salud, según entidad federativa

Entidad federativa	Clinica u hospital de la SSA	Clinica u hospital del IMSS	Clinica u hospital del ISSSTE	Clinica u hospital de otros de seguridad social	Clinica u hospital IMSS-Solidaridad	Clinicas u hospitales privados	Otra institución	No se atiende	No responde	Total
Agascalientes	27.7	38.2	4.7	0.2	0.2	24.5	1.5	2.1	0.8	100
Baja California	14.2	37.9	5.5	0.2	0.4	35.6	2.4	2.4	1.5	100
Baja California Sur	29.5	33.8	13.1	2.2	0.0	17.8	0.6	1.3	1.6	100
Campeche	46.7	19.2	5.4	2.2	5.1	16.7	1.9	1.1	1.8	100
Coahuila	13.1	54.1	4.6	0.1	0.7	22.5	2.2	1.8	0.9	100
Colima	33.2	33.6	6.3	1.3	0.0	20.3	1.8	1.9	1.5	100
Chiapas	48.7	9.7	3.0	1.0	14.1	15.3	2.4	4.5	1.4	100
Chihuahua	20.0	38.6	3.6	0.2	0.4	30.8	3.5	1.7	1.1	100
Distrito Federal	26.4	24.8	8.2	1.7	0.1	33.0	2.5	1.8	1.5	100
Durango	33.4	29.3	6.7	0.3	6.6	20.3	0.8	1.7	0.9	100
Guanajuato	26.5	21.6	2.9	0.5	0.0	42.6	1.4	4.1	0.4	100
Guerrero	58.5	10.5	4.0	0.5	0.1	22.8	0.4	1.0	2.3	100
Hidalgo	45.7	14.9	2.6	0.5	11.4	22.1	0.8	1.4	0.7	100
Jalisco	31.6	29.8	1.5	0.2	0.0	28.4	3.0	3.6	1.9	100
México	31.5	27.0	2.7	0.7	0.1	29.9	3.7	2.1	2.2	100
Michoacán	35.6	11.0	3.3	0.4	2.8	40.0	1.3	3.7	1.8	100
Morelos	38.9	20.8	5.2	1.8	0.1	29.2	0.7	2.1	1.0	100
Nayarit	44.5	23.3	6.0	0.4	2.6	18.6	1.5	2.0	1.1	100
Nuevo León	19.1	45.6	1.7	1.1	0.0	24.6	3.2	1.6	3.1	100
Oaxaca	56.3	6.6	3.6	2.7	15.0	11.4	1.0	1.1	2.2	100
Puebla	35.5	13.4	3.1	0.7	10.9	30.7	1.7	1.7	2.3	100
Querétaro	34.3	33.0	2.2	0.2	0.1	24.2	1.5	3.5	0.9	100
Quintana Roo	37.0	24.0	4.3	1.2	0.2	29.4	0.5	1.5	1.8	100
San Luis Potosí	33.3	23.6	3.5	0.2	5.7	27.9	1.3	2.2	2.3	100
Sinaloa	24.9	35.3	4.5	1.4	3.4	24.3	3.3	2.1	0.9	100
Sonora	30.9	30.8	7.6	0.5	0.1	23.4	2.8	2.0	2.0	100
Tabasco	56.7	9.6	3.5	3.2	0.1	18.0	3.4	2.3	3.2	100
Tamaulipas	23.6	30.6	5.2	2.7	1.0	29.7	3.4	1.7	2.1	100
Tlaxcala	42.2	19.1	4.5	0.1	0.2	29.7	1.6	1.4	1.3	100
Veracruz	42.5	14.7	1.9	2.8	7.3	22.5	2.7	2.3	3.3	100
Yucatán	31.1	27.4	3.9	0.7	12.6	20.6	1.1	0.9	1.7	100
Zacatecas	41.5	18.1	3.8	0.3	4.8	27.3	0.6	2.4	1.2	100
Estados Unidos Mexicanos										
Porcentaje	33.8	24.2	3.9	1.0	3.3	27.4	2.3	2.3	1.9	100
Frecuencia****	32 760.4	23 423.5	3 735.6	1 016.8	3 224.0	26 563.5	2 240.2	2 198.7	1 796.3	96 959.0
Total										

* Incluye dobles derechohabientes

** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

**** Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.7

Distribución porcentual de la población, por sexo, según preferencia de servicios de salud

<i>Preferencia de servicios de salud</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Clínica u hospital del SSA	33.5	34.1	33.8
Clínica u hospital del IMSS	24.2	24.1	24.2
Clínica u hospital del ISSSTE	3.6	4.1	3.9
Clínica u hospital de otros de seguridad social	1.0	1.1	1.0
Clínica u hospital IMSS-Solidaridad	3.3	3.3	3.3
Clínicas u hospitales privados	27.4	27.3	27.4
Otra institución o lugar	2.3	2.3	2.3
No se atiende	2.8	1.9	2.3
No responde	1.9	1.8	1.8
Total			
Por ciento	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	47 772.2	49 186.8	96 959.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.8

Distribución porcentual de la población, por grupo de edad, según preferencia de servicios de salud

<i>Preferencia de servicios de salud</i>	<i>0 a 9</i>	<i>10 a 19</i>	<i>20 o más</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Clínica u hospital del SSA	40.7	37.4	29.2	24.0	33.8
Clínica u hospital del IMSS	20.9	20.8	27.1	12.7	24.2
Clínica u hospital del ISSSTE	2.9	3.6	4.4	5.5	3.9
Clínica u hospital de otros de seguridad social	0.9	0.9	1.2	0.0	1.0
Clínica u hospital IMSS-Solidaridad	3.9	4.1	2.7	7.5	3.3
Clínicas u hospitales privados	25.0	26.2	29.0	29.0	27.4
Otra institución o lugar	2.6	2.4	2.2	0.3	2.3
No se atiende	1.2	2.5	2.6	18.4	2.3
No responde	1.9	2.0	1.8	2.6	1.9
Total					
Por ciento	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	23 005.9	22 153.4	51 607.6	192.1	96 959.0

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.9
Distribución porcentual de la población, por sexo, según preferencia de servicios de salud y derechohabencia*

Preferencia de servicios de salud	IMSS		ISSSTE		Derechohabencia				No tiene		Total			
	Otra institución de seguridad social**		Seguros privados		Otras***									
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer		
Clinica u hospital del SSA	5.7	6.1	6.0	6.0	14.6	15.0	5.3	4.9	29.3	28.0	51.8	53.0	33.5	34.1
Clinica u hospital del IMSS	73.6	73.0	4.3	5.2	4.4	5.8	6.4	7.4	2.6	2.4	1.1	1.0	24.2	24.1
Clinica u hospital del ISSSTE	0.5	0.8	65.1	64.4	0.5	1.2	0.4	0.8	0.8	1.1	0.1	0.1	3.6	4.1
Clinica u hospital de otros de seguridad social	0.1	0.2	0.6	0.4	42.7	41.1	1.1	1.2	1.0	0.9	0.2	0.2	1.0	1.1
Clinica u hospital IMSS-Solidaridad	1.2	1.1	0.2	0.1	1.8	1.4	0.6	0.4	7.5	11.6	4.8	4.8	3.3	3.3
Clinicas u hospitales privados	15.5	16.1	20.7	20.9	20.3	20.1	81.2	80.7	30.2	26.2	33.9	33.6	27.4	27.3
Otra institución o lugar	0.8	0.8	1.2	1.2	13.4	12.2	1.9	2.0	26.5	28.0	2.5	2.6	2.3	2.3
No se atiende	1.3	0.8	0.7	0.5	0.5	1.1	1.1	0.1	1.2	0.3	3.6	2.7	2.7	1.9
No especificado	1.3	1.1	1.2	1.3	1.8	2.1	2.0	2.5	0.9	1.5	2.0	2.0	1.9	1.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Porcentaje	15 209.8	15 663.1	2 537.7	2 976.2	986.8	1 079.9	494.5	506.5	368.8	382.2	28 308.4	28 834.6	47 772.2	49 186.8
Frecuencia****														

* Incluye dobles derechohabencias

** Pemex, Sedena, Semar y otras de seguridad social para trabajadores de los gobiernos estatales

*** Otras instituciones sin especificar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.10
Distribución porcentual de la población derechohabiente, según preferencia de servicios de salud, por factores poblacionales

Características poblacionales	Frecuencia*										Total
	Clinica u hospital de la SSA	Clinica u hospital del IMSS	Clinica u hospital del ISSSTE	Clinica u hospital de otros de seguridad social	Clinica u hospital IMSS	Clinicas u hospitales privados	Otra institución o lugar	No se atiende	No especificado		
Edad											
0-9	8.1	57.1	7.9	2.0	1.5	19.6	2.2	0.3	1.3	100	
10-19	8.3	55.8	9.8	2.3	2.0	17.4	2.3	1.1	1.1	100	
20 o más	5.9	59.0	9.6	2.4	0.8	18.1	1.7	1.2	1.4	100	
No especificado	11.1	47.9	24.0	0.0	1.5	11.0		4.6	0.0	100	
Total	6.9	57.9	9.3	2.3	1.2	18.2	1.9	1.0	1.3	100	
Sexo											
Hombre	6.7	58.6	8.8	2.3	1.2	18.0	1.9	1.2	1.3	100	
Mujer	7.0	57.3	9.8	2.3	1.2	18.4	2.0	0.7	1.3	100	
Total	6.9	57.9	9.3	2.3	1.2	18.2	1.9	1.0	1.3	100	
Tamaño de localidad											
1 a 14 999 habitantes	15.2	52.1	9.1	1.2	5.0	14.0	1.3	0.7	1.4	100	
15 000 habitantes o más	4.5	59.6	9.3	2.6	0.1	19.4	2.1	1.1	1.3	100	
Total	6.9	57.9	9.3	2.3	1.2	18.2	1.9	1.0	1.3	100	
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)											
Sí	8.5	55.9	10.1	2.2	2.1	17.2	2.4	0.5	1.0	100	
No	10.7	60.1	5.7	1.5	3.7	14.6	2.0	0.9	0.8	100	
No especificado	9.1	46.5	3.1	0.7	8.1	25.2	1.0	2.3	4.1	100	
Total	8.7	56.1	9.8	2.1	2.3	17.1	2.3	0.6	1.0	100	
Alfabeto (Población de 15 años o más de edad)											
Sí	6.1	58.4	9.6	2.4	0.8	18.3	1.9	1.2	1.4	100	
No	9.2	62.8	8.7	1.7	3.6	11.2	0.8	1.1	0.9	100	
No especificado	3.0	59.7	8.7			23.9		0.7	4.0	100	
Total	6.2	58.5	9.5	2.4	0.9	18.0	1.8	1.2	1.4	100	
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)											
Sin instrucción	8.3	65.5	4.8	1.3	2.5	13.6	1.8	0.9	1.4	100	
Con primaria incompleta	9.4	62.4	7.9	2.0	2.5	12.3	1.2	1.2	1.1	100	
Con primaria completa	7.3	64.6	7.6	2.3	1.6	12.6	1.6	1.0	1.3	100	
Con secundaria	6.8	63.5	7.5	2.3	0.9	14.7	1.7	1.2	1.3	100	
Carrera técnica o comercial	4.0	57.2	10.4	2.7	0.2	21.2	2.1	1.0	1.3	100	
Preparatoria o normal básica	5.7	51.7	12.3	2.4	0.4	22.2	2.4	1.3	1.6	100	
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	2.9	38.5	16.3	3.0	0.1	33.9	2.7	1.4	1.4	100	
No especificado	7.1	65.2	9.6	2.3	1.5	10.9	1.0	1.2	1.0	100	
Total	6.4	58.3	9.6	2.4	1.1	17.9	1.8	1.2	1.3	100	

(Continúa)

Distribución porcentual de la población derechohabiente, según preferencia de servicios de salud, por factores poblacionales

(Continuación)

Características poblacionales	Frecuencia*	Clinica u hospital de la SSA	Clinica u hospital del IMSS	Clinica u hospital del ISSSTE	Clinica u hospital de otros de seguridad social	Clinica u hospital IMSS	Clinicas u hospitales privados	Otra institución o lugar	No se atiende	No especificado	Total
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)											
Población económicamente activa	13 520.9	6.9	57.3	10.6	3.2	1.2	16.6	2.0	0.9	1.2	100
Población económicamente inactiva	15 926.3	6.0	59.2	8.8	1.7	0.9	18.9	1.7	1.4	1.4	100
No especificado	49.5	7.5	56.1	6.5	7.8	0.0	21.1	1.0	0.0	0.2	100
Total	29 447.2	6.8	57.5	8.6	4.2	0.7	18.9	1.6	0.8	0.9	100
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más de edad)											
Pensionados o jubilados	910.2	2.6	61.6	14.2	5.6	0.1	12.4	1.6	1.0	0.9	100
Estudiantes	4 948.3	7.4	51.4	12.5	3.0	1.5	19.4	2.7	1.3	0.9	100
Actividades del hogar	6 333.0	7.3	60.6	8.5	3.2	1.2	15.7	1.6	0.6	1.4	100
Discapacitados	118.9	3.0	67.7	12.0	1.9	1.0	10.5	2.2	0.4	1.5	100
No trabajan por otras razones	1 160.8	6.3	60.6	11.8	2.0	1.1	14.0	1.2	1.5	1.4	100
Total	13 471.3	6.9	57.3	10.6	3.2	1.2	16.6	2.0	0.9	1.2	100
Jornaleros o peones											
Empleados u obreros	481.9	13.7	59.9	5.3	0.8	5.5	10.0	1.5	2.0	1.4	100
Trabajadores sin pago	12 468.7	5.2	60.0	9.4	1.8	0.3	18.6	1.8	1.3	1.5	100
Trabajadores por su cuenta	286.9	14.8	46.2	8.3	0.6	6.2	19.6	2.6	1.5	0.3	100
Patrones	2 460.1	7.6	57.4	6.8	1.2	2.4	20.7	1.4	1.5	1.1	100
No especificado	123.7	0.8	34.0	4.9	0.3	1.2	51.6	1.0	4.1	2.1	100
Total	43.0	14.2	55.8	4.1	3.4	0.8	12.9	1.7	1.4	1.4	100
Población, según ingreso en el hogar en salarios mínimos											
Menos de un salario mínimo mensual	3 977.1	8.6	55.9	8.8	3.1	4.4	14.8	1.6	1.3	1.6	100
De 1 a 1.9	5 864.8	10.4	64.6	5.1	0.9	2.6	12.7	1.9	0.9	1.0	100
De 2 a 2.9	6 223.1	8.5	64.0	8.5	1.9	1.2	12.5	1.5	0.8	1.2	100
De 3 a 4.9	9 079.9	7.0	61.8	8.3	2.2	0.5	16.2	2.1	1.0	1.0	100
De 5 a 9.9	9 352.5	5.1	55.5	11.9	2.8	0.3	20.1	1.9	0.9	1.5	100
De 10 o más	4 659.6	2.1	40.8	12.6	3.2	0.1	35.8	2.7	1.1	1.7	100
Total	39 157.3	6.9	58.0	9.3	2.3	1.2	18.2	1.9	1.0	1.3	100
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar											
Cuartil I (Intervalos de ingreso en pesos)	4 499.2	8.8	56.3	8.4	2.9	4.3	14.8	1.5	1.1	1.7	100
II	7 085.7	10.5	65.1	5.2	1.0	2.4	12.1	1.7	0.9	1.1	100
III	11 354.8	7.5	62.7	8.8	2.0	0.6	14.4	2.0	0.9	1.0	100
IV	16 217.4	4.3	51.9	11.6	2.9	0.2	24.5	2.1	1.0	1.5	100
Total	39 157.3	6.9	58.0	9.3	2.3	1.2	18.2	1.9	1.0	1.3	100

*Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 4.11
Distribución porcentual de la población abierta, por preferencia de servicios de salud para la población abierta, según factores poblacionales

Características poblacionales	Frecuencia*								Total	
	Clinica u hospital de la SSA	Clinica u hospital del IMSS	Clinica u hospital del ISSSTE	Clinica u hospital de otros de seguridad social	Clinica u hospital IMSS	Clinicas u hospitales privados	Otra institución o lugar	No se atiende		No especificado
Edad										
0-9	58.9	0.9	0.1	0.2	5.3	28.1	2.8	1.7	1.9	100
10-19	53.9	1.2	0.1	0.2	5.3	31.2	2.4	3.4	2.2	100
20 o más	48.4	1.0	0.2	0.2	4.2	37.9	2.5	3.7	1.9	100
No especificado	27.4	2.3	0.1	0.3	9.4	34.8	0.3	22.2	3.4	100
Total	52.4	1.0	0.1	0.2	4.8	33.7	2.6	3.2	2.0	100
Sexo										
Hombre	51.8	1.1	0.1	0.2	4.8	33.9	2.5	3.6	2.0	100
Mujer	53.0	1.0	0.1	0.2	4.8	33.6	2.6	2.7	2.0	100
Total	52.4	1.0	0.1	0.2	4.8	33.7	2.6	3.2	2.0	100
Tamaño de localidad										
1 a 14 999 habitantes	61.1	1.2	0.1	0.2	8.6	22.7	1.0	2.8	2.3	100
15 000 habitantes o más	42.0	0.9	0.2	0.2	0.2	46.8	4.4	3.7	1.6	100
Total	52.4	1.0	0.1	0.2	4.8	33.7	2.6	3.2	2.0	100
Aplicidad para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)										
Sí	57.6	0.8	0.1	0.2	5.5	28.6	2.8	2.2	2.2	100
No	61.8	1.6	0.0	0.2	7.8	20.1	2.9	3.0	2.4	100
No especificado	59.3				5.3	28.4	3.8	1.8	1.3	100
Total	58.2	0.9	0.1	0.2	5.8	27.6	2.8	2.3	2.2	100
Alfabeto (Población de 15 años o más de edad)										
Sí	47.9	1.1	0.2	0.2	3.7	38.9	2.5	3.7	1.9	100
No	56.0	1.3	0.1	0.2	9.1	24.1	2.0	4.9	2.3	100
No especificado	54.9				0.4	30.0	2.1	3.6	9.0	100
Total	48.8	1.1	0.2	0.2	4.3	37.2	2.5	3.8	2.0	100
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)										
Sin instrucción	55.2	1.1	0.0	0.2	8.6	24.1	2.3	6.3	2.3	100
Con primaria incompleta	56.7	1.0	0.1	0.1	6.5	27.3	2.4	3.7	2.1	100
Con primaria completa	54.3	1.1	0.1	0.1	4.8	32.2	2.5	3.2	1.6	100
Con secundaria	49.3	1.2	0.1	0.2	3.0	38.0	2.7	3.4	2.1	100
Carrera técnica o comercial	34.3	1.3	0.3	0.3	1.0	53.0	3.8	3.5	2.5	100
Preparatoria o normal básica	37.1	1.1	0.4	0.3	2.4	51.3	1.9	3.9	1.6	100
Con educación superior (licenciatura y posgrado)	19.9	1.1	0.6	0.2	0.4	70.7	2.3	3.3	1.6	100
No especificado	51.2	0.9	0.1	0.2	6.0	32.6	1.7	5.2	2.1	100
Total	49.7	1.1	0.2	0.2	4.5	36.3	2.5	3.7	2.0	100

(Continúa)

Cuadro 4.11
Distribución porcentual de la población abierta, por preferencia de servicios de salud para la población abierta, según factores poblacionales

Características poblacionales	(Continuación)									
	Frecuencia*	Clinica u hospital de la SSA	Clinica u hospital del IMSS	Clinica u hospital de otros de seguridad social	Clinica u hospital IMSS Solidaridad	Clinicas u hospitales privados	Otra institución o lugar	No se atiende	No especificado	Total
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)										
Población económicamente activa	19 174.4	51.3	1.0	0.2	0.2	4.8	2.3	3.2	1.9	100
Población económicamente inactiva	20 149.6	48.1	1.1	0.1	0.2	4.2	2.7	4.2	2.1	100
No especificado	95.9	54.9	0.9	0.0	0.0	5.0	0.0	3.4	4.6	100
Total	39 419.9	51.4	1.0	0.1	0.1	4.7	1.6	3.6	2.8	100
Población económicamente inactiva (Población de 12 años o más de edad)										
Pensionados o jubilados	62.3	38.9	0.9	0.4	0.2	3.2	3.2	1.6	2.8	100
Estudiantes	6 203.2	50.8	1.1	0.1	0.2	4.9	2.2	2.7	2.1	100
Actividades del hogar	10 314.3	53.5	0.9	0.1	0.2	5.0	2.3	2.8	1.8	100
Discapacitados	173.3	53.8	0.5	0.1	0.1	4.2	1.6	5.2	1.1	100
No trabaja por otras razones	2 421.0	43.6	1.5	0.4	0.1	3.3	2.6	6.5	1.7	100
Total	19 174.4	51.3	1.0	0.2	0.2	4.8	2.3	3.2	1.9	100
Posición en el trabajo (Población de 12 años o más de edad)										
Jornaleros o peones	2 558.8	60.7	1.3	0.1	0.2	6.6	1.6	4.7	2.2	100
Empleados u obreros	6 802.6	45.0	1.6	0.2	0.2	1.5	3.5	4.9	2.4	100
Trabajadores sin pago	1 598.6	52.9	0.8	0.1	0.1	9.4	2.3	2.8	2.4	100
Trabajadores por su cuenta	8 647.8	46.5	0.7	0.1	0.2	4.8	2.4	3.7	1.7	100
Patrones	221.8	17.9	1.4	0.0	0.0	0.6	2.3	2.6	1.9	100
No especificado	70.7	58.0	1.5	0.4	0.0	3.0	0.6	1.4	0.1	100
Total	19 900.6	48.1	1.1	0.1	0.2	4.2	2.7	4.1	2.1	100
Población, según ingreso en el hogar en salarios mínimos										
Menos de un salario mínimo mensual	15 648.0	57.9	1.2	0.1	0.3	9.4	1.8	3.8	2.0	100
De 1 a 1.9	13 596.0	61.5	0.8	0.1	0.1	5.6	2.4	2.7	2.1	100
De 2 a 2.9	8 852.7	54.7	1.2	0.1	0.2	2.9	3.2	2.7	1.9	100
De 3 a 4.9	9 915.2	46.5	0.9	0.2	0.2	1.8	3.1	3.1	2.0	100
De 5 a 9.9	6 444.7	37.4	1.2	0.2	0.1	0.7	3.1	3.5	2.2	100
De 10 o más	2 391.5	22.6	0.9	0.3	0.1	0.7	2.7	2.2	1.4	100
Total	56 848.4	52.5	1.0	0.1	0.2	4.8	2.6	3.1	2.0	100
Distribución de la población por cuartiles de ingreso mensual en el hogar (Intervalos de ingreso en pesos)										
I	17 256.0	58.4	1.2	0.1	0.3	9.2	1.8	3.7	2.1	100
II	15 486.3	60.6	0.9	0.1	0.1	5.0	2.5	2.7	1.8	100
III	13 389.8	48.9	0.9	0.1	0.2	2.1	3.3	3.0	2.1	100
IV	10 716.2	35.6	1.1	0.3	0.1	0.7	3.1	3.0	1.9	100
Total	56 848.4	52.5	1.0	0.1	0.2	4.8	2.6	3.1	2.0	100

* Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Utilización de servicios ambulatorios

C O N T E N I D O


- Utilización de servicios ambulatorios, preventivos, curativos y totales en los últimos 12 meses, por entidad federativa.
- Utilización de servicios ambulatorios, por grupos de edad y sexo en los últimos 12 meses.
- Utilizadores de servicios ambulatorios por sexo y grupo de edad, en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención.
- Población usuaria de servicios ambulatorios, por sexo, en los últimos 12 meses, según motivos de la última atención.
- Utilización de los servicios ambulatorios, por sexo, según motivos de la última atención.
- Utilizadores de servicios ambulatorios, por grupos de edad, según motivo informado de la última atención.
- Utilizadores de servicios ambulatorios, según motivo de la última atención e institución que proporcionó el servicio.

Utilización de servicios ambulatorios

- Uno de cada dos mexicanos utilizó algún servicio de salud en los últimos 12 meses.
- Se estima que 47.8 millones de personas utilizaron servicios de salud en los últimos 12 meses, de ellos 44.3 millones solicitaron servicios de salud ambulatorios y 3.4 millones se hospitalizaron.
- De los 44.3 millones de la población que utilizaron servicios de salud ambulatorios, 29.1 solicitaron servicios preventivos y 27.1 servicios ambulatorios curativos. Cabe señalar que cerca de 12 millones de personas solicitaron, tanto servicios preventivos como curativos.
- El 45.7% de todos los habitantes utilizaron servicios de salud ambulatorios, que incluyen tanto preventivos como curativos.
- La entidad con el porcentaje más bajo de utilización fue Baja California (37.6%) y el de más alto, Nayarit (56.6%).
- Una de cada tres personas, en general, utilizó servicios de salud preventivos. La entidad con la proporción más baja fue Zacatecas (23.1%) y con la más alta Nayarit, (39.6%).
- Más de uno de cada cuatro personas, en general, (28%) utilizó servicios ambulatorios curativos. El porcentaje más bajo correspondió a Baja California (21.9%) y el más alto a Nayarit (36.1%).
- La proporción de mujeres que utilizaron servicios de salud ambulatorios fue mayor (54%), en relación con los hombres (37.5%).
- Los niños fueron importantes usuarios de los servicios de salud ambulatorios. Los de 0 a 4 años de edad, en 78.3% y los de 5 a 9 años de edad, en 45.5%.
- La mayor frecuencia del uso de servicios ambulatorios de salud por las mujeres adultas se observó a partir de los 20 años de edad. En este grupo, a mayor edad mayor frecuencia de uso de servicios de salud.
- En los hombres adultos a partir de los 30 años de edad se observó un discreto incremento en la utilización de servicios de salud ambulatorios.
- Las principales instituciones que atendieron a los usuarios de servicios de salud ambulatorios fueron: la SSA (37.9%), los servicios privados (25%), el IMSS (23.6%), el IMSS-Solidaridad 5.2% y el ISSSTE 3.8%.

- Se estima que la SSA atendió 16.8 millones de personas que utilizaron servicios de salud ambulatorios, los servicios privados 11 millones, el IMSS 10.5 millones, el IMSS-Solidaridad 2.3 millones y el ISSSTE 1.7 millones de personas.
- La población que utilizó servicios de salud ambulatorios de la SSA y el IMSS-Solidaridad, por grupos de edad y sexo, fueron principalmente niños y mujeres.
- Los usuarios de las instituciones de seguridad social fueron grupos de edad productiva y particularmente mayores de 60 años.
- El principal motivo de utilización de servicios de salud ambulatorios fue por medidas preventivas (42.1%), seguida de atención curativa por enfermedades transmisibles (24.4%), enfermedades no transmisibles (9.3%) y lesiones (3.2%).
- Las mujeres utilizaron más frecuentemente los servicios ambulatorios, con excepción de la atención por enfermedades transmisibles y lesiones.
- La atención de enfermedades transmisibles representó un porcentaje importante (24.4%) como motivo de utilización de servicios de salud ambulatorios.
- La proporción de uso de servicios ambulatorios decreció conforme se incrementa la edad para los casos de servicios preventivos y de atención por enfermedades transmisibles. En cambio, se incrementó la proporción de uso por atención de enfermedades no transmisibles.
- La proporción de utilización de servicios preventivos, como parte de los servicios ambulatorios en las Secretaría de Salud y en el IMSS-Solidaridad, fue superior a 54%. En cambio, en las instituciones de seguridad social y privadas, fue menor; por ejemplo, en el IMSS (38%), en el ISSSTE (27.2%) y en los privados (25%).
- La proporción de utilización de servicios curativos por enfermedades no transmisibles, como motivo de utilización de servicios ambulatorios en las instituciones de seguridad social, fue del doble (ISSSTE 15%, IMSS 14.1%), en comparación con la SSA 6.1%.


Figura 5.1
Distribución porcentual de la población, según utilización de servicios de salud en los últimos doce meses, de acuerdo con el tipo de servicio



N* = Frecuencia ponderada en miles


Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 5.2
Tasas anuales de utilización de servicios de salud, según tipo



N* = Frecuencia ponderada en miles


Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000



N*=44 357
 N*= Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 5.3
Tasa de utilización de servicios de salud ambulatorios en los últimos doce meses, por entidad federativa




N*=44 357
 N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 5.4
Tasa de utilización de servicios ambulatorios, por grupos de edad y sexo, en los últimos doce meses

Figura 5.5
Distribución porcentual de
utilizadores
de servicios
ambulatorios en los
últimos doce meses,
según institución que
proporcionó la última
atención



N*=44 375

N*=Frecuencia ponderada en miles


* No se incluye en los valores de edad no especificados, los cuales representan al 0.1% de la población

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 5.6
Distribución porcentual,
por sexo, de los
usuarios de servicios
ambulatorios en los últimos
doce meses, según motivo
de la última atención



N*=44 375

N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 5.7
Distribución porcentual, por grupos de edad,* de utilizadores de servicios ambulatorios, según motivo informado de la última atención

N*=44 375

N*=Frecuencia ponderada en miles

* No se incluyó la distribución de edad no especificada que asciende al 0.1 %

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 5.1
**Tasa* de utilización de servicios ambulatorios, preventivos,
 curativos y totales, en los últimos doce meses**

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia**</i>	<i>Tasa de utilización de servicios preventivos</i>	<i>Frecuencia**</i>	<i>Tasa de utilización de servicios curativos</i>	<i>Frecuencia**</i>	<i>Tasa de utilización de servicios ambulatorios</i>
Aguascalientes	269.0	28.6	222.9	23.7	385.9	41.1
Baja California	584.9	23.7	540.5	21.9	927.4	37.6
Baja California Sur	113.7	27.2	111.6	26.7	181.7	43.4
Campeche	200.8	29.2	146.9	21.4	279.9	40.7
Coahuila	644.9	28.2	634.7	27.8	1 017.5	44.5
Colima	165.8	30.9	158.8	29.6	250.8	46.7
Chiapas	1 105.1	28.3	879.2	22.5	1 612.1	41.3
Chihuahua	784.8	25.8	682.0	22.5	1 189.8	39.2
Distrito Federal	2 912.6	34.1	2 855.2	33.4	4 554.1	53.3
Durango	518.7	36.0	503.7	35.0	781.8	54.3
Guanajuato	1 301.5	28.0	1 163.0	25.0	1 945.0	41.8
Guerrero	780.1	25.5	696.8	22.7	1 184.0	38.7
Hidalgo	779.7	35.0	676.1	30.4	1 144.0	51.4
Jalisco	2 060.8	32.7	2 233.5	35.5	3 238.2	51.5
México	3 441.3	26.4	3 512.0	26.9	5 485.4	42.0
Michoacán	942.9	23.8	916.8	23.2	1 509.3	38.1
Morelos	317.2	20.5	367.7	23.8	562.3	36.4
Nayarit	360.1	39.6	328.6	36.1	515.0	56.6
Nuevo León	1 287.3	33.8	1 272.0	33.4	1 973.7	51.8
Oaxaca	996.4	29.1	751.1	22.0	1 400.7	41.0
Puebla	1 825.6	36.1	1 508.1	29.8	2 598.1	51.4
Querétaro	457.3	32.7	381.5	27.3	635.0	45.4
Quintana Roo	287.5	33.0	240.1	27.6	418.2	48.1
San Luis Potosí	734.0	32.1	520.1	22.7	1 008.3	44.0
Sinaloa	675.2	26.8	772.4	30.7	1 158.1	46.0
Sonora	549.0	25.1	533.0	24.4	874.5	40.0
Tabasco	612.2	32.5	589.1	31.3	953.3	50.6
Tamaulipas	1 005.5	36.8	941.1	34.4	1 457.3	53.3
Tlaxcala	255.3	26.7	199.1	20.8	376.4	39.3
Veracruz	2 317.0	33.7	1 972.6	28.7	3 412.1	49.6
Yucatán	525.3	31.8	462.1	28.0	785.6	47.6
Zacatecas	310.9	23.1	350.3	26.0	541.9	40.2
Estados Unidos Mexicanos	29 122.5	30.0	27 122.5	28.0	44 357.5	45.7

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 5.2

Tasa* de utilización, por grupos de edad y sexo, de servicios ambulatorios en los últimos 12 meses

<i>Grupos de edad</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
0 a 4 años	79.0	77.5	78.3
5 a 9 años	45.4	45.5	45.5
10 a 19 años	28.4	35.7	32.1
20 a 29 años	23.2	51.1	37.7
30 a 39 años	26.6	59.2	43.5
40 a 49 años	32.1	61.8	47.2
50 a 59 años	37.1	65.1	51.4
60 a 69 años	45.7	67.0	56.9
70 a 79 años	51.3	67.8	59.9
80 años o más	50.4	56.2	53.7
No especificado	17.2	9.6	13.3
Total	37.5	53.8	45.7
Frecuencia**	17 906.4	26 451.1	44 357.5

*Las tasas se multiplicaron por 100

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de Servicios. México, 2000

Cuadro 5.3
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad*, de utilizadores de servicios ambulatorios en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Años										Total	
	0 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 o más		
SSA**												
Hombres	51.9	45.6	39.5	22.2	22.3	22.3	22.7	17.9	16.0	17.7	36.0	
Mujeres	52.7	46.2	42.0	36.4	38.2	33.0	27.9	22.7	21.0	23.7	39.0	
Total	52.4	45.9	40.9	32.3	33.5	29.4	26.0	20.9	18.9	21.2	37.9	
IMSS Solidaridad												
Hombres	4.8	5.8	6.7	3.6	4.1	4.3	4.8	3.9	4.1	2.8	5.0	
Mujeres	5.8	6.2	6.4	5.3	4.3	5.4	4.7	4.1	3.3	2.8	5.3	
Total	5.3	6.0	6.6	4.8	4.2	5.1	4.7	4.0	3.6	2.8	5.2	
IMSS												
Hombres	21.4	20.2	19.5	28.0	26.2	25.1	29.8	37.6	39.0	34.6	24.1	
Mujeres	20.8	19.4	19.5	23.8	22.9	24.2	28.0	33.6	35.0	25.7	23.2	
Total	21.1	19.8	19.5	25.0	23.9	24.6	28.7	35.2	36.6	29.4	23.6	
ISSSTE estatal/ISSSTE												
Hombres	2.4	3.0	4.3	2.3	4.0	4.8	6.2	7.8	7.7	7.5	3.8	
Mujeres	2.2	3.1	3.2	2.5	4.8	5.2	6.0	8.1	7.3	5.9	3.9	
Total	2.3	3.1	3.7	2.5	4.6	5.1	6.0	8.0	7.5	6.5	3.8	
Otras de seguridad social***												
Hombres	0.8	0.7	1.2	2.5	1.6	2.0	2.0	2.5	2.5	1.4	1.4	
Mujeres	0.9	1.1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.9	1.6	2.5	2.1	1.3	
Total	0.9	0.9	1.2	1.6	1.5	1.7	1.9	1.9	2.5	1.9	1.3	
Privadas												
Hombres	16.2	20.9	24.4	36.7	36.2	36.6	30.8	27.9	29.1	33.3	25.9	
Mujeres	15.2	20.5	24.0	28.1	26.0	28.0	28.4	28.0	28.3	37.7	24.5	
Total	15.8	20.7	24.2	30.7	29.0	30.8	29.3	28.0	28.7	36.0	25.0	
Otras												
Hombres	1.5	2.3	3.5	3.5	4.3	3.7	3.1	1.8	0.8	2.1	2.7	
Mujeres	1.4	2.3	2.7	1.9	1.7	2.1	2.2	1.5	2.3	1.4	2.0	
Total	1.5	2.3	3.0	2.4	2.5	2.6	2.6	1.6	1.7	1.7	2.3	

(Continúa)

Cuadro 5.3
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad*, de utilizadores de servicios ambulatorios en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Años										Total	
	0 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 o más		
No especificado												
Hombres	1.0	1.5	0.9	1.2	1.3	1.2	0.6	0.6	0.8	0.6	1.1	
Mujeres	0.8	1.2	1.1	0.8	0.7	0.5	0.9	0.4	0.3	0.7	0.8	
Total	0.9	1.3	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.9	
Total hombres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia****	4 588.5	2 668.7	3 157.1	2 028.8	1 690.4	1 343.9	985.6	777.3	4 555.9	193.4	17 906.4	
Total mujeres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia****	4 356.5	2 594.5	3 949.3	4 798.9	4 049.9	2 697.8	1 812.7	1,253.4	651.0	277.6	26 451.1	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia****	8 945.0	5 263.1	7 106.4	6 827.7	5 740.3	4 041.7	2 798.3	2,030.6	1 106.9	471.0	44 357.5	

*No se incluyen los valores de edad no especificados, los cuales representan al 0.1% de la población

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

***Incluye Pemex, Marina y Defensa

****Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de Utilización de Servicios. México, 2000

Cuadro 5.4
Distribución porcentual, por sexo, de utilizadores de servicios ambulatorios en los últimos 12 meses, según motivo de la última atención

<i>Motivo de atención</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Enfermedades transmisibles			
Infecciones respiratorias	23.0	16.9	19.4
Diarrea	2.3	1.6	1.9
Parasitosis intestinal	1.7	1.2	1.4
Enfermedades exantemáticas	0.9	0.7	0.8
Fiebre	0.8	0.5	0.6
Otitis	0.4	0.4	0.4
Subtotal	29.0	21.3	24.4
Enfermedades no transmisibles			
Hipertensión arterial	2.7	4.0	3.5
Diabetes	3.3	3.1	3.1
Cefalea	1.1	1.5	1.3
Artritis	0.3	0.4	0.4
Asma	0.5	0.3	0.4
Colecistitis	0.3	0.4	0.4
Gota	0.1	0.0	0.1
Colesterol	0.2	0.1	0.1
Subtotal	8.5	9.9	9.3
Lesiones			
Por accidente	5.1	1.6	3.0
Por violencia	0.3	0.1	0.2
Subtotal	5.4	1.7	3.2
Servicios preventivos			
Vacunación	25.0	18.6	21.2
Detección de cáncer cérvico-uterino	—	11.9	7.1
Limpieza dental	5.4	4.6	5.0
Cuidado del embarazo	—	5.9	3.5
Revisión del niño sano	2.6	1.5	2.0
Planificación familiar	0.2	1.8	1.2
Pláticas de educación para la salud	0.4	1.6	1.1
Certificado médico	1.2	0.7	0.9
Atención de brigadas de salud	0.3	0.3	0.3
Subtotal	35.3	46.7	42.1
Otro problema			
No especificado	19.9	19.0	19.4
	1.9	1.4	1.6
Total	100.0	100.0	100.0
Frecuencia *	17 906.4	26 451.1	44 357.5

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 5.5

Distribución porcentual, por grupos de edad,* de utilizadores de servicios ambulatorios en los últimos 12 meses, según motivo informado de la última atención

Motivo de atención	0 a 9 años	10 a 19 años	20 años o más	Total
Enfermedades transmisibles				
Infecciones respiratorias	26.1	23.9	13.8	19.3
Diarrea	2.9	1.5	1.4	1.9
Parasitosis intestinal	1.8	2.4	0.9	1.4
Enfermedades exantemáticas	1.2	1.4	0.4	0.8
Fiebre	0.7	0.8	0.4	0.6
Otitis	0.3	0.4	0.4	0.4
Subtotal	33.0	30.4	17.2	24.4
Enfermedades no transmisibles				
Hipertensión arterial	–	0.2	6.7	3.5
Diabetes	–	0.1	6.0	3.1
Cefalea	0.2	1.7	1.9	1.3
Artritis	–	–	0.7	0.4
Asma	0.4	0.7	0.4	0.4
Colecistitis	–	–	0.7	0.4
Gota	–	–	0.2	0.1
Colesterol	–	–	0.2	0.1
Subtotal	0.6	2.8	16.7	9.3
Lesiones				
Por accidente	1.5	4.2	3.6	3.0
Por violencia	0.0	24.4	66.7	0.2
Subtotal	1.5	4.5	3.8	3.2
Servicios preventivos				
Vacunación	47.1	20.1	5.6	21.2
Detección de cáncer cérvico-uterino	–	0.7	13.4	7.1
Limpieza dental	3.3	9.2	4.8	5.0
Cuidado del embarazo	–	3.7	5.6	3.5
Revisión del niño sano	5.6	1.1	0.0	1.9
Planificación familiar	–	0.7	2.0	1.1
Pláticas de educación para la salud	0.1	0.6	1.8	1.1
Certificado médico	0.3	2.9	0.6	0.9
Atención de brigadas de salud	0.3	0.6	0.2	0.3
Subtotal	56.6	39.7	34.0	42.1
Otro problema	7.0	20.9	26.6	19.4
No especificado	1.3	1.7	1.7	1.6
Total	100.0	100.0	100.0	100
Frecuencia **	14 208.1	7 106.4	23 016.5	44 357.5

* No se incluyó la distribución de edad no especificada que asciende al 0.1%

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 5.6
Distribución porcentual de utilizadores de servicios ambulatorios en los últimos 12 meses, por institución que proporcionó el servicio, según motivo de la última atención

Motivo de atención	SSA*	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social**	Privadas	Otras	No especificado	Total
Transmisibles									
Infecciones respiratorias	15.3	12.9	18.4	23.1	22.0	26.9	25.9	12.8	19.3
Diarrea	1.8	2.2	1.1	2.3	0.9	2.6	2.7	1.3	1.9
Parasitosis intestinal	1.4	1.6	1.1	1.3	1.6	1.7	1.2	1.2	1.4
Enfermedades exantemáticas	0.8	0.6	0.7	0.4	1.8	1.0	0.8	0.8	0.8
Fiebre	0.6	1.5	0.4	0.2	0.2	0.6	0.5	0.4	0.6
Otitis	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.0	0.4
Subtotal	20.2	19.0	22.0	27.6	26.9	33.3	31.4	16.5	24.4
No transmisibles									
Hipertensión arterial	2.2	2.4	5.8	6.3	5.6	3.0	3.1	2.1	3.5
Diabetes	1.9	2.4	5.5	5.3	4.2	2.6	2.3	1.3	3.1
Cefalea	1.2	2.0	1.2	1.4	1.0	1.4	1.2	2.1	1.3
Arritmias	0.2	0.4	0.4	0.7	0.3	0.6	0.2	0.3	0.4
Asma	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.2	0.2	0.4
Colecistitis	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7	0.6	0.1	0.1	0.4
Gota	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
Colesterol	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1
Subtotal	6.1	7.8	14.1	15.0	12.7	9.1	7.6	6.0	9.3
Lesiones									
Por accidente	2.0	1.8	4.2	3.3	3.1	3.2	8.7	2.3	3.0
Por violencia	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.9	0.2	0.2
Subtotal	2.1	1.9	4.4	3.4	3.3	3.4	9.6	2.5	3.2
Preventivas									
Vacunación	34.5	32.0	19.3	10.2	8.4	3.0	10.2	38.6	21.0
Detección de cáncer cérvico-uterino	8.3	6.1	7.7	7.9	6.5	5.4	2.3	2.7	7.1
Limpieza dental	3.0	1.7	3.0	3.8	8.3	10.6	4.4	5.2	5.0
Cuidado del embarazo	3.5	3.0	4.3	2.6	3.1	3.2	3.0	3.6	3.5
Revisión del niño sano	2.5	5.1	1.5	1.0	1.1	1.3	1.4	0.3	1.9
Planificación familiar	1.7	1.1	1.2	0.6	1.0	0.6	0.4	0.3	1.1
Pláticas de educación para la salud	1.9	4.4	0.3	0.3	0.2	0.0	1.8	0.8	1.1
Certificado médico	1.0	0.3	0.5	0.8	1.2	1.1	1.6	1.1	0.9
Atención de brigadas de salud	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3
Subtotal	57.0	54.0	38.0	27.2	29.8	25.2	25.2	53.1	42.1
Otro problema									
No especificado	13.2	16.0	20.1	25.1	25.7	27.5	23.2	12.1	19.4
	1.4	1.3	1.4	1.7	1.6	1.5	3.0	9.8	1.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia***	16 794.3	2 297.7	10 456.1	1 703.0	594.7	11 108.7	1 004.1	398.9	44 357.5

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena y Semar

*** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de Utilización de Servicios. México 2000

Utilización de servicios preventivos

C O N T E N I D O

- Población total, por sexo, según condición de búsqueda o atención de algún servicio preventivo de salud en los últimos 12 meses.
- Utilización de servicios, por grupos de edad y sexo, ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses.
- Utilización de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, por entidad federativa.
- Utilizadores, por sexo y grupo de edad, de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención.
- Población, por sexo, menor de cinco años de edad que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio.
- Mujeres de 12 a 49 años de edad que buscaron o recibieron atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio.
- Población total, por sexo, que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio.
- Población mayor de 40 años de edad, por sexo, que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio.
- Utilización de servicios sólo preventivos, según factores predisponentes y habilitadores.
- Utilización de servicios sólo preventivos según factores predisponentes y habilitadores, por institución que proporcionó la última atención.
- Utilizadores de servicios sólo preventivos, según factores predisponentes y habilitadores, por institución.

Utilización de servicios preventivos

- Se estima que 29.1 millones de mexicanos utilizaron servicios de salud preventivos en los últimos 12 meses.
- Proporcionalmente, las mujeres utilizaron dos veces más los servicios de salud preventivos, en relación con los varones.
- De todos los niños menores de cinco años de edad, 2 de cada 3 utilizaron los servicios preventivos (68.8%). En cambio los niños de 5 a 9 años de edad los utilizaron uno de cada cuatro (27%).
- En las mujeres a partir de los 20 años de edad se incrementó el uso de servicios preventivos, pero nunca llegaron a utilizarlos en más de 50%.
- En los hombres a partir de los 30 años de edad se incrementó discretamente el uso de servicios preventivos, pero nunca alcanzaron a utilizarlos más de 25%.
- Las entidades federativas, en donde particularmente se observó la mayor frecuencia de uso de los servicios preventivos, fueron aquellas en donde se localizan las grandes ciudades.
- Las instituciones que brindaron la mayor proporción de los servicios preventivos fueron la SSA (51%), el IMSS (21.2%), los servicios privados (15%), el IMSS Solidaridad (6.6%) y el ISSSTE (2.5%).
- Se estima que del total de niños menores de cinco años de edad (11.4 millones), 70% utilizó en los últimos 12 meses servicios preventivos (7.9 millones).
- Del total de niños menores de cinco años de edad que solicitaron servicios preventivos (7.9 millones) 94.1% lo hicieron para vacunación, y sólo uno de cada cinco solicitaron revisión del crecimiento y desarrollo.
- De los 29.4 millones de mujeres de 12 a 49 años de edad, sólo 36.3% utilizaron servicios preventivos (10.7 millones).
- Del total de mujeres de 12 a 49 años de edad que solicitaron atención preventiva sus principales motivos fueron: detección de cáncer cervicouterino (44.9%), vacunación (23.8%), cuidado del embarazo (19.9%), prevención en salud oral (12.2%) y detección de hipertensión arterial (9.3%).
- Sólo 17% del total de hombres mayores de 40 años de edad utilizaron servicios de salud preventivos.
- En el caso de las mujeres mayores de 40 años de edad 44.4% utilizaron servicios preventivos en los últimos 12 meses.

- Los principales motivos de atención de servicios preventivos en mujeres de 40 años y más de edad fueron: detección de cáncer cervicouterino (55%), prevención de hipertensión arterial (30%), prevención de diabetes (24%), vacunación (16%) y prevención en salud oral (9.0%).
- Sólo uno de cada dos mexicanos menores de 10 años de edad y uno de cada cuatro de los adultos utilizaron los servicios preventivos.
- La cobertura de servicios preventivos fue baja en población adulta.
- Los enfermos utilizaron más los servicios preventivos, en relación con las personas aparentemente sanas.
- El tamaño de la localidad no influyó en la utilización de los servicios preventivos.
- La población económicamente inactiva utilizó más los servicios preventivos, en relación con la población activa, excepto los estudiantes y los individuos que no trabajan por diversas razones.
- Al interior de la población económicamente activa las posiciones en el trabajo más modestas se asociaron a un bajo uso de servicios preventivos (jornaleros, peones, empleados y obreros).
- No existieron diferencias importantes entre los ingresos económicos y el uso de los servicios preventivos.
- La población que utilizó servicios preventivos en la SSA fue proporcionalmente mayor en los siguientes grupos: niños, los habitantes de poblaciones rurales, la población con bajos niveles de educación formal, los jornaleros y peones y los miembros del hogar con ingresos económicos bajos.
- La población que utilizó servicios preventivos en las instituciones de seguridad social, fue proporcionalmente mayor en los siguientes grupos: población urbana, con educación formal intermedia y empleados con ingresos intermedios.
- Las poblaciones que utilizaron servicios preventivos en servicios privados fueron proporcionalmente mayores en los siguientes grupos: población urbana, con altos niveles de educación formal, son patrones y tienen ingresos económicos altos.
- Las tasas de utilización de servicios de salud preventivos se incrementaron en promedio 20% en la población derechohabiente, en relación con los no derechohabientes.

Figura 6.1
Distribución, por sexo, de la población, según condición de búsqueda de atención en algún servicio preventivo de salud en los últimos doce meses





Figura 6.2
Tasa de utilización, por grupos de edad y sexo, de servicios ambulatorios preventivos en los últimos doce meses



N* = 29 1220
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de Salud. México, 2000




Figura 6.3
Tasa de utilización de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según entidad federativa





Figura 6.4
Porcentaje de la población menor de cinco años de edad que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos* en los últimos doce meses, según tipo de servicio

Figura 6.5
Porcentaje de mujeres de 12 a 49 años de edad, que buscaron o recibieron atención médica en los servicios preventivos* en los últimos doce meses, según tipo de servicio




N*=10 679

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 6.6
Porcentaje, por sexo, de población total que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos* en los últimos doce meses, según tipo de servicio



N*=29 394

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Los porcentajes se presentan por columna y no suman 100%, debido a que se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México 2000




Figura 6.7
Porcentaje, por sexo, de población mayor de 40 años o más que buscó o recibió atención médica en los servicios preventivos* en los últimos doce meses, según tipo de servicio

N*=6 365

N*=Frecuencia ponderada en miles

* Los porcentajes se presentan por columna y no suman 100%, debido a que se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 6.1
Distribución de la población, por sexo, según condición de búsqueda de atención en algún servicio ambulatorio preventivo en los últimos 12 meses

<i>Buscó o recibió atención en algún servicio preventivo de salud en los últimos 12 meses</i>	<i>Hombre</i>		<i>Mujer</i>		<i>Total</i>	
	<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>
Sí	10 102.6	21.1	19 020.0	38.7	29 122.5	30.0
No	37 469.0	78.5	29 972.6	60.9	67 441.7	69.6
No especificado	200.6	0.4	194.2	0.4	394.8	0.4
Total	47 772.2	100.0	49 186.8	100.0	96 959.0	100.0

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.2
Tasa* de utilización, por grupos de edad y sexo, de servicios ambulatorios preventivo, en los últimos 12 meses

<i>Grupos de edad</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
0 a 4 años	69.2	68.4	68.8
5 a 9 años	27.0	26.9	27.0
10 a 19 años	13.8	20.5	17.1
20 a 29 años	7.9	38.0	23.5
30 a 39 años	9.3	46.5	28.6
40 a 49 años	12.9	46.1	29.8
50 a 59 años	17.9	47.0	32.8
60 a 69 años	23.1	43.7	33.9
70 a 79 años	24.2	40.8	32.8
80 años o más	17.7	19.7	18.8
No especificado	2.6	4.7	3.7
Total	21.1	38.7	30.0
Frecuencia**	10 102.6	19 020.0	29 122.5

*Las tasas se multiplicaron por 100

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.3

**Tasa * de utilización de servicios ambulatorios preventivos
en los últimos 12 meses, según entidad federativa**

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia**</i>	<i>Tasa de utilización preventiva</i>
Aguascalientes	269.0	28.6
Baja California	584.9	23.7
Baja California Sur	113.7	27.2
Campeche	200.8	29.2
Coahuila	644.9	28.2
Colima	165.8	30.9
Chiapas	1 105.1	28.3
Chihuahua	784.8	25.8
Distrito Federal	2 912.6	34.1
Durango	518.7	36.0
Guanajuato	1 301.5	28.0
Guerrero	780.1	25.5
Hidalgo	779.7	35.0
Jalisco	2 060.8	32.7
México	3 441.3	26.4
Michoacán	942.9	23.8
Morelos	317.2	20.5
Nayarit	360.1	39.6
Nuevo León	1 287.3	33.8
Oaxaca	996.4	29.1
Puebla	1 825.6	36.1
Querétaro	457.3	32.7
Quintana Roo	287.5	33.0
San Luis Potosí	734.0	32.1
Sinaloa	675.2	26.8
Sonora	549.0	25.1
Tabasco	612.2	32.5
Tamaulipas	1 005.5	36.8
Tlaxcala	255.3	26.7
Veracruz	2 317.0	33.7
Yucatán	525.3	31.8
Zacatecas	310.9	23.1
Estados Unidos Mexicanos	29 122.5	30.0

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.4
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad*, de los utilizadores de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención

	Años										Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 o más	
<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>											
SSA**											
Hombres	61.9	57.9	50.5	32.5	26.4	26.0	24.4	32.8	25.7	30.4	53.2
Mujeres	62.3	57.6	51.9	44.0	45.1	42.8	37.6	37.6	36.2	47.0	50.2
Total	62.1	57.7	51.3	42.4	42.8	40.1	35.0	36.5	33.7	42.1	51.2
IMSS-Solidaridad											
Hombres	5.4	7.4	9.7	4.1	7.7	7.5	9.3	7.1	7.5	7.2	6.7
Mujeres	6.3	8.0	8.9	5.9	4.9	6.9	7.5	7.0	6.6	8.9	6.6
Total	5.8	7.7	9.2	5.7	5.2	7.0	7.8	7.0	6.8	8.4	6.6
IMSS											
Hombres	23.1	19.6	15.3	20.4	20.2	18.5	13.9	27.6	46.1	31.6	20.6
Mujeres	21.9	18.8	15.7	25.0	21.9	21.2	21.5	30.4	29.3	14.0	21.5
Total	22.5	19.2	15.6	24.3	21.7	20.8	20.0	29.7	33.4	19.2	21.2
ISSSTE estatal/ISSSTE											
Hombres	1.8	2.0	2.8	2.2	2.3	1.1	2.3	2.9	1.2	0.0	2.1
Mujeres	1.8	2.4	1.9	2.1	4.1	3.7	5.8	4.2	3.5	0.0	2.7
Total	1.8	2.2	2.2	2.1	3.9	3.2	5.1	3.9	2.9	0.0	2.5
Otras de seguridad social***											
Hombres	0.4	0.4	0.8	3.1	1.8	2.1	0.3	5.2	0.0	0.0	0.8
Mujeres	0.7	1.1	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.4	3.6	6.4	1.0
Total	0.6	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	1.3	2.3	2.7	4.5	0.9
Privadas											
Hombres	5.3	9.4	17.5	31.6	36.6	39.6	45.2	22.0	17.9	30.8	13.5
Mujeres	5.4	9.1	17.4	19.7	21.6	21.8	23.7	18.6	18.0	23.7	15.8
Total	5.3	9.2	17.5	21.4	23.4	24.7	28.0	19.4	18.0	25.8	15.0
Otras											
Hombres	1.0	1.1	2.1	3.9	3.1	2.5	3.7	1.2	1.6	0.0	1.6
Mujeres	0.7	1.4	1.7	1.5	0.9	1.7	1.4	0.4	2.2	0.0	1.2
Total	0.8	1.3	1.9	1.8	1.2	1.8	1.9	0.6	2.0	0.0	1.4

(Continúa)

Cuadro 6.4
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad*, de los utilizadores de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención

	(Continuación)										Total
	Años										
	0 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 o más	
No especificado											
Hombres	1.1	2.2	1.3	2.2	1.9	2.7	0.9	1.2	0.0	0.0	1.5
Mujeres	0.9	1.6	1.7	0.9	0.4	0.6	1.0	0.4	0.6	0.0	1.0
Total	1.0	1.9	1.5	1.1	0.6	0.9	1.0	0.6	0.4	0.0	1.1
Total hombres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia****	2 940.2	1 151.4	1 087.2	433.3	307.8	195.2	121.2	63.5	25.1	6.9	6 332.7
Total mujeres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia****	2 828.1	1 122.5	1 731.1	2 671.5	2 183.8	1 018.5	485.2	211.1	77.8	16.4	12 347.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia****	5 768.3	2 273.9	2 818.3	3 104.8	2 491.6	1 213.8	606.3	274.6	102.9	23.3	18 679.9

* No se incluyen los valores de edad no especificados, los cuales representan al 1% de la población

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Sedena, Semar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.5
Porcentaje, por sexo, de la población menor de cinco años de edad que recibió atención en los servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio

<i>Servicio preventivo recibido</i>	<i>Hombre</i>	<i>Mujer</i>	<i>Total</i>
Vacunación	94.2	94.0	94.1
Revisión del niño sano	20.9	19.4	20.2
Revisión, limpieza dental, o aplicación de flúor	2.2	2.2	2.2
Atención de las brigadas de salud	0.7	0.6	0.6
Obtención de certificado médico	0.3	0.2	0.2
Otros	1.5	1.5	1.5
Total*	100.0	100.0	100.0
Menores de cinco años de edad que buscaron o recibieron atención médica en los servicios preventivos**	4 061.0	3 907.2	7 968.2
Total de menos de cinco años de edad**	5 808.6	5 621.7	11 430.3

*Los porcentajes se presentan por columna y suman más de 100.0% debido a que se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.6
Porcentaje de mujeres de 12 a 49 años de edad que recibieron atención en los servicios ambulatorios preventivos* en los últimos 12 meses, según tipo de servicio

<i>Servicio preventivo recibido</i>	<i>Total</i>
Detección de cáncer cérvico-uterino	44.9
Vacunación	23.8
Cuidado del embarazo	19.9
Revisión, limpieza dental, o aplicación de flúor	12.2
Programa de control de hipertensión arterial	9.3
Planificación familiar	8.6
Programa de control de Diabetes	7.2
Pláticas de educación para la salud	6.0
Otros servicios	7.1
Mujeres de 12 a 49 años de edad que buscaron o recibieron atención médica preventiva**	10 678.7
Total de mujeres de 12 a 49 años de edad**	29 406.8

*Los porcentajes suman más de 100% debido a que se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.7

Porcentaje de población total, por sexo, que recibió atención en los servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio

<i>Servicio preventivo recibido</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Vacunación	65.6	41.5	49.9
Detección del cáncer cérvico-uterino	--	31.1	20.3
Revisión, limpieza dental, o aplicación de flúor	14.8	10.8	12.2
Prevención de hipertensión arterial	8.2	10.5	9.7
Prevención de diabetes	8.1	8.3	8.2
Revisión del niño sano	11.1	5.3	7.3
Cuidado del embarazo	--	11.1	7.2
Planificación familiar	0.4	4.8	3.3
Pláticas de educación para la salud	1.3	4.1	3.1
Atención de las brigadas de salud	1.1	1.0	1.0
Otro servicios	8.7	6.0	7.0
Total*	100.0	100.0	100.0

Población que buscó o recibió atención médica preventiva**	10 191.8	19 202.0	29 393.8
--	----------	----------	----------

*Los porcentajes se presentan por columna suman más de 100% debido a que se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.8

Porcentaje, por sexo, de población de 40 años o más de edad que recibió atención en los servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según tipo de servicio

<i>Servicio preventivo recibido</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Detección de cáncer cérvico-uterino	--	54.7	40.0
Prevención de hipertensión arterial	38.7	30.2	32.5
Prevención de Diabetes	37.9	24.5	28.1
Vacunación	22.6	15.8	17.6
Revisión, limpieza dental, o aplicación de flúor	14.9	8.6	10.3
Pláticas de educación para la salud	2.2	5.9	4.9
Atención de las brigadas de salud	1.2	1.1	1.1
Planificación familiar	0.1	1.2	0.9
Otro servicios	11.0	7.3	8.3
Total*	100.0	100.0	100.0

Población de 40 años o más de edad que buscó o recibió atención médica preventiva**	1 707.7	4 657.1	6 364.8
---	---------	---------	---------

Total de la población de 40 años y más de edad**	9 819.3	10 482.7	20 302.1
--	---------	----------	----------

*Los porcentajes se presentan por columna y suman más de 100.0% debido a que se consideraron hasta tres posibles servicios preventivos

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.9
**Tasa* de utilización de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses,
 según factores predisponente y habilitadores**

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Frecuencia de utilizadores de servicios preventivos**</i>	<i>Tasa de utilización</i>
Edad		
0 a 9	10 980.4	47.7
10 a 19	3 791.3	17.1
20 o más	14 343.6	27.8
Sexo		
Hombre	10 102.6	21.1
Mujer	19 020.0	38.7
Morbilidad reportada		
No enfermos	23 016.9	28.0
Enfermos	5 985.0	42.3
Discapacidad		
Sí	649.5	28.5
No	28 354.8	30.1
Derechohabiencia		
Asegurados	13 163.3	33.5
No asegurados	15 843.3	27.7
Tamaño de localidad		
1 a 14 999 habitantes	17 033.8	30.0
15 000 o más habitantes	12 088.7	30.1
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)		
Sí	3 685.0	20.2
No	618.2	28.0
Alfabeto (Población de 15 años o más de edad)		
Sí	14 600.6	25.5
No	1 401.2	27.9
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	682.9	26.2
Primaria incompleta	3 939.6	27.6
Primaria completa	3 571.5	26.6
Secundaria	3 823.8	21.4
Carrera técnica o comercial	1 685.4	33.0
Preparatoria o normal básica	1 593.3	20.8
Educación superior	1 235.6	24.4
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Población económicamente activa	6 655.3	18.3
Población económicamente inactiva	10 586.3	32.3
Población económicamente inactiva		
Pensionados o jubilados	404.0	41.5
Estudiantes	1 938.0	17.3
Actividades del hogar	7 546.0	45.2
Discapacitados	65.8	22.2
No trabajan por otras razones	632.5	17.6

(Continúa)

Cuadro 6.9

Tasa* de utilización de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según factores predisponente y habilitadores

(Continuación)

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Frecuencia de utilizadores de servicios preventivos**</i>	<i>Tasa de utilización</i>
Posición en el trabajo		
Jornaleros o peones	281.3	9.2
Empleados u obreros	3 308.7	17.1
Trabajadores sin pago	462.5	24.4
Trabajadores por su cuenta	2 457.8	22.0
Patrones	66.9	19.3
Población, según ingreso en cuartiles		
Cuartilo (Intervalos de ingreso en pesos)		
I (de 0 a 1,100)	6 104.2	28.1
II (de 1 101 a 2 383)	7 333.8	32.1
III (de 2 384 a 4 549)	7 618.9	30.7
IV (de 4 550 y más)	7 934.6	29.3
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo	5 734.8	29.0
De 1 a 1.9	6 296.4	32.2
De 2 a 2.9	4 685.4	31.0
De 3 a 4.9	5 575.9	29.3
De 5 a 9.9	4 466.2	28.1
De 10 o más	2 232.7	31.5

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.10
Distribución porcentual de los utilizadores de servicios ambulatorios preventivos, por institución que proporcionó la última atención, según factores predisponentes y habilitadores

Factores predisponentes y habilitadores	SSA*	IMSS		IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ISSSTE	Otras de seguridad social**			Total
		Privadas	Otras				No especificado			
Edad										
0 a 9	54.3	6.1	20.7	2.2	0.8	13.2	1.6	1.1	100	
10 a 19	47.7	8.8	17.1	2.5	1.1	19.3	2.1	1.4	100	
20 o más	34.1	5.3	27.2	4.7	1.7	24.5	1.9	0.8	100	
Sexo										
Hombre	43.7	6.2	23.5	3.2	1.3	18.6	2.2	1.2	100	
Mujer	43.3	6.0	23.5	3.6	1.2	20.0	1.6	0.8	100	
Morbilidad reportada										
No enfermos	44.8	6.4	23.4	3.5	1.2	18.1	1.6	1.0	100	
Enfermos	38.1	4.5	23.9	3.5	1.5	25.0	2.8	0.7	100	
Discapacidad										
Sí	32.0	5.1	30.8	5.7	2.5	21.1	1.9	0.9	100	
No	43.7	6.1	23.3	3.4	1.2	19.5	1.8	1.0	100	
Tamaño de localidad										
1 a 14 999 habitantes	31.3	1.7	32.2	4.6	1.9	24.8	2.5	1.0	100	
15 000 o más habitantes	60.3	12.1	11.2	1.9	0.4	12.2	0.9	1.0	100	
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)										
Sí	49.6	8.1	18.4	3.1	1.0	15.4	2.7	1.7	100	
No	60.7	10.0	17.1	1.2	0.2	9.1	1.0	0.7	100	
Alfabeto (Población de 15 años o más de edad)										
Sí	33.3	4.8	27.1	4.7	1.7	25.6	2.0	0.8	100	
No	52.3	14.3	17.0	1.9	0.4	12.4	0.9	0.8	100	
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)										
Sin instrucción	55.6	12.9	14.7	1.3	0.3	13.2	1.1	0.9	100	
Primaria incompleta	44.3	8.9	24.3	3.0	1.1	15.9	1.8	0.7	100	
Primaria completa	42.1	6.0	26.7	3.5	1.5	17.7	1.8	0.7	100	
Secundaria	37.5	4.7	26.6	3.5	1.3	23.1	2.3	1.0	100	
Carrera técnica o comercial	21.5	2.6	32.3	5.8	2.5	32.3	1.8	1.2	100	
Preparatoria o normal básica	24.6	2.8	25.5	7.0	2.0	34.9	2.2	1.0	100	
Educación superior	11.0	1.6	17.9	10.4	3.7	51.9	2.7	0.8	100	

(Continúa)

Cuadro 6.10
Distribución porcentual de los utilizadores de servicios ambulatorios preventivos, por institución que proporcionó la última atención, según factores predisponentes y habilitadores

Factores predisponentes y habilitadores	(Continuación)							Total	
	SSA*	IMSS Solidaridad	IMSS	IMSS	ISSSTE estatal/ISSSTE	Otras de seguridad social**	Privadas		Otras
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)									
Población económicamente activa	31.0	5.7	25.4	4.9	1.5	27.9	2.6	1.0	100
Población económicamente inactiva	39.4	5.9	25.6	4.0	1.6	21.1	1.6	0.8	100
Población económicamente inactiva									
Pensionados o jubilados	8.2	2.8	54.2	12.0	5.3	15.1	1.8	0.6	100
Estudiantes	41.9	6.4	17.9	3.9	1.8	24.6	2.0	1.5	100
Actividades del hogar	41.4	5.9	25.3	3.5	1.4	20.5	1.4	0.6	100
Discapacitados	21.5	4.1	48.1	6.8	1.4	17.1	1.0	0.0	100
No trabajan por otras razones	29.9	7.2	31.7	4.4	1.8	22.0	2.3	0.7	100
Posición en el trabajo									
Jornaleros o peones	55.3	11.9	13.7	1.1	0.4	15.5	1.5	0.6	100
Empleados u obreros	21.2	2.9	33.0	7.6	2.2	28.7	3.2	1.2	100
Trabajadores sin pago	50.7	13.9	7.8	2.3	0.0	22.1	2.0	1.2	100
Trabajadores por su cuenta	38.0	7.1	20.3	2.3	1.0	28.6	2.0	0.7	100
Patrones	21.9	2.8	14.7	2.2	0.0	55.8	2.2	0.4	100
Población, según ingreso en cuartiles									
I (de 0 a 1,100)	51.1	11.0	13.0	1.6	1.0	19.7	1.4	1.1	100
II (de 1 101 a 2 383)	47.4	6.2	21.6	2.2	0.5	19.1	2.1	0.9	100
III (de 2 384 a 4 549)	35.3	2.8	29.0	4.4	1.3	23.9	2.4	0.9	100
IV (de 4 550 y más)	21.9	2.0	28.4	6.4	2.4	35.3	2.9	0.7	100
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos									
Menos de un salario mínimo	56.2	13.3	12.2	1.6	1.0	13.2	1.3	1.2	100
De 1 a 1.9	53.8	8.0	20.4	1.8	0.4	13.0	1.7	0.9	100
De 2 a 2.9	45.3	3.9	28.3	3.4	1.0	15.6	1.5	1.0	100
De 3 a 4.9	38.8	2.9	29.7	3.8	1.5	20.4	2.0	0.9	100
De 5 a 9.9	28.6	2.1	30.3	6.2	2.1	27.6	2.2	0.9	100
De 10 o más	19.4	1.9	21.5	6.8	2.8	44.0	3.0	0.6	100

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Sedena, Semar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 6.11

Tasa* de utilización de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según factores predisponentes y habilitadores, por derechohabencia

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Con derechohabencia</i>	<i>Sin derechohabencia</i>
Edad		
0 a 9	51.4	45.7
10 a 19	19.3	15.9
20 o más	32.0	24.4
Sexo		
Hombre	24.2	19.1
Mujer	42.3	36.2
Morbilidad reportada		
No enfermos	31.3	25.7
Enfermos	45.2	40.0
Discapacidad		
Sí	35.4	23.0
No	33.4	27.8
Tamaño de localidad		
1 a 14 999 habitantes	33.1	26.3
15 000 o más habitantes	34.6	28.9
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)		
Sí	23.5	18.2
No	35.9	25.3
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)		
Sí	29.5	22.2
No	38.2	25.2
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	33.2	24.3
Primaria incompleta	35.7	24.0
Primaria completa	32.3	23.3
Secundaria	24.0	19.6
Carrera técnica o comercial	36.3	27.8
Preparatoria o normal básica	23.3	17.7
Educación superior	27.3	18.2
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Población económicamente activa	22.5	15.1
Población económicamente inactiva	37.1	29.0
Población económicamente inactiva		
Pensionados o jubilados	42.4	26.2
Estudiantes	19.3	15.8
Actividades del hogar	52.2	41.0
Discapacitados	35.5	13.0
No trabajan por otras razones	26.5	13.4

(Continúa)

Cuadro 6.11

Tasa* de utilización de servicios ambulatorios preventivos en los últimos 12 meses, según factores predisponentes y habilitadores, por derechohabencia

(Continuación)

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Con derechohabencia</i>	<i>Sin derechohabencia</i>
Posición en el trabajo		
Jornaleros o peones	14.4	8.3
Empleados u obreros	19.9	12.0
Trabajadores sin pago	35.7	22.3
Trabajadores por su cuenta	35.2	18.3
Patrones	27.2	15.0
Población, según ingreso en cuartiles		
Cuartil (Intervalos de ingreso en pesos)		
I (de 0 a 1 100)	35.1	29.7
II (de 1 101 a 2 383)	35.5	29.9
III (de 2 384 a 4 549)	33.8	26.1
IV (de 4 550 y más)	31.9	23.1
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo	33.5	28.0
De 1 a 1.9	35.7	30.7
De 2 a 2.9	34.9	28.2
De 3 a 4.9	32.6	26.2
De 5 a 9.9	31.2	23.7
De 10 o más	34.7	25.3

*Las tasas se multiplicaron por 100

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Utilización de servicios curativos

C O N T E N I D O

- Población total, por sexo, según condición de búsqueda o atención de algún servicio curativo en los últimos 12 meses.
- Utilización, por grupos de edad y sexo, de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses.
- Utilización de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, por entidad federativa.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, por institución que proporcionó la última atención, sexo y grupo de edad.
- Utilización de servicios ambulatorios curativos, según factores predisponentes y habilitadores.
- Utilización de servicios ambulatorios curativos, según factores predisponentes y habilitadores, por institución.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos según factores predisponentes y habilitadores, por institución.

Utilización de servicios curativos

- 27.1 millones de mexicanos (28%) utilizaron servicios de salud ambulatorios con propósitos curativos.
- Las mujeres utilizaron más frecuentemente este tipo de servicio (30.9%), en relación con los varones (24.9%).
- Los niños menores de cinco años de edad tuvieron una frecuencia de uso de 39%.
- Los escolares y adolescentes presentaron tasas reducidas de uso de servicios curativos ambulatorios.
- En adultos de ambos sexos, a mayor edad, mayor utilización de servicios curativos ambulatorios.
- En la séptima década de la vida prácticamente uno de cada dos adultos utilizó servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses.
- Las entidades con el mayor porcentaje de uso de servicios curativos ambulatorios fueron: Nayarit, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco y Sinaloa.
- Las principales instituciones prestadoras de servicios curativos ambulatorios fueron: servicios privados (31%), SSA (29.1%), IMSS (25.9%), ISSSTE (4.8%) e IMSS-Solidaridad (4%).
- La SSA atendió proporcionalmente mayor número de niños y adolescentes, y las instituciones de seguridad, a los adultos. La distribución porcentual por grupo de edad que se atendió en instituciones privadas fue semejante en todos los grupos de edad.
- Los principales factores que predicen una alta tasa de utilización de servicios de curativos ambulatorios fueron: estar enfermo (tasa 67.8%), discapacitado (tasa 45.7%), pensionado o jubilado (44.9%).
- Los factores poblacionales que predicen las tasas más bajas de utilización de este tipo de servicio fueron: ser jornalero o peón (18.4%), adolescente (20.3%) y estudiante (21.9%).
- Los residentes en localidades de más de 15 000 habitantes presentaron tasas de utilización 16% mayores, en relación con los que habitan en localidades con población más dispersa.

- El analfabetismo no se asoció a un menor uso de los servicios ambulatorios curativos.
- Los ingresos económicos bajos en el hogar (1er. cuartil, tasa 25.4%) estuvieron asociados a un menor uso de este tipo de servicios, en relación con los de mayor número (4to. cuartil tasa 29.1%).
- En general, la condición de derechohabiente incrementó 30% las tasas de utilización de servicios ambulatorios curativos, en relación con la población no derechohabiente.
- Estas diferencias se hacen mayores al analizarlas en relación con diversas variables socioeconómicas. Por ejemplo un peón sin derechohabiente utilizó 70% menos los servicios de atención curativa que uno con derechohabiente.
- La población con primaria incompleta y que no es derechohabiente utilizó 50% menos los servicios curativos que la población con el mismo nivel educativo, pero que es derechohabiente.
- De manera semejante ocurre con los discapacitados y con la población con bajos ingresos, en quienes se magnifican las diferencias entre las tasas de utilización de los derechohabientes, en comparación con los no derechohabientes.

Figura 7.1
Distribución de la población total, por sexo, según condición de búsqueda o atención de algún servicio curativo en los 12 últimos meses





Figura 7.2
Tasa de utilización, por grupos de edad y sexo, de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, por grupos



N* = 27 122
 N* = Frecuencia ponderada en miles
 Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 7.3
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad,* de utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, según institución que proporcionó la última atención

N*=16 390

N*=Frecuencia ponderada a miles

* No se incluyen los valores de edad no especificados, los cuales representan al 0.1% de la población

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 7.4
Tasa de utilización de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, según entidad federativa

N*=27 122

N*= Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 7.1

Distribución de la población total, por sexo, según condición de búsqueda o atención de servicios ambulatorios curativos en los 12 últimos meses

<i>Buscó o recibió algún servicio curativo de salud en los últimos 12 meses</i>	<i>Hombre</i>		<i>Mujer</i>		<i>Total</i>	
	<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Frecuencia*</i>	<i>Porcentaje</i>
Si	11 903.1	24.9	15 219.4	30.9	27 122.5	28.0
No	35 666.5	74.7	33 777.1	68.7	69 443.6	71.6
No especificado	202.5	0.4	190.3	0.4	392.8	0.4
Total	47 772.2	100.0	49 186.8	100.0	96 959.0	100.0

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 7.2

Tasa* de utilización, por grupos de edad y sexo, de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses

<i>Grupos de edad</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
0 a 4 años	40.2	37.8	39.0
5 a 9 años	28.7	28.8	28.7
10 a 19 años	18.9	21.6	20.3
20 a 29 años	18.1	26.6	22.5
30 a 39 años	21.2	31.1	26.3
40 a 49 años	24.7	38.0	31.5
50 a 59 años	26.8	41.7	34.4
60 a 69 años	34.0	46.4	40.5
70 a 79 años	40.0	51.8	46.1
80 años o más	43.3	48.0	45.9
No especificado	16.1	7.5	11.7
Total	24.9	30.9	28.0
Frecuencia**	11 903.1	15 219.4	27 122.5

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 7.3

Tasa* de utilización de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, por entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia**</i>	<i>Tasa de utilización de servicios curativos</i>
Aguascalientes	222.9	23.7
Baja California	540.5	21.9
Baja California Sur	111.6	26.7
Campeche	146.9	21.4
Coahuila	634.7	27.8
Colima	158.8	29.6
Chiapas	879.2	22.5
Chihuahua	682.0	22.5
Distrito Federal	2 855.2	33.4
Durango	503.7	35.0
Guanajuato	1 163.0	25.0
Guerrero	696.8	22.7
Hidalgo	676.1	30.4
Jalisco	2 233.5	35.5
México	3 512.0	26.9
Michoacán	916.8	23.2
Morelos	367.7	23.8
Nayarit	328.6	36.1
Nuevo León	1 272.0	33.4
Oaxaca	751.1	22.0
Puebla	1 508.1	29.8
Querétaro	381.5	27.3
Quintana Roo	240.1	27.6
San Luis Potosí	520.1	22.7
Sinaloa	772.4	30.7
Sonora	533.0	24.4
Tabasco	589.1	31.3
Tamaulipas	941.1	34.4
Tlaxcala	199.1	20.8
Veracruz	1 972.6	28.7
Yucatán	462.1	28.0
Zacatecas	350.3	26.0
Estados Unidos Mexicanos	27 122.5	28.0

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 7.4
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad,* de utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención

	Años											Total
	0 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 o más		
<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>												
SSA**												
Hombres	34.3	36.2	32.6	20.7	22.0	22.6	25.3	16.5	16.9	17.4	27.8	
Mujeres	34.7	36.7	35.5	28.0	31.5	26.8	26.3	19.4	19.5	22.7	30.3	
Total	34.5	36.5	34.0	24.6	27.1	25.0	25.9	18.2	18.5	20.4	29.1	
IMSS-Solidaridad												
Hombres	3.6	4.7	4.0	3.7	3.6	4.5	3.5	3.7	3.3	3.7	3.9	
Mujeres	4.7	4.9	3.8	4.1	3.8	4.3	3.9	3.3	3.1	2.7	4.1	
Total	4.1	4.8	3.9	3.9	3.7	4.4	3.7	3.5	3.1	3.2	4.0	
IMSS												
Hombres	18.1	20.8	22.5	29.5	27.6	25.4	33.5	41.6	40.5	34.9	25.8	
Mujeres	18.5	19.8	23.6	23.6	25.7	29.3	33.6	38.5	37.8	30.3	26.0	
Total	18.3	20.3	23.0	26.4	26.5	27.7	33.6	39.7	38.9	32.3	25.9	
ISSSTE estatal/ISSSTE												
Hombres	3.0	3.7	5.8	2.5	5.0	5.5	7.2	7.3	9.6	6.3	4.8	
Mujeres	2.5	4.1	3.8	3.6	6.0	5.6	6.1	8.3	7.4	6.0	4.8	
Total	2.8	3.9	4.8	3.1	5.5	5.5	6.5	7.9	8.3	6.1	4.8	
Otras de seguridad social***												
Hombres	1.5	0.8	1.5	2.7	1.3	1.8	2.6	2.4	1.9	2.9	1.7	
Mujeres	1.1	1.2	1.5	1.4	1.6	1.3	1.8	1.5	2.4	1.4	1.4	
Total	1.3	1.0	1.5	2.0	1.5	1.5	2.1	1.8	2.2	2.0	1.6	
Privadas												
Hombres	36.6	29.6	28.7	36.7	35.2	35.8	24.4	26.4	26.6	31.8	32.0	
Mujeres	35.3	30.0	27.5	35.9	28.0	29.7	25.2	27.0	27.4	34.8	30.2	
Total	36.0	29.8	28.1	36.3	31.4	32.3	24.9	26.8	27.1	33.6	31.0	
Otras												
Hombres	2.3	3.3	4.4	3.2	3.7	3.7	3.0	1.7	0.9	3.0	3.2	
Mujeres	2.9	2.7	3.8	2.9	2.6	2.7	2.5	1.7	2.3	2.0	2.8	
Total	2.6	3.0	4.1	3.0	3.1	3.2	2.7	1.7	1.7	2.4	3.0	

(Continúa)

Cuadro 7.4
Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad,* de utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según institución que proporcionó la última atención

(Continuación)

	Años										Total	
	0 a 4	5 a 9	10 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 o más		
No especificado												
Hombres	0.6	0.9	0.5	1.0	1.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.0	0.8	
Mujeres	0.3	0.6	0.5	0.5	0.8	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.4	
Total	0.4	0.8	0.5	0.8	1.2	0.5	0.6	0.4	0.2	0.0	0.6	
Total hombres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia****	1 384.1	1 179.4	1 350.5	943.3	828.6	652.6	537.5	435.7	251.6	97.6	7 673.8	
Total mujeres	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia****	1 293.7	1 128.7	1 332.7	1 064.5	963.0	906.1	839.5	679.4	368.9	133.3	8 716.5	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia****	2 677.8	2 308.1	2 683.1	2 007.7	1 791.6	1 558.6	1 377.0	1 115.1	620.6	230.8	16 390.3	

* No se incluyen los valores de edad no especificados, los cuales representan a 0.1% de la población

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Sedena, Semar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 7.5
**Tasa* de utilización de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses,
 según factores predisponentes y habilitadores**

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Frecuencia de utilizadores de servicios curativos**</i>	<i>Tasa de utilización de servicios ambulatorios curativos</i>
Edad		
0 a 9	7 787.0	33.8
10 a 19	4 491.5	20.3
20 o más	14 491.5	28.7
Sexo		
Hombre	11 903.1	24.9
Mujer	15 219.4	30.9
Morbilidad reportada		
No enfermos	17 436.0	21.2
Enfermos	9 590.4	67.8
Discapacidad		
Sí	1 039.4	45.7
No	25 987.5	27.5
Derechohabiencia		
Asegurados	12 747.9	32.4
No asegurados	14 290.9	25.0
Tamaño de localidad		
15 000 o más habitantes	16 880.6	29.7
1 a 14 999 habitantes	10 241.9	25.5
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)		
Sí	4 340.1	23.8
No	550.5	24.9
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)		
Sí	15 330.8	26.8
No	1 578.7	31.4
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	677.3	25.9
Primaria incompleta	4 076.6	28.6
Primaria completa	3 393.5	25.3
Secundaria	4 211.6	23.6
Carrera técnica o comercial	1 516.9	29.7
Preparatoria o normal básica	1 884.9	24.6
Educación superior	1 447.4	28.5
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Población económicamente activa	8 848.0	24.4
Población económicamente inactiva	9 432.9	28.8
Población económicamente inactiva		
Pensionados o jubilados	437.3	44.9
Estudiantes	2 450.7	21.9
Actividades del hogar	5 419.2	32.4
Discapacitados	147.3	49.6
No trabajan por otras razones	978.4	27.2

(Continúa)

**Tasa* de utilización de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses,
según factores predisponentes y habilitadores**

(Continuación)

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Frecuencia de utilizadores de servicios curativos**</i>	<i>Tasa de utilización de servicios ambulatorios curativos</i>
Posición en el trabajo		
Jornaleros o peones	561.2	18.4
Empleados u obreros	4 672.9	24.1
Trabajadores sin pago	459.2	24.2
Trabajadores por su cuenta	2 974.8	26.7
Patrones	89.8	25.9
Población, según ingreso en cuartiles		
Cuartiles (Intervalos de ingreso en pesos)		
I (de 0 a 1 100)	5 274.3	25.4
II (de 1 101 a 2 383)	6 494.7	28.1
III (de 2 384 a 4 549)	7 210.3	28.5
IV (de 4 550 y más)	7 944.2	29.1
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo	5 007.5	25.3
De 1 a 1.9	5 478.9	28.0
De 2 a 2.9	4 373.1	28.9
De 3 a 4.9	5 429.8	28.5
De 5 a 9.9	40 608.3	29.0
De 10 o más	2 025.9	28.6

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 7.6

Tasa* de utilización de servicios ambulatorios curativos, según factores predisponentes y habilitadores por derechohabencia

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Con derechohabencia</i>	<i>Sin derechohabencia</i>	<i>Razón de tasas (derechohabencia/ no derechohabencia)</i>
Edad			
0 a 9	39.2	31.0	1.26
10 a 19	25.5	17.4	1.46
20 o más	32.4	25.8	1.26
Sexo			
Hombre	29.6	21.9	1.35
Mujer	35.1	28.1	1.25
Morbilidad reportada			
No enfermos	24.6	18.9	1.30
Enfermos	73.9	63.1	1.17
Discapacidad			
Sí	54.8	38.5	1.42
No	31.8	24.7	1.29
Tamaño de localidad			
15 000 o más habitantes	32.6	26.4	1.23
1 a 14 999 habitantes	31.5	23.9	1.31
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)			
Sí	29.0	20.8	1.39
No	33.7	22.2	1.51
Alfabeto (Población de 15 años o más de edad)			
Sí	30.9	23.4	1.32
No	39.9	29.2	1.36
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)			
Sin instrucción	33.9	24.0	1.41
Primaria incompleta	37.1	24.8	1.50
Primaria completa	31.5	21.7	1.45
Secundaria	26.7	21.4	1.24
Carrera técnica o comercial	32.0	25.9	1.23
Preparatoria o normal básica	27.6	20.9	1.32
Educación superior	30.4	24.6	1.23
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)			
Población económicamente activa	28.4	21.3	1.33
Población económicamente inactiva	33.8	25.4	1.33
Población económicamente inactiva			
Pensionados o jubilados	45.3	40.0	1.13
Estudiantes	25.7	18.9	1.36
Actividades del hogar	37.4	29.4	1.27
Discapacitados	59.5	43.5	1.37
No trabajan por otras razones	36.1	23.1	1.56

(Continúa)

Tasa* de utilización de servicios ambulatorios curativos, según factores predisponentes y habilitadores, por derechohabiencia

(Continuación)

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Con derechohabiencia</i>	<i>Sin derechohabiencia</i>	<i>Razón de tasas (derechohabiencia/ no derechohabiencia)</i>
Posición en el trabajo			
Jornaleros o peones	28.2	16.6	1.70
Empleados u obreros	26.9	19.1	1.41
Trabajadores sin pago	32.3	22.9	1.41
Trabajadores por su cuenta	35.5	24.2	1.47
Patrones	29.8	23.8	1.25
Población, según ingreso en cuartiles			
Cuartiles (Intervalos de ingreso en pesos)			
I (de 0 a 1 100)	32.8	23.6	1.39
II (de 1 101 a 2 383)	33.4	25.8	1.29
III (de 2 384 a 4 549)	32.3	25.5	1.27
IV (de 4 550 y más)	31.8	25.0	1.27
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos			
Menos de un salario mínimo	32.5	23.6	1.38
De 1 a 1.9	34.0	25.6	1.33
De 2 a 2.9	32.1	26.7	1.20
De 3 a 4.9	32.4	24.9	1.30
De 5 a 9.9	32.0	24.7	1.29
De 10 o más	30.9	24.4	1.26

*Las tasas se multiplicaron por 100

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 7.7
Distribución porcentual de la población utilizadora de servicios ambulatorios curativos, por institución que proporcionó la última atención, según factores predisponentes y habilitadores

Factores predisponentes y habilitadores	SSA**		IMSS Solidaridad		IMSS		ISSSTE estatal/ISSSTE		Otras de seguridad social***		Privadas		Otras		No especificado		Total
Edad																	
0 a 9	40.7		4.4	20.4	3.1		1.1		27.2	2.3						100	
10 a 19	33.9		4.7	22.5	4.5		1.4		28.7	3.6						100	
20 o más	24.6		3.8	26.8	5.1		1.8		34.4	2.7						100	
Sexo																	
Hombre	29.2		3.9	25.1	4.3		1.6		31.8	3.2						100	
Mujer	32.0		4.3	23.6	4.5		1.5		31.0	2.4						100	
Morbilidad reportada																	
No enfermos	31.2		4.3	24.6	4.4		1.6		30.9	2.3						100	
Enfermos	30.0		3.8	23.7	4.5		1.5		32.2	3.6						100	
Discapacidad																	
Sí	25.0		2.9	30.5	6.2		2.1		29.4	2.6						100	
No	31.0		4.2	24.0	4.3		1.5		31.5	2.8						100	
Tamaño de localidad																	
15 000 o más habitantes	20.9		1.8	31.3	5.5		2.1		34.0	3.7						100	
1 a 14 999 habitantes	47.0		7.9	12.8	2.6		0.6		27.0	1.2						100	
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)																	
Sí	36.9		4.6	21.5	4.2		1.4		27.4	3.5						100	
No	44.4		6.1	18.8	1.6		0.5		25.0	2.1						100	
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)																	
Sí	23.8		3.4	27.5	5.3		1.9		34.6	3.0						100	
No	40.7		8.4	16.1	2.5		0.6		29.3	1.4						100	
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)																	
Sin instrucción	41.7		7.8	17.7	1.8		0.7		27.5	2.1						100	
Primaria incompleta	33.4		5.4	23.0	3.5		1.2		29.8	2.9						100	
Primaria completa	29.6		4.1	28.1	4.2		1.5		29.1	2.5						100	
Secundaria	27.3		3.2	27.8	3.9		1.5		32.1	3.2						100	
Carrera técnica o comercial	16.1		2.9	32.6	6.4		3.2		35.9	2.2						100	
Preparatoria o normal básica	15.8		2.4	28.5	7.9		2.3		39.4	3.4						100	
Educación superior	8.3		1.2	20.2	11.1		3.4		51.2	4.1						100	

(Continúa)

Cuadro 7.7
**Distribución porcentual de la población utilizadora de servicios ambulatorios curativos,
 por institución que proporcionó la última atención, según factores predisponentes y habilitadores**

Factores predisponentes y habilitadores	SSA**	(Continuación)					Total		
		IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social***	Privadas		Otras	No especificado
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)									
Población económicamente activa	23.1	3.7	26.9	4.9	1.5	35.5	3.4	0.9	100
Población económicamente inactiva	29.2	4.2	25.1	5.0	2.0	31.5	2.5	0.6	100
Población económicamente inactiva									
Pensionados o jubilados	5.2	2.9	53.3	11.6	4.9	19.7	2.2	0.3	100
Estudiantes	29.6	4.2	22.4	6.1	2.2	31.9	3.2	0.6	100
Actividades del hogar	31.9	4.4	23.6	4.0	1.7	31.7	2.2	0.6	100
Discapacitados	24.4	2.7	35.3	6.2	1.2	28.7	0.9	0.6	100
No trabajan por otras razones	25.2	3.5	25.8	5.2	2.0	35.1	2.8	0.5	100
Posición en el trabajo									
Jornaleros o peones	41.8	5.1	15.7	1.6	0.3	32.3	2.5	0.7	100
Empleados u obreros	15.0	2.4	36.8	7.6	2.0	31.5	3.8	1.0	100
Trabajadores sin pago	42.5	9.2	8.9	2.4	0.3	33.7	1.5	1.5	100
Trabajadores por su cuenta	29.7	4.7	17.2	1.9	1.0	41.7	3.1	0.7	100
Patrones	13.5	2.8	8.8	1.6	0.8	66.2	5.3	0.9	100
Población, según ingreso en cuartiles									
I (de 0 a 1,100)	43.3	8.8	14.1	2.1	1.3	28.0	1.5	1.1	100
II (de 1,101 a 2,383)	40.3	4.6	22.5	2.4	0.6	26.0	2.8	0.8	100
III (de 2,384 a 4,549)	28.5	2.8	29.1	4.8	1.3	29.9	3.1	0.6	100
IV (de 4,550 y más)	16.9	1.9	28.1	7.2	2.7	39.4	3.2	0.6	100
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos									
Menos de un salario mínimo	43.3	8.8	13.8	2.1	1.3	28.0	1.6	1.1	100
De 1 a 1.9	41.0	5.2	21.8	2.3	0.6	25.4	3.1	0.6	100
De 2 a 2.9	32.4	2.7	27.9	4.4	1.1	28.4	2.2	0.8	100
De 3 a 4.9	26.4	2.5	30.1	4.5	1.5	30.8	3.6	0.5	100
De 5 a 9.9	17.4	2.2	29.6	7.5	2.8	37.0	2.9	0.7	100
De 10 o más	11.3	1.7	21.4	8.3	2.8	50.9	2.9	0.7	100

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

***Incluye Pemex, Sedena, Semar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Utilización de servicios hospitalarios

C O N T E N I D O


- Utilización, por edad y sexo, de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses.
- Población, según grupos de edad y sexo, usuaria de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses.
- Utilización de servicios de salud hospitalarios en los últimos 12 meses, por entidad federativa.
- Utilización, por grupos de edad, de los servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, por entidad federativa.
- Población, por sexo y grupo de edad, usuaria de servicios hospitalarios, por institución que proporcionó la última atención.
- Utilización, por sexo, de los servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según motivo de la última atención.
- Población, por sexo, usuaria de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según motivo de la última atención.
- Población, por grupos de edad, usuaria de servicios hospitalarios, según motivo de la última atención.
- Población usuaria de los servicios hospitalarios, según motivo de la última atención en la institución que proporcionó el servicio.
- Población, por sexo, hospitalizada en los últimos 12 meses, según número de veces que estuvo internada.
- Población, por sexo, que fue hospitalizada más de una vez en los últimos 12 meses, según si estuvo internada por el mismo motivo cada una de las veces.
- Utilización de servicios hospitalarios, según factores predisponentes y habilitadores.
- Utilización de servicios hospitalarios, según factores predisponentes y habilitadores, por derechohabiencia.
- Utilizadores de servicios hospitalarios, según factores predisponentes y habilitadores, por institución.

Utilización de servicios hospitalarios

- Se estima que 3.4 millones de mexicanos se hospitalizaron en los últimos doce meses.
- En promedio, cada paciente hospitalizado se internó 1.3 veces al año.
- El número estimado de hospitalizaciones fue de 4.5 millones, en los últimos doce meses.
- Una de cada 20 mujeres y 1 de cada 50 hombres se hospitalizaron en ese año.
- En mujeres adultas, los grupos de edad que más frecuentemente se hospitalizaron fueron los de 20 a 29 años (9.8%) y los de 30 a 39 (7.1%), asociados a motivos obstétricos.
- En hombres adultos, los grupos de edad que más se hospitalizaron fueron los mayores de 70 años con una tasa de 7.9%.
- Las entidades federativas con las tasas más elevadas de hospitalización fueron: Nuevo León (5.2%), Tamaulipas (5.1%), Distrito Federal (4.6%), Coahuila (4.5%) y Jalisco (4.4%).
- Las entidades federativas con las tasas más bajas de hospitalización fueron: Chiapas (1.8%), Tlaxcala (2.1%), Oaxaca (2.2%) y Guerrero (2.4%).
- Los habitantes de los cuatro estados con la mayor frecuencia de hospitalización tuvieron tasas de utilización de este servicio del doble que los habitantes de Chiapas.
- Los diferenciales en las tasas de hospitalización por entidad federativa fueron mayores en los niños. Ejemplo: entre Chiapas y el Distrito Federal el diferencial de hospitalización en niños fue de 3.5 veces.
- Las instituciones que concentraron el mayor número de pacientes hospitalizados fueron: el IMSS con 1.2 millones de personas (35.8%), la SSA con 894 mil (25%) y los servicios privados con 825 mil pacientes (23.9%). En conjunto, estas tres instituciones concentraron 85.6% de los pacientes hospitalizados.
- La mitad de las hospitalizaciones en mujeres fueron para atención del embarazo y del parto. Uno de cada cinco internamientos en mujeres lo fue por motivos quirúrgicos diferentes a los obstétricos. Una proporción menor lo fue por tratamiento médico (18%), lesiones accidentales (3.7%) y lesiones por violencia (0.2%).

- En hombres, más de una de cada tres hospitalizaciones fue por tratamientos médicos (38.6%), seguidas por razones quirúrgicas (30.6%), lesiones por accidentes (13.5%) y lesiones por violencia (1.7%).
- Proporcionalmente, los niños se internaron más frecuentemente por lesiones accidentales o por violencia, que los adolescentes y los adultos.
- Proporcionalmente, las mujeres adolescentes se internaron más frecuentemente por causas de embarazo y parto, que el conjunto de las adultas.
- Proporcionalmente, los motivos de internamiento más frecuentes en la SSA fueron: por embarazo y parto, así como por lesiones causadas por violencia.
- Los motivos de internamiento más frecuentes en las instituciones de seguridad social, fueron: por embarazo y parto, así como por tratamientos quirúrgicos y lesiones accidentales.
- Del total de los pacientes hospitalizados (3.4 millones), se internaron en más de una ocasión cerca de 20% (663 mil pacientes). De estos últimos, la mitad se internó en dos o más ocasiones por el mismo motivo.
- Los grupos poblacionales que tuvieron las mayores tasas de hospitalización por razones de necesidades de salud fueron: los discapacitados que no son económicamente activos (17.5%), los discapacitados en general (10.5%), los pensionados y jubilados (10.1%), y los enfermos (6.0%).
- Las condiciones que originan una baja tasa de utilización de hospitalización por razones de acceso a los servicios fueron: no ser derechohabiente (2.7%), vivir en localidades dispersas (2.6%), ser analfabeta (3.8%) y tener ingreso económico de menos de un salario mínimo (2.8%).
- Las condiciones sociodemográficas y las necesidades de salud tuvieron un efecto sinérgico al incrementar las tasas de hospitalización. Por ejemplo, en los discapacitados que no son económicamente activos, la tasa de hospitalización fue de 28.3%. En cambio los discapacitados en general tuvieron una tasa de 16.8%, y los enfermos, 8%.
- En general, la condición de derechohabencia disminuye los diferenciales de las tasas de hospitalización por razones de acceso, y asegura una mayor equidad.

Figura 8.1
Tasa de utilización,
por edad y sexo,
de servicios hospitalarios
en los últimos doce meses




N*=3 454

N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 8.2
Distribución porcentual,
según grupos de edad
y sexo de la población
usaria de servicios
hospitalarios en
los últimos doce meses



N*=3 454

N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 8.3
Tasa de utilización de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según entidad federativa

N*=3 455
N*= Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 8.4
Distribución porcentual, por sexo, de la población usuaria de servicios hospitalarios, según institución que proporcionó la última atención

N*=3 454
N*=Frecuencia ponderada en miles
* No se incluyen los valores de edad no especificados, los cuales representan 0.1% de la población
** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil
*** Incluye Pemex, Semar y Sedena
Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000


Figura 8.5
Tasa de utilización, por sexo, de los servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según motivo de la última atención



N*=3 455
N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 8.6
Distribución porcentual, por sexo, de la población usuaria de servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según motivo de la última atención



N*=3 455
N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 8.7
Distribución porcentual de la población hospitalizada en los últimos doce meses, según número de veces que estuvo internada

N*=3 455

N*=Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 8.1
Tasa* de utilización, por edad y sexo, de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses

Grupos de edad	Hombres	Mujeres	Total
0 a 4 años	3.1	2.4	2.8
5 a 9 años	1.5	0.9	1.2
10 a 19 años	1.0	2.5	1.8
20 a 29 años	1.6	9.8	5.8
30 a 39 años	1.7	7.1	4.5
40 a 49 años	2.6	4.6	3.6
50 a 59 años	3.4	5.2	4.3
60 a 69 años	5.0	5.1	5.1
70 a 79 años	7.9	7.7	7.8
80 años o más	7.8	10.1	9.1
No especificado	0.0	0.6	0.3
Total	2.1	5.0	3.6
Frecuencia**	1 015.3	2 439.7	3 454.9

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.2
Distribución porcentual, según grupos de edad y sexo, de la población usuaria de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses

Grupos de edad	Hombres	Mujeres	Total
0 a 4 años	18.0	5.6	9.3
5 a 9 años	8.8	2.2	4.2
10 a 19 años	10.9	11.5	11.3
20 a 29 años	13.6	37.6	30.4
30 a 39 años	10.7	19.9	17.2
40 a 49 años	10.7	8.2	9.0
50 a 59 años	8.9	6.0	6.8
60 a 69 años	8.5	3.9	5.3
70 a 79 años	6.9	3.0	4.2
80 años o más	3.0	2.1	2.3
No especificado	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	1 015.3	2 439.7	3 454.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.3

Tasa* de utilización de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, por entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia**</i>	<i>Tasa de hospitalización</i>
Aguascalientes	30.0	3.2
Baja California	88.9	3.6
Baja California Sur	17.6	4.2
Campeche	21.2	3.1
Coahuila	103.1	4.5
Colima	22.8	4.2
Chiapas	69.6	1.8
Chihuahua	119.7	3.9
Distrito Federal	397.4	4.6
Durango	59.8	4.2
Guanajuato	161.0	3.5
Guerrero	73.4	2.4
Hidalgo	73.1	3.3
Jalisco	277.9	4.4
México	446.4	3.4
Michoacán	109.4	2.8
Morelos	50.5	3.3
Nayarit	35.8	3.9
Nuevo León	199.7	5.2
Oaxaca	76.2	2.2
Puebla	156.5	3.1
Querétaro	45.9	3.3
Quintana Roo	31.8	3.7
San Luis Potosí	60.6	2.6
Sinaloa	91.5	3.6
Sonora	85.8	3.9
Tabasco	66.6	3.5
Tamaulipas	138.5	5.1
Tlaxcala	19.7	2.1
Veracruz	220.1	3.2
Yucatán	59.3	3.6
Zacatecas	45.2	3.4
Estados Unidos Mexicanos	3 454.9	3.6

* Las tasas se multiplicaron por 100

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.4
Tasa* de utilizadores, por grupos de edad, de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, por entidad federativa**

<i>Entidad Federativa</i>	<i>0 a 9 años</i>	<i>10 a 19 años</i>	<i>20 años o más</i>	<i>Tasa de hospitalización</i>
Aguascalientes	1.6	1.0	5.0	3.2
Baja California	2.3	2.2	4.7	3.6
Baja California Sur	3.0	1.9	5.6	4.2
Campeche	1.3	1.7	4.6	3.1
Coahuila	3.2	2.3	6.0	4.5
Colima	2.4	1.8	6.1	4.2
Chiapas	0.9	0.8	2.8	1.8
Chihuahua	2.6	2.1	5.2	3.9
Distrito Federal	3.4	2.4	5.7	4.6
Durango	2.6	2.3	5.8	4.2
Guanajuato	1.6	1.9	5.2	3.5
Guerrero	0.5	1.5	3.9	2.4
Hidalgo	1.2	2.0	4.9	3.3
Jalisco	2.0	2.2	6.5	4.4
México	1.9	1.0	5.1	3.4
Michoacán	1.9	1.4	3.9	2.8
Morelos	2.0	2.2	4.2	3.3
Nayarit	2.5	2.4	5.3	3.9
Nuevo León	3.4	3.0	6.7	5.2
Oaxaca	1.1	0.9	3.5	2.2
Puebla	1.6	1.9	4.5	3.1
Querétaro	2.3	0.9	4.9	3.3
Quintana Roo	1.3	1.9	5.6	3.7
San Luis Potosí	1.5	1.2	3.9	2.6
Sinaloa	1.6	2.0	5.2	3.6
Sonora	3.8	1.8	4.8	3.9
Tabasco	2.7	1.4	5.0	3.5
Tamaulipas	2.6	2.7	6.9	5.1
Tlaxcala	1.7	1.0	2.7	2.1
Veracruz	1.7	2.1	4.4	3.2
Yucatán	2.2	1.9	4.9	3.6
Zacatecas	1.9	1.7	4.9	3.4
Estados Unidos Mexicanos	1.9	1.7	4.9	3.6
Frecuencia***	463.0	391.2	2 600.1	3 454.9

* Las tasas se multiplicaron por 100

** No se incluyen los valores de edad no especificados, los cuales representan el 0.6% de la población

*** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de hogar. México, 2000

Cuadro 8.5

Distribución porcentual, por sexo y grupo de edad* de utilizadores de servicios hospitalarios, por institución que proporcionó la última atención

<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>	<i>0 a 9 años</i>	<i>10 a 19 años</i>	<i>20 y más</i>	<i>Total</i>
SSA**				
Hombres	27.9	30.1	17.8	21.9
Mujeres	34.7	38.2	25.4	27.6
Total	30.7	35.9	23.6	25.9
IMSS Solidaridad				
Hombres	1.8	1.1	2.1	1.9
Mujeres	3.0	3.5	2.2	2.4
Total	2.3	2.8	2.2	2.2
IMSS				
Hombres	38.0	30.6	40.8	38.9
Mujeres	30.3	30.8	35.4	34.5
Total	34.8	30.8	36.7	35.8
ISSSTE				
Hombres	4.5	5.1	7.7	6.6
Mujeres	3.9	5.0	6.1	5.8
Total	4.3	5.0	6.5	6.1
Otras de seguridad social***				
Hombres	1.4	1.9	2.8	2.3
Mujeres	1.4	0.5	1.9	1.7
Total	1.4	0.9	2.1	1.9
Privadas				
Hombres	20.7	25.3	23.9	23.2
Mujeres	21.3	19.6	25.2	24.2
Total	21.0	21.3	24.8	23.9
Otras				
Hombres	2.3	4.1	2.8	2.8
Mujeres	1.4	0.7	1.9	1.7
Total	2.0	1.7	2.1	2.0
No especificado				
Hombres	3.2	1.7	2.1	2.3
Mujeres	4.0	1.6	2.0	2.1
Total	3.6	1.6	2.0	2.2
Total hombres	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia****	272.6	110.9	631.8	1 015.3
Total mujeres	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia****	190.4	280.3	1 968.3	2 439.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia****	463.0	391.2	2 600.1	3 454.9

* No se incluyen los valores no especificados de edad, los cuales representan menos de 0.1%

**Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

***Incluye Pemex, Sedena, Semar

****Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.6
Tasa* de utilización, por sexo, de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses,
según motivo de la última atención

Motivo de atención	Hombres**	Tasa	Mujeres**	Tasa	Total**	Tasa
Tratamiento de enfermedad (no quirúrgico)	392.1	8.2	433.3	8.8	825.4	8.5
Cirugía	310.3	6.5	472.2	9.6	782.5	8.1
Parto	—	0.0	757.9	15.4	757.9	7.8
Cesárea	—	0.0	329.1	6.7	329.1	3.4
Prob. embarazo y puerperio	—	0.0	112.8	2.3	112.8	1.2
Lesiones por accidente	137.2	2.9	89.3	1.8	226.5	2.3
Lesiones por violencia	17.5	0.4	4.4	0.1	21.9	0.2
Examen o chequeo	5.6	0.1	8.2	0.2	13.9	0.1
Otros motivos	150.4	3.1	227.6	4.6	378.0	3.9
No especificado	2.1	0.0	4.8	0.1	6.9	0.1
Total	1 015.3	21.3	2 439.7	49.6	3 454.9	35.6

* Las tasas se multiplicaron por 1000

** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.7
Distribución porcentual, por sexo, de utilizadores de servicios hospitalarios en
los últimos 12 meses, según motivo de la última atención

Motivo de atención	Hombres	Mujeres	Total
Tratamiento médico no quirúrgico	38.6	17.8	23.9
Cirugía	30.6	19.4	22.7
Parto	—	31.1	21.9
Cesárea	—	13.5	9.5
Prob. embarazo y puerperio	—	4.6	3.3
Lesiones por accidente	13.5	3.7	6.6
Lesiones por violencia	1.7	0.2	0.6
Examen o chequeo	0.6	0.3	0.4
Otro motivo	14.8	9.3	10.9
No especificado	0.2	0.2	0.2
Total	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	1 015.3	2 439.7	3 454.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.8
Distribución porcentual de utilizadores de servicios hospitalarios,
según motivo de la última atención y grupos de edad*

Motivo de atención	0 a 9 años	10 a 19 años	20 años o más	Total
Tratamiento médico no quirúrgico	49.9	16.7	20.3	23.9
Cirugía	19.1	17.5	24.0	22.7
Parto	—	32.3	24.3	21.9
Cesárea	—	11.5	10.9	9.5
Prob. embarazo y puerperio	—	4.1	3.7	3.3
Lesiones por accidente	9.6	7.7	5.8	6.6
Lesiones por violencia	0.8	1.0	0.6	0.6
Examen o chequeo	0.6	0.0	0.4	0.4
Otros motivos	19.3	9.2	9.7	10.9
No especificado	0.7	0.1	0.1	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia**	463.0	391.2	2 600.1	3 454.9

*No se presentan las frecuencias de edad no especificada ya que asciende a 0.02% de casos

**Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.9
Distribución porcentual de utilizadores de servicios hospitalarios,
según motivo de la última atención e institución que proporcionó el servicio

Motivo de atención	SSA*	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE	Otras de seguridad social**	Privadas	Otras	No especificado	Total
Tratamiento médico no quirúrgico	22.5	15.9	25.7	29.0	39.6	21.8	22.1	15.4	23.9
Cirugía	18.0	29.0	22.6	28.3	23.8	25.8	24.2	19.2	22.7
Parto	30.6	25.5	19.6	10.1	10.5	20.1	15.1	23.7	21.9
Cesárea	9.6	6.7	7.9	6.5	6.2	13.8	4.2	8.2	9.5
Prob. embarazo y puerperio	3.3	8.3	3.6	2.4	3.7	2.3	4.8	3.2	3.3
Lesiones por accidente	6.8	3.8	6.5	8.9	7.4	5.6	13.3	4.3	6.6
Lesiones por violencia	0.9	0.6	0.4	0.2	0.7	0.7	2.2	0.7	0.6
Examen o chequeo	0.1	0.0	0.7	0.3	0.1	0.3	1.5	0.0	0.4
Otro motivo	8.1	10.2	12.8	14.2	8.0	9.6	12.6	21.2	10.9
No especificado	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.1	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia***	895.4	77.7	1 237.2	209.1	64.8	826.3	70.0	74.4	3 454.9

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.10

Promedio y distribución porcentual, por sexo, de utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según número de veces que estuvo internado (a)

<i>Número de hospitalizaciones</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Una	77.4	82.2	80.7
Dos	10.9	6.7	8.0
Tres	2.6	1.9	2.1
Cuatro	1.0	0.9	0.9
Cinco	0.5	0.4	0.4
Seis	0.4	0.2	0.3
Siete y más	2.6	1.6	1.9
No especificado	4.6	6.1	5.7
Total	100.0	100.0	100.0
Promedio de pacientes	1.4	1.3	1.3
Frecuencia*	1 015.3	2 439.7	3 454.9
Frecuencia de hospitalizaciones	1 405.7	3 059.4	4 465.1

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.11

Distribución porcentual, por sexo, de la población que fue hospitalizada más de una vez en los últimos 12 meses, según si estuvo internada por el mismo motivo cada una de las veces

<i>Estuvo hospitalizado por el mismo motivo</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
Sí	61.3	49.0	53.3
No	16.7	17.5	17.2
No especificado	22.0	33.5	29.5
Total	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	229.2	434.0	663.2

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.12

Tasa* de utilización de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según factores predisponentes y habilitadores

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Frecuencia de utilizadores de servicios hospitalarios**</i>	<i>Tasa de utilización</i>
Edad		
0 a 9	463.0	1.9
10 a 19	391.2	1.7
20 o más	2 600.1	4.9
Sexo		
Hombre	1 015.3	2.1
Mujer	2 439.7	5.0
Morbilidad reportada		
No enfermos	2 597.9	3.2
Enfermos	844.3	6.0
Discapacidad		
Sí	239.1	10.5
No	3 208.7	1.4
Derechohabiencia		
Asegurados	1 891.7	4.8
No asegurados	1 552.5	2.7
Tamaño de localidad		
15 000 o más habitantes	2 398.1	4.2
1 a 14 999 habitantes	1 056.8	2.6
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)		
Sí	165.2	0.9
No	28.6	1.3
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)		
Sí	2 713.4	4.7
No	190.2	3.8
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	94.3	3.6
Primaria incompleta	570.4	4.0
Primaria completa	613.1	4.6
Secundaria	701.7	3.9
Carrera técnica o comercial	301.7	5.9
Preparatoria o normal básica	315.2	4.1
Educación superior	219.3	4.3
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Población económicamente activa	1 040.8	2.9
Población económicamente inactiva	1 906.9	5.8
Población económicamente inactiva		
Pensionados o jubilados	98.6	10.1
Estudiantes	127.5	1.1
Actividades del hogar	1 426.1	8.5
Discapacitados	52.0	17.5
No trabajan por otras razones	202.7	5.6

(Continúa)

Cuadro 8.12
**Tasa* de utilización de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses,
 según factores predisponentes y habilitadores**

Continuación

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Frecuencia de utilizadores de servicios hospitalarios**</i>	<i>Tasa de utilización</i>
Posición en el trabajo		
Jornaleros o peones	36.8	3.1
Empleados u obreros	594.5	1.2
Trabajadores sin pago	44.2	3.1
Trabajadores por su cuenta	336.2	3.0
Patrones	10.6	2.3
Población, según ingreso en cuartiles		
Cuartil (Intervalos de ingreso en pesos)		
I (de 0 a 1 100)	610.4	2.9
II (de 1 101 a 2 383)	817.9	3.5
III (de 2 384 a 4 549)	964.5	3.8
IV (de 4 550 y más)	1 043.2	3.8
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos		
Menos de un salario mínimo	545.5	2.8
De 1 a 1.9	684.3	3.5
De 2 a 2.9	613.0	4.1
De 3 a 4.9	737.0	3.9
De 5 a 9.9	583.7	3.7
De 10 o más	272.5	3.8

*Las tasas se multiplicaron por 100

**Cantidad en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.13

Tasa* de utilización de servicios hospitalarios, según factores predisponentes y habilitadores, por derechohabencia

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>	<i>Con derechohabencia</i>	<i>Sin derechohabencia</i>
Edad		
0 a 9	3.0	1.5
10 a 19	2.2	1.5
20 o más	6.3	4.0
Sexo		
Hombre	3.1	1.4
Mujer	6.4	4.0
Morbilidad reportada		
No enfermos	4.2	2.5
Enfermos	8.0	4.3
Discapacidad		
Si	16.8	5.5
No	4.5	2.7
Tamaño de localidad		
15 000 o más habitantes	5.0	3.3
1 a 14 999 habitantes	4.1	2.2
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)		
Si	1.4	0.6
No	2.3	1.0
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)		
Si	5.9	3.8
No	6.5	3.1
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)		
Sin instrucción	5.5	3.1
Primaria incompleta	6.4	3.0
Primaria completa	5.7	3.9
Secundaria	5.0	3.2
Carrera técnica o comercial	6.9	4.1
Preparatoria o normal básica	4.4	3.8
Educación superior	5.0	2.9
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)		
Población económicamente activa	4.1	1.9
Población económicamente inactiva	7.2	4.8
Población económicamente inactiva		
Pensionados o jubilados	9.9	14.3
Estudiantes	1.6	0.8
Actividades del hogar	10.5	7.3
Discapacitados	28.3	10.0
No trabajan por otras razones	9.0	4.1
Posición en el trabajo		
Jornaleros o peones	3.7	2.0
Empleados u obreros	2.7	0.9
Trabajadores sin pago	5.9	1.5
Trabajadores por su cuenta	6.0	2.2
Patrones	4.0	2.0

(Continúa)

Cuadro 8.13

Tasa* de utilización de servicios hospitalarios, según factores predisponentes y habilitadores, por derechohabiencia

(Continuación)

<i>Factores predisponentes y habilitadores</i>		<i>Con derechohabiencia</i>	<i>Sin derechohabiencia</i>
Población, según ingreso en cuartiles			
Cuartil	(Intervalos de ingreso en pesos)		
I	(de 0 a 1 100)	5.6	2.4
II	(de 1 101 a 2 383)	9.7	2.8
III	(de 2 384 a 4 549)	15.0	2.8
IV	(de 4 550 y más)	20.9	2.8
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos			
Menos de un salario mínimo		4.7	2.3
De 1 a 1.9		5.1	2.8
De 2 a 2.9		5.4	3.1
De 3 a 4.9		4.9	3.0
De 5 a 9.9		4.3	2.8
De 10 o más		4.5	2.5

*Las tasas se multiplicaron por 100

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 8.14
Distribución porcentual de la población utilizadora de servicios hospitalarios, por institución que proporcione la última atención, según factores predisponentes y habilitadores

Factores predisponentes y habilitadores	SSA*	IMSS		IMSS/SSSTE	SSSTE estatal/SSSTE	Otras de seguridad social**		Privadas	Otras	No especificado	Total
		Solidaridad	IMSS			Otras de seguridad social**	Privadas				
Edad											
0 a 9	30.8	2.3	34.8	4.3	1.4	21.0	3.3	2.1	100		
10 a 19	36.2	2.8	31.0	5.0	0.9	22.1	1.2	0.8	100		
20 o más	23.8	2.2	36.9	6.5	2.1	25.1	2.6	0.9	100		
Sexo											
Hombre	22.3	1.9	39.0	6.6	2.3	23.7	2.9	1.2	100		
Mujer	27.7	2.4	34.7	5.8	1.7	24.4	2.4	1.0	100		
Morbilidad reportada											
No enfermos	26.9	2.3	35.3	5.5	1.9	24.4	2.4	1.2	100		
Enfermos	23.5	2.0	38.2	7.7	1.6	23.5	2.9	0.7	100		
Discapacidad											
Si	17.6	1.7	43.2	11.9	3.5	17.4	2.9	1.8	100		
No	26.8	2.3	35.4	5.6	1.8	24.6	2.5	1.0	100		
Tamaño de localidad											
15 000 o más habitantes	20.7	1.1	41.5	6.8	2.4	23.6	2.8	1.2	100		
1 a 14 999 habitantes	38.3	4.9	23.5	4.3	0.7	25.5	2.0	0.8	100		
Aptitud para leer y escribir (Población de 6 a 14 años de edad)											
Si	36.1	2.7	33.3	8.1	1.0	16.4	1.2	1.2	100		
No	36.9	2.4	24.6	0.4	4.3	23.9	1.7	5.8	100		
Alfabeta (Población de 15 años o más de edad)											
Si	24.4	2.1	36.8	6.4	2.1	24.9	2.5	0.8	100		
No	35.8	3.9	28.6	4.9	0.2	23.0	2.7	0.9	100		
Nivel de instrucción (Población de 12 años o más de edad)											
Sin instrucción	37.7	4.4	24.1	1.9	0.6	28.0	1.3	1.9	100		
Primaria incompleta	31.3	2.9	33.6	6.1	1.3	21.9	1.8	1.2	100		
Primaria completa	33.8	3.6	36.0	3.3	2.4	18.3	2.1	0.5	100		
Secundaria	26.4	2.0	39.3	4.5	1.3	22.8	3.2	0.4	100		
Carrera técnica o comercial	14.2	0.9	40.2	9.6	2.5	29.3	2.0	1.4	100		
Preparatoria o normal básica	15.0	0.9	38.0	8.8	1.7	30.8	3.5	1.2	100		
Educación superior	6.7	0.9	25.8	15.3	5.5	42.0	2.9	0.9	100		
Condición de actividad (Población de 12 años o más de edad)											
Población económicamente activa	21.2	2.0	38.0	7.7	1.8	26.2	2.6	0.5	100		
Población económicamente inactiva	27.5	2.4	35.1	5.6	2.1	23.9	2.4	1.0	100		

(Continúa)

Cuadro 8.14

Distribución porcentual de la población utilizadora de servicios hospitalarios, por institución que proporcionó la última atención, según factores predisponentes y habilitadores

(Continuación)

Factores predisponentes y habilitadores	SSA*	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social**	Privadas	Otras	No especificado	Total
Población económicamente inactiva									
Pensionados o jubilados	3.9	0.3	63.1	11.9	5.5	14.1	1.0	0.1	100
Estudiantes	20.4	0.7	29.0	11.5	1.8	33.7	1.2	1.7	100
Actividades del hogar	30.2	2.6	33.3	4.1	1.8	24.2	2.7	1.0	100
Discapacitados	15.5	2.8	47.7	7.1	0.7	19.9	1.4	5.0	100
No trabajan por otras razones	27.8	2.8	34.6	8.4	2.5	21.3	2.3	0.3	100
Posición en el trabajo									
Jornaleros o peones	38.9	2.1	23.0	2.1	0.0	32.9	0.0	1.0	100
Empleados u obreros	16.9	1.3	43.5	11.2	2.5	21.8	2.4	0.3	100
Trabajadores sin pago	33.4	8.0	14.1	3.7	0.6	39.5	0.6	0.2	100
Trabajadores por su cuenta	26.0	2.6	32.7	3.0	0.5	31.7	3.2	0.3	100
Patrones	4.6	0.0	20.0	5.8	0.0	35.8	15.0	18.7	100
Población, según ingreso en cuartiles									
Cuartiles (Intervalos de ingreso en pesos)									
I (de 0 a 1 100)	36.3	4.7	24.4	2.9	2.2	25.5	2.7	1.2	100
II (de 1 101 a 2 383)	33.6	2.8	37.7	3.2	0.8	19.3	1.7	0.8	100
III (de 2 384 a 4 549)	26.0	1.4	38.7	6.7	1.7	21.3	2.9	1.2	100
IV (de 4 550 y más)	14.5	1.1	38.7	9.5	2.7	29.9	2.6	0.9	100
Población, según ingreso total mensual del hogar en salarios mínimos									
Menos de un salario mínimo									
De 1 a 1.9	36.0	5.0	24.4	2.9	2.3	25.6	2.4	1.3	100
De 2 a 2.9	33.9	2.9	37.1	3.0	0.9	18.8	2.3	1.0	100
De 3 a 4.9	29.6	1.6	38.1	5.1	1.3	21.7	1.6	1.0	100
De 5 a 9.9	24.1	1.4	40.4	7.0	1.6	21.3	3.5	0.9	100
De 10 o más	14.6	1.3	39.0	11.2	3.2	26.7	3.0	1.0	100
	9.5	0.9	32.3	8.3	2.9	43.3	1.5	1.3	100

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Tiempos de traslado y espera para servicios de salud

C O N T E N I D O

Servicios ambulatorios preventivos

- Tiempo de traslado en la última atención preventiva, según entidad federativa.
- Tiempo de traslado reportado en la última atención preventiva, según institución que proporcionó el servicio y tipo de localidad.
- Tiempo de espera reportado en la última atención preventiva, según entidad federativa.
- Tiempo de espera en la última utilización de servicios preventivos, según institución que proporcionó la atención y tipo de localidad.
- Población usuaria de servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tiempo total de espera y traslado en la última atención, por tipo de localidad.
- Tiempo total de espera y traslado reportado en la última atención preventiva, según entidad federativa.
- Tiempo total de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios preventivos, según institución que proporcionó la última atención y tipo de localidad.

Servicios ambulatorios curativos

- Tiempo de traslado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa.
- Tiempo de traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según institución que proporcionó el servicio y tamaño de localidad.
- Tiempo de espera reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa.
- Tiempo de espera en la última utilización de servicios ambulatorios curativos, según institución que proporcionó la atención y tamaño de localidad.
- Población usuaria de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según tiempo de espera y traslado en la última atención, por tamaño de localidad.
- Tiempo de espera y traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa.
- Tiempo de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios ambulatorios curativos, según institución que proporcionó la última atención y tamaño de localidad.

Tiempos de traslado y espera para servicios de salud

Servicios preventivos

- El tiempo promedio de traslado para recibir atención preventiva fue de 21.8 minutos en los 18.7 millones de personas que solicitaron este tipo de atención.
- Las tres entidades con el mayor tiempo de traslado fueron: Baja California (28.1 minutos), Oaxaca (26.8) y Chihuahua (26.7).
- Las tres entidades con el menor tiempo de traslado fueron: Colima (14.1 minutos), Aguascalientes (16.9) y Quintana Roo (17.3).
- En localidades con menos de 15 000 habitantes el promedio de traslado para recibir atención preventiva fue de 23.2 minutos, y en localidades más concentradas 20.7 minutos.
- En general, los tiempos promedio de traslado para recibir atención preventiva por institución fueron de 30.1 minutos para servicios privados, 28 para el ISSSTE, 25.5 para IMSS-Solidaridad, 22.8 minutos para el IMSS y 18.1 minutos para la SSA.
- El incremento del tiempo promedio de traslado en localidades rurales en relación con las urbanas, para recibir atención preventiva, por institución fue de 27.3 minutos en el ISSSTE, 17 para servicios privados, 6.5 para el IMSS, 2 para el IMSS-Solidaridad y 1.7 minutos para la SSA. Esto es explicable por la distribución de los establecimientos de salud rurales, particularmente de la SSA, el IMSS-Solidaridad y el IMSS.
- En general, el promedio de tiempo de espera para recibir atención preventiva fue de 33.2 minutos.
- Las entidades con el mayor tiempo de espera fueron: San Luis Potosí (41.0 minutos), Estado de México (40.6), Campeche (40.5) y Yucatán (40.3 minutos).
- Los resultados de tiempos de espera promedios para recibir atención preventiva por institución indican que el ISSSTE (61.1 minutos) tiene el doble que la SSA (29.1 minutos) o que los servicios privados (25.1 minutos). El IMSS tiene resultados intermedios (45.3 minutos).

- A nivel nacional, una cuarta parte de quienes utilizaron servicios ambulatorios preventivos debieron esperar más de una hora para recibir el servicio y, de ellos, la mitad (24.5%) esperaron por más de 91 minutos.
- El tiempo de traslado y espera para recibir atención preventiva fue de 55.1 minutos en promedio.
- Las entidades con el mayor tiempo promedio de traslado y espera fueron: Baja California (68 minutos), Estado de México (65), Sinaloa (62), San Luis Potosí (61), Baja California Sur (61) y Veracruz (60).
- Los tiempos promedio de espera y traslado para recibir atención preventiva por institución fueron los siguientes: el ISSSTE (89 minutos), el IMSS (68), el IMSS-Solidaridad (62), los servicios privados (55) y la SSA (47 minutos).

Servicios curativos

- El tiempo promedio de traslado para recibir atención curativa ambulatoria fue de 25 minutos en los 16.4 millones de personas que solicitaron este tipo de atención.
- Las entidades con el mayor promedio de tiempo de traslado fueron: Baja California Sur (38 minutos), Campeche (36), Oaxaca (31), Zacatecas (31), Guerrero (30), Veracruz (29), Chiapas (28) y Chihuahua (28 minutos).
- Este promedio de tiempo de traslado por institución tuvo la siguiente distribución: ISSSTE (29 minutos), IMSS-Solidaridad (28), servicios privados (26), IMSS (25) y SSA (22).
- Las diferencias del tiempo de traslado entre tipo de localidad (rural y urbana) por institución fueron de 16 minutos en el ISSSTE y en los servicios privados, 11 minutos en el IMSS-Solidaridad, 9 para el IMSS y cinco minutos para la SSA.

- A nivel nacional, el tiempo promedio de espera para recibir atención curativa ambulatoria fue de 52.5 minutos.
- Las entidades con el mayor promedio de tiempo de espera fueron: Yucatán (65 minutos), Distrito Federal (65), Baja California (62), Sinaloa (62) y Coahuila (61 minutos).
- Los tiempos de espera para recibir atención curativa (52.5 minutos) fueron mayores en comparación que cuando se recibe atención preventiva (33.2 minutos).
- Los tiempos de espera para recibir atención curativa, por institución fueron los siguientes: IMSS (86 minutos), ISSSTE (81), IMSS-Solidaridad (62), SSA (47) y Servicios Privados (26 minutos).
- En conjunto, 26% de los usuarios de atención curativa ambulatoria esperaron más de una hora y media para recibir este servicio.
- Se estima que para los 16.4 millones de personas que utilizaron servicios curativos ambulatorios, el tiempo promedio de traslado y de espera fue de más de una hora y cuarto (77.5 minutos).
- En tres entidades, el tiempo promedio necesario fue de cerca de una hora y media: Campeche (93 minutos), Yucatán (88) y Distrito Federal (87 minutos).
- El promedio de tiempo de traslado y de espera para recibir atención curativa por institución fue el siguiente: IMSS (111 minutos), ISSSTE (110), IMSS-Solidaridad (91), SSA (69) y servicios privados (52 minutos).




Figura 9.1.1
Promedio del tiempo de traslado en la última atención preventiva, según entidad federativa

N* = 18 680
N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 9.1.2
Promedio del tiempo de traslado reportado en la última atención preventiva, según institución que proporcionó el servicio

N* = 18 680
N* = Frecuencia ponderada en miles
* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospitales Estatales
** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 9.1.3
Promedio del tiempo de espera reportado en la última atención preventiva, según entidad federativa






Figura 9.1.4
Promedio del tiempo de espera en la última utilización de servicios preventivos, según institución que proporcionó la atención






N* = 18 680
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 9.1.5
Promedio de espera y traslado en la última atención preventiva, según entidad federativa




N* = 18 680
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 9.1.6
Promedio del tiempo total de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios preventivos, según institución que proporcionó la atención y tipo de localidad

Figura 9.1.7
Promedio del tiempo total de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios preventivos según institución que proporcionó la atención



N* = 18 680


N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 9.2.1
Promedio del tiempo de traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa



N* = 16 390

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 9.2.2
Promedio del tiempo de traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según institución que proporcionó el servicio

N*=16 390

N*= Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 9.2.3
Promedio del tiempo de espera reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa

N*= 16 390

N*= Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 9.2.4
Promedio del tiempo de espera en la última utilización de servicios ambulatorios curativos, según institución que proporcionó la atención



N* = 16 390


N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 9.2.5
Promedio del tiempo de espera y traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa



N* = 16 390

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 9.2.6
Promedio del tiempo de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios ambulatorios curativos, según tamaño de localidad

N* = 16 390
N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 9.2.7
Promedio del tiempo de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios ambulatorios curativos, según institución que proporcionó la atención

N* = 16 390
N* = Frecuencia ponderada en miles
* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil
** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 9.1.1
Promedio y distribución porcentual del tiempo de traslado reportado en la última atención ambulatoria preventiva, según entidad federativa

Entidad federativa	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de traslado en minutos					No especificado	Total
		De 0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
Aguascalientes	16.9	61.2	28.2	4.3	1.1	0.5	4.7	100
Baja California	28.1	54.6	31.3	10.5	1.4	1.4	0.8	100
Baja California Sur	25.4	65.8	22.2	7.2	1.5	1.9	1.4	100
Campeche	18.1	70.4	21.0	5.5	0.5	2.0	0.6	100
Coahuila	16.5	65.5	26.7	5.2	0.5	0.6	1.5	100
Colima	14.1	76.3	16.7	4.0	0.7	1.0	1.3	100
Chiapas	20.7	61.5	22.0	12.0	1.2	1.9	1.4	100
Chihuahua	26.7	54.4	29.4	10.3	2.1	1.9	1.9	100
Distrito Federal	19.3	57.4	31.0	8.8	1.6	0.5	0.7	100
Durango	23.8	67.2	18.9	8.4	1.0	4.0	0.5	100
Guanajuato	20.1	60.2	27.4	7.8	1.0	1.8	1.8	100
Guerrero	21.0	66.7	19.4	7.1	2.0	3.8	1.0	100
Hidalgo	18.3	65.2	23.6	8.4	1.2	1.2	0.4	100
Jalisco	24.0	65.9	24.4	6.8	1.1	1.1	0.7	100
México	24.4	57.7	25.5	9.3	4.1	2.4	1.0	100
Michoacán	17.9	66.5	24.8	5.5	0.8	1.2	1.2	100
Morelos	20.1	55.6	33.9	6.3	1.5	1.1	1.6	100
Nayarit	16.2	70.6	21.2	5.3	1.4	1.0	0.5	100
Nuevo León	24.0	55.7	31.0	10.2	1.3	0.4	1.4	100
Oaxaca	26.8	62.4	21.8	7.3	2.7	5.2	0.6	100
Puebla	24.5	59.4	24.7	9.4	2.6	3.0	0.9	100
Querétaro	20.7	57.7	28.7	9.9	1.5	1.3	0.9	100
Quintana Roo	17.3	74.1	18.0	4.9	0.4	1.8	0.8	100
San Luis Potosí	20.0	59.9	29.1	7.2	0.6	1.9	1.3	100
Sinaloa	25.5	53.7	29.6	11.5	2.8	1.7	0.7	100
Sonora	22.1	68.9	20.1	6.4	1.6	2.6	0.4	100
Tabasco	18.0	70.9	20.5	5.6	0.9	1.5	0.6	100
Tamaulipas	20.0	58.4	28.3	10.0	1.2	1.2	0.9	100
Tlaxcala	19.0	65.3	25.4	5.2	1.4	1.4	1.3	100
Veracruz	22.0	61.2	22.7	10.4	1.7	2.5	1.5	100
Yucatán	17.4	67.4	23.4	6.9	0.6	1.1	0.6	100
Zacatecas	20.6	59.7	23.9	10.0	1.7	1.7	3.0	100
Estados Unidos Mexicanos	21.8	61.2	25.5	8.5	1.8	1.9	1.1	100
Frecuencia*		11 435.7	4 771.0	1 586.3	334.2	349.4	203.3	18 679.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.1.2

Promedio y distribución porcentual del tiempo de traslado reportado en la última atención preventiva, según institución que proporcionó el servicio y tamaño de localidad

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de traslado en minutos					No especificado	Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
SSA*								
15 000 habitantes o más	17.1	69.6	22.6	4.6	1.2	0.8	1.2	10
1 a 14 999 habitantes	18.8	69.2	19.1	7.3	1.4	2.0	1.0	100
Total	18.1	69.4	20.6	6.1	1.3	1.5	1.1	100
IMSS Solidaridad								
15 000 habitantes o más	23.8	50.1	30.0	16.2	1.1	2.4	0.2	100
1 a 14 999 habitantes	25.8	58.2	24.0	9.6	4.2	3.1	0.9	100
Total	25.5	57.0	24.9	10.6	3.7	3.0	0.8	100
IMSS								
15 000 habitantes o más	21.5	53.7	34.7	8.8	1.6	0.5	0.7	100
1 a 14 999 habitantes	28.0	46.2	31.6	15.3	3.7	2.1	1.1	100
Total	22.8	52.1	34.1	10.1	2.1	0.8	0.8	100
ISSSTE estatal/ISSSTE								
15 000 habitantes o más	21.6	51.8	35.2	10.6	0.9	0.9	0.6	100
1 a 14 999 habitantes	48.9	27.6	33.3	20.1	6.4	12.3	0.3	100
Total	28.0	46.1	34.7	12.9	2.2	3.6	0.5	100
Otras de seguridad social**								
15 000 habitantes o más	19.3	58.9	30.4	10.3	0.0	0.3	0.1	100
1 a 14 999 habitantes	59.2	34.7	29.1	22.6	3.3	10.4	0.0	100
Total	24.7	55.5	30.3	12.0	0.5	1.6	0.1	100
Privadas								
15 000 habitantes o más	26.3	55.4	29.8	10.0	1.6	2.4	0.8	100
1 a 14 999 habitantes	43.3	35.7	28.9	19.8	5.5	8.9	1.2	100
Total	30.1	51.1	29.6	12.2	2.5	3.9	0.9	100
Otras								
15 000 habitantes o más	21.2	54.0	24.3	15.9	1.0	0.6	4.2	100
1 a 14 999 habitantes	57.0	69.0	13.6	9.2	1.4	5.7	1.0	100
Total	31.1	58.1	21.4	14.1	1.1	2.0	3.3	100
No especificado								
15 000 habitantes o más	16.4	57.7	26.0	6.2	0.6	1.6	7.9	100
1 a 14 999 habitantes	10.8	71.1	10.6	5.2	0.0	1.3	11.8	100
Total	14.0	63.5	19.2	5.8	0.4	1.5	9.6	100
15 000 habitantes o más	20.7	60.3	28.6	7.7	1.4	1.1	1.0	100
Frecuencia***		6 284.9	2 977.9	803.6	141.2	113.9	108.8	10 430.3
1 a 14 999 habitantes	23.2	62.4	21.7	9.5	2.3	2.9	1.1	100
Frecuencia***		5 150.7	1 793.1	782.7	193.0	235.5	94.5	8 249.7
Total	21.8	61.2	25.5	8.5	1.8	1.9	1.1	100
Frecuencia***		11 435.7	4 771.0	1 586.3	334.2	349.4	203.3	18 679.9

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-NSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.1.3
Promedio y distribución porcentual del tiempo de espera reportado en la última atención ambulatoria preventiva, según entidad federativa

Entidad federativa	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera en minutos					No especificado	Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
Aguascalientes	29.1	54.4	19.2	9.2	2.4	6.4	8.4	100
Baja California	39.9	53.2	20.0	11.7	1.8	12.0	1.3	100
Baja California Sur	35.1	53.1	20.3	11.2	2.5	10.1	2.8	100
Campeche	40.5	55.1	20.1	11.5	1.8	10.3	1.2	100
Coahuila	28.5	64.5	14.8	8.4	1.6	8.5	2.2	100
Colima	23.1	68.3	14.2	7.7	1.4	6.4	2.0	100
Chiapas	26.2	59.7	19.5	11.4	1.0	6.4	2.0	100
Chihuahua	27.1	67.1	16.1	7.7	1.4	5.8	1.9	100
Distrito Federal	34.9	52.8	19.2	14.0	3.0	9.9	1.1	100
Durango	29.0	62.9	16.1	8.2	2.2	8.2	2.4	100
Guanajuato	28.4	54.6	21.8	8.5	2.7	7.1	5.3	100
Guerrero	28.5	63.0	17.3	8.5	2.0	8.1	1.1	100
Hidalgo	24.7	64.3	20.4	6.3	0.9	6.5	1.6	100
Jalisco	28.6	61.3	19.7	6.9	2.0	8.1	2.0	100
México	40.6	49.2	21.5	11.6	2.6	13.1	2.0	100
Michoacán	31.2	56.4	19.4	11.2	2.8	7.7	2.5	100
Morelos	36.3	47.4	26.6	11.2	2.2	9.2	3.4	100
Nayarit	31.1	60.8	17.1	7.1	2.1	10.4	2.5	100
Nuevo León	34.5	59.5	16.3	10.9	2.0	10.3	1.0	100
Oaxaca	31.5	59.0	20.6	9.9	1.5	7.8	1.2	100
Puebla	30.3	63.3	16.4	9.8	1.2	7.8	1.5	100
Querétaro	33.3	54.6	19.6	10.4	2.8	8.4	4.2	100
Quintana Roo	35.8	51.2	22.8	12.3	3.0	8.2	2.5	100
San Luis Potosí	41.0	51.4	19.2	12.8	2.2	12.4	2.0	100
Sinaloa	35.6	54.1	18.3	12.0	1.4	11.7	2.5	100
Sonora	27.9	66.3	15.0	7.9	1.2	7.5	2.1	100
Tabasco	37.7	52.3	22.0	11.3	1.5	10.2	2.7	100
Tamaulipas	29.8	58.8	19.8	9.8	1.3	8.9	1.4	100
Tlaxcala	29.6	54.7	23.2	8.4	1.7	7.2	4.8	100
Veracruz	37.7	59.9	15.5	9.7	2.1	10.8	2.0	100
Yucatán	40.3	53.7	18.7	10.4	4.4	11.5	1.3	100
Zacatecas	33.3	57.9	15.9	11.2	2.4	10.0	2.6	100
Estados Unidos Mexicanos	33.2	57.2	18.9	10.3	2.1	9.4	2.1	100
Frecuencia*		10 697.2	3 536.0	1 915.7	390.5	1 748.3	392.3	18 679.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.1.4

Promedio y distribución porcentual del tiempo de espera en la última utilización de servicios preventivos, según institución que proporcionó la atención y tamaño de localidad

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera en minutos					No especificado	Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
SSA*								
15 000 habitantes o más	30.1	58.5	18.5	9.6	2.1	9.1	2.2	100
1 a 14 999 habitantes	28.3	62.9	17.8	9.0	1.2	7.1	1.9	100
Total	29.1	61.0	18.2	9.3	1.6	7.9	2.0	100
IMSS Solidaridad								
15 000 habitantes o más	51.2	44.7	21.5	9.3	3.7	19.1	1.7	100
1 a 14 999 habitantes	34.1	59.2	18.2	9.9	2.1	9.1	1.6	100
Total	36.6	57.1	18.6	9.8	2.3	10.5	1.6	100
IMSS								
15 000 habitantes o más	44.6	48.2	19.8	12.5	3.3	14.5	1.7	100
1 a 14 999 habitantes	48.0	48.2	19.8	13.1	3.1	14.5	1.3	100
Total	45.3	48.3	19.8	12.6	3.2	14.5	1.6	100
ISSSTE estatal/ISSSTE								
15 000 habitantes o más	58.7	40.0	19.9	15.1	3.7	20.4	0.9	100
1 a 14 999 habitantes	69.2	42.3	16.7	16.5	4.1	17.7	2.7	100
Total	61.1	40.5	19.1	15.5	3.8	19.7	1.3	100
Otras de seguridad social**								
15 000 habitantes o más	38.7	53.6	18.6	12.6	1.3	13.1	0.8	100
1 a 14 999 habitantes	38.1	51.6	17.4	7.9	5.9	13.8	3.4	100
Total	38.6	53.1	18.5	12.0	2.0	13.2	1.2	100
Privadas								
15 000 habitantes o más	23.0	61.4	20.9	10.1	1.8	3.7	2.1	100
1 a 14 999 habitantes	32.1	49.7	26.0	10.9	2.7	8.7	2.0	100
Total	25.1	58.8	22.0	10.3	2.0	4.8	2.1	100
Otras								
15 000 habitantes o más	31.6	62.2	16.0	6.0	0.2	10.7	4.9	100
1 a 14 999 habitantes	20.0	62.6	17.8	13.6	2.1	2.3	1.6	100
Total	28.4	62.3	16.5	8.1	0.7	8.4	4.0	100
No especificado								
15 000 habitantes o más	22.9	67.9	5.7	5.7	0.0	9.6	11.1	100
1 a 14 999 habitantes	10.7	69.4	3.2	1.3	0.3	2.5	23.3	100
Total	18.0	68.7	4.6	3.7	0.1	6.5	16.4	100
15 000 habitantes o más	34.5	55.3	19.3	10.7	2.4	10.2	2.1	100
Frecuencia***		5 762.9	2 011.4	1 114.7	253.3	1 067.3	220.7	10 430.3
1 a 14 999 habitantes	31.6	59.9	18.5	9.7	1.7	8.3	2.1	100
Frecuencia***		4 934.3	1 524.6	801.1	137.2	680.9	171.6	8 249.7
Total	33.2	57.2	18.9	10.3	2.1	9.4	2.1	100
Frecuencia***		10 697.2	3 536.0	1 915.7	390.5	1 748.3	392.3	18 679.9

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.1.5
Distribución porcentual de utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses, según tiempo de espera y traslado en la última atención por tamaño de localidad

<i>Tiempo de espera y traslado</i>	<i>Tamaño de localidad</i>		<i>Total</i>
	<i>15 000 habitantes o más</i>	<i>1 a 14 999 habitantes</i>	
0 a 15 minutos	26.5	33.0	29.4
16 a 30 minutos	19.7	18.1	19.0
31 a 60 minutos	24.7	20.0	22.6
61 a 90 minutos	11.6	11.6	11.6
91 minutos o más	14.8	14.5	14.7
No especificado	2.7	2.7	2.7
Total	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	10 430.3	8 249.7	18 679.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.1.6
Promedio y distribución del tiempo total de espera y traslado reportado en la última atención preventiva, según entidad federativa

Entidad federativa	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera y traslado en minutos					No especificado	Total
		De 0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
Aguascalientes	46.0	27.0	23.0	21.6	9.2	9.6	9.6	100
Baja California	68.0	24.1	19.1	24.6	13.8	16.6	1.8	100
Baja California Sur	61.1	26.2	19.6	22.7	12.2	15.7	3.6	100
Campeche	58.5	34.0	15.9	22.1	12.2	14.1	1.7	100
Coahuila	44.3	34.1	24.5	18.8	8.6	11.2	2.8	100
Colima	37.3	45.7	17.5	16.6	8.5	8.8	2.9	100
Chiapas	47.2	32.6	16.4	22.7	13.7	11.2	3.4	100
Chihuahua	54.3	30.0	22.4	22.5	11.2	10.6	3.3	100
Distrito Federal	54.1	25.5	16.4	27.2	14.1	15.1	1.7	100
Durango	52.4	38.9	15.7	19.6	8.2	14.9	2.7	100
Guanajuato	48.0	29.0	16.9	25.3	10.7	11.8	6.3	100
Guerrero	49.7	41.3	14.2	18.5	8.9	15.2	1.9	100
Hidalgo	42.7	34.6	23.5	21.7	9.1	9.3	1.8	100
Jalisco	52.8	33.7	20.7	22.2	8.9	12.0	2.5	100
México	65.2	19.1	20.6	25.2	12.4	20.5	2.2	100
Michoacán	49.3	29.8	18.2	25.2	12.0	11.6	3.2	100
Morelos	56.4	18.0	22.1	30.1	11.8	14.0	4.0	100
Nayarit	47.2	41.3	15.7	17.9	8.4	14.0	2.7	100
Nuevo León	58.7	26.5	21.3	23.7	12.1	14.2	2.2	100
Oaxaca	58.6	29.7	19.4	22.7	10.1	16.3	1.8	100
Puebla	55.0	33.9	18.6	20.0	11.8	13.6	2.1	100
Querétaro	53.9	26.1	19.8	23.4	11.6	14.4	4.8	100
Quintana Roo	53.3	27.7	20.3	23.1	13.1	12.8	3.0	100
San Luis Potosí	61.2	25.1	18.7	23.1	13.2	17.2	2.7	100
Sinaloa	61.5	27.9	17.5	20.7	13.5	17.3	3.1	100
Sonora	50.4	34.9	22.5	18.8	8.3	13.1	2.4	100
Tabasco	54.4	31.6	17.0	23.1	11.8	13.7	2.8	100
Tamaulipas	50.0	29.2	21.7	24.0	11.2	12.0	1.9	100
Tlaxcala	48.8	23.0	24.5	27.4	9.1	10.9	5.1	100
Veracruz	60.0	34.6	15.8	16.6	12.9	17.3	2.8	100
Yucatán	57.7	27.3	19.9	20.9	12.7	17.4	1.8	100
Zacatecas	53.9	29.8	19.5	19.8	9.5	17.7	3.7	100
Estados Unidos Mexicanos	55.1	29.4	19.0	22.6	11.6	14.7	2.7	100
Frecuencia*		5 492.0	3 545.9	4 227.1	2 162.8	2 741.2	510.9	18 679.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.1.7

Promedio y distribución porcentual del tiempo total de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios preventivos, según institución que proporcionó la última atención y tamaño de localidad

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera y traslado en minutos					No especificado	Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
SSA*								
15 000 habitantes o más	47.4	35.7	17.5	21.4	9.4	12.9	3.1	100
1 a 14 999 habitantes	47.3	38.1	18.9	18.7	10.1	11.7	2.5	100
Total	47.3	37.0	18.3	19.9	9.8	12.2	2.8	100
IMSS Solidaridad								
15 000 habitantes o más	75.3	17.2	18.6	22.2	13.8	26.5	1.7	100
1 a 14 999 habitantes	60.0	28.3	20.5	18.7	13.0	17.2	2.3	100
Total	62.2	26.7	20.2	19.2	13.2	18.5	2.2	100
IMSS								
15 000 habitantes o más	66.0	17.7	20.5	26.8	13.9	19.0	2.1	100
1 a 14 999 habitantes	75.9	20.2	15.2	25.4	15.1	22.0	2.1	100
Total	68.0	18.2	19.5	26.5	14.1	19.6	2.1	100
ISSSTE estatal/ISSSTE								
15 000 habitantes o más	80.1	16.5	14.9	25.6	15.6	26.3	1.1	100
1 a 14 999 habitantes	119.3	11.9	11.4	22.6	12.2	38.9	3.0	100
Total	89.2	15.4	14.1	24.9	14.8	29.2	1.6	100
Otras de seguridad social**								
15 000 habitantes o más	57.9	18.9	25.5	24.1	14.7	15.8	1.0	100
1 a 14 999 habitantes	81.0	11.9	25.8	16.2	13.9	28.8	3.4	100
Total	61.0	17.9	25.6	23.0	14.6	17.6	1.3	100
Privadas								
15 000 habitantes o más	49.4	24.0	23.2	29.0	11.6	9.8	2.4	100
1 a 14 999 habitantes	75.2	13.5	14.3	28.9	18.1	22.2	3.0	100
Total	55.2	21.6	21.2	29.0	13.0	12.6	2.6	100
Otras								
15 000 habitantes o más	53.0	29.4	17.6	24.6	10.1	12.1	6.2	100
1 a 14 999 habitantes	77.7	43.8	10.6	14.6	18.0	10.7	2.3	100
Total	59.9	33.4	15.7	21.9	12.2	11.7	5.1	100
No especificado								
15 000 habitantes o más	40.7	42.0	18.3	5.4	6.8	12.4	15.1	100
1 a 14 999 habitantes	22.6	53.4	6.9	8.4	3.0	4.1	24.2	100
Total	33.2	47.1	13.3	6.7	5.1	8.8	19.0	100
15 000 habitantes o más	55.3	26.5	19.7	24.7	11.6	14.8	2.7	100
Frecuencia***		2 766.5	2 050.8	2 574.5	1 208.4	1 545.4	284.6	10 430.3
1 a 14 999 habitantes	54.9	33.1	18.1	20.0	11.6	14.5	2.7	100
Frecuencia***		2 725.6	1 495.1	1 652.6	954.3	1 195.8	226.3	8 249.7
Total	55.1	29.4	19.0	22.6	11.6	14.7	2.7	100
Frecuencia***		5 492.0	3 545.9	4 227.1	2 162.8	2 741.2	510.9	18 679.9

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.1

Promedio y distribución del tiempo de traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa

Entidad federativa	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de traslado en minutos					No especificado	Total
		De 0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
Aguascalientes	19.8	60.8	28.8	5.5	1.2	1.8	1.9	100
Baja California	21.1	53.3	34.4	8.8	1.1	0.8	1.6	100
Baja California Sur	37.9	68.1	19.6	8.3	1.0	2.5	0.5	100
Campeche	35.7	51.8	26.9	10.4	1.9	7.4	1.6	100
Coahuila	19.7	62.5	26.9	8.3	0.3	0.8	1.2	100
Colima	16.9	72.7	19.9	4.6	1.0	1.1	0.7	100
Chiapas	28.3	52.8	24.4	14.9	2.0	4.1	1.8	100
Chihuahua	27.8	59.6	23.3	11.2	1.5	2.8	1.6	100
Distrito Federal	22.2	53.9	30.2	12.7	1.0	1.3	0.9	100
Durango	25.0	59.8	24.3	9.3	2.4	3.1	1.1	100
Guanajuato	25.5	48.2	34.4	11.5	2.4	2.3	1.2	100
Guerrero	30.2	52.7	29.9	9.7	1.7	5.2	0.8	100
Hidalgo	24.6	58.5	27.7	8.7	1.9	2.7	0.5	100
Jalisco	22.6	57.8	29.0	9.6	1.4	1.6	0.6	100
México	24.5	51.0	32.7	11.5	2.2	1.6	1.0	100
Michoacán	26.0	57.2	26.3	11.3	1.5	2.7	1.0	100
Morelos	21.2	53.2	36.0	7.8	1.1	0.9	1.0	100
Nayarit	25.3	61.4	27.8	5.9	1.2	3.1	0.6	100
Nuevo León	23.4	54.3	32.9	9.4	1.2	1.2	1.0	100
Oaxaca	30.8	55.7	23.5	10.2	2.9	6.7	1.0	100
Puebla	27.2	51.8	30.6	10.6	2.0	4.0	1.0	100
Querétaro	27.2	49.5	30.3	12.4	2.7	3.1	2.0	100
Quintana Roo	21.6	70.3	19.2	6.0	1.1	2.8	0.6	100
San Luis Potosí	23.4	57.4	26.2	10.3	1.1	2.6	2.4	100
Sinaloa	25.1	50.4	34.1	11.5	2.0	1.6	0.4	100
Sonora	24.2	63.4	20.8	10.6	0.6	3.7	0.9	100
Tabasco	24.4	62.0	23.1	10.1	1.9	1.6	1.3	100
Tamaulipas	23.2	53.9	32.4	9.6	1.8	1.4	0.9	100
Tlaxcala	21.7	60.5	27.2	7.7	1.1	2.1	1.4	100
Veracruz	29.2	50.3	30.1	13.2	2.3	3.3	0.8	100
Yucatán	22.7	60.5	25.5	10.1	1.2	1.5	1.2	100
Zacatecas	31.3	47.6	32.1	10.9	2.4	5.6	1.4	100
Estados Unidos Mexicanos	25.0	54.7	29.4	10.8	1.7	2.4	1.0	100
Frecuencia*		8 963.6	4 816.8	1 764.0	280.2	396.5	169.2	16 390.3

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-NSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.2

Promedio y distribución porcentual del tiempo de traslado en la última atención ambulatoria curativa, según institución que proporcionó el servicio y tamaño de localidad

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de traslado en minutos					No especificado	Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
SSA*								
15 000 habitantes o más	19.2	61.0	29.8	6.8	1.0	0.7	0.7	100
1 a 14 999 habitantes	24.4	59.5	24.3	9.8	2.0	3.3	1.1	100
Total	22.3	60.0	26.6	8.6	1.6	2.2	1.0	100
IMSS Solidaridad								
15 000 habitantes o más	19.8	57.8	29.4	11.0	0.9	0.4	0.5	100
1 a 14 999 habitantes	31.4	49.4	24.0	17.5	3.3	3.9	1.9	100
Total	28.3	51.6	25.4	15.8	2.7	3.0	1.5	100
IMSS								
15 000 habitantes o más	23.1	51.6	35.1	10.4	1.2	0.9	0.8	100
1 a 14 999 habitantes	31.7	41.5	34.6	16.2	3.1	3.9	0.7	100
Total	24.8	49.7	35.0	11.5	1.5	1.5	0.8	100
ISSSTE estatal/ISSSTE								
15 000 habitantes o más	24.9	47.5	35.5	12.4	1.5	1.5	1.6	100
1 a 14 999 habitantes	41.0	37.5	23.6	24.2	6.3	7.7	0.7	100
Total	28.6	45.2	32.8	15.1	2.6	2.9	1.4	100
Otras de seguridad social**								
15 000 habitantes o más	23.0	54.1	31.3	12.5	0.3	1.5	0.3	100
1 a 14 999 habitantes	40.5	34.8	32.3	15.5	6.1	9.5	1.8	100
Total	25.3	51.6	31.4	12.9	1.1	2.5	0.5	100
Privadas								
15 000 habitantes o más	20.8	64.2	25.1	7.3	1.0	1.5	0.9	100
1 a 14 999 habitantes	36.5	39.3	31.6	18.3	3.1	6.6	1.1	100
Total	25.8	56.2	27.2	10.8	1.7	3.1	1.0	100
Otras								
15 000 habitantes o más	30.2	50.7	33.2	10.3	1.6	2.3	1.9	100
1 a 14 999 habitantes	56.0	46.6	25.0	15.9	4.8	4.6	3.1	100
Total	34.1	50.1	31.9	11.2	2.1	2.7	2.1	100
No especificado								
15 000 habitantes o más	20.7	64.8	16.6	6.6	1.3	4.4	6.3	100
1 a 14 999 habitantes	24.5	46.8	28.5	3.1	4.3	4.5	12.8	100
Total	22.3	56.9	21.8	5.1	2.6	4.4	9.2	100
Total 15 000 habitantes o más								
Frecuencia***		5 934.8	3 131.1	907.9	111.5	124.2	94.0	10 303.4
Total 1 a 14 999 habitantes								
Frecuencia***		3 028.8	1 685.7	856.1	168.7	272.4	75.2	6 086.9
Total								
Frecuencia***		8 963.6	4 816.8	1 764.0	280.2	396.5	169.2	16 390.3

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.3

Promedio y distribución porcentual del tiempo de espera reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa

Entidad federativa	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera en minutos					No especificado	Total
		De 0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
Aguascalientes	46.9	41.5	23.1	12.9	5.2	13.2	4.1	100
Baja California	62.3	43.2	17.2	12.1	2.7	23.2	1.6	100
Baja California Sur	47.2	48.4	19.2	13.2	1.9	15.8	1.5	100
Campeche	57.9	38.8	21.0	13.9	3.3	20.5	2.5	100
Coahuila	61.3	39.0	18.7	14.5	3.9	22.1	1.8	100
Colima	39.0	50.5	20.6	13.7	2.5	10.7	2.0	100
Chiapas	44.0	41.4	26.1	14.8	2.3	13.8	1.6	100
Chihuahua	42.3	45.4	21.7	15.2	3.4	12.1	2.2	100
Distrito Federal	64.6	34.8	19.9	15.0	4.8	23.3	2.2	100
Durango	53.9	44.1	21.1	11.2	3.6	17.7	2.3	100
Guanajuato	46.6	42.7	20.4	14.6	5.7	13.9	2.7	100
Guerrero	42.6	48.6	21.0	11.2	4.3	13.6	1.3	100
Hidalgo	44.7	44.4	23.6	14.4	2.8	13.1	1.7	100
Jalisco	49.0	47.8	17.2	10.9	4.0	18.5	1.6	100
México	57.9	37.9	19.9	13.6	4.9	21.8	1.9	100
Michoacán	44.0	44.6	21.9	12.1	3.2	14.3	3.9	100
Morelos	48.3	37.0	25.6	17.3	4.6	13.8	1.7	100
Nayarit	52.8	47.2	18.4	10.7	2.7	18.9	2.1	100
Nuevo León	55.1	40.8	19.4	14.8	4.1	18.7	2.2	100
Oaxaca	36.1	51.2	24.9	10.6	2.3	9.7	1.3	100
Puebla	45.3	46.0	23.0	12.0	2.5	15.1	1.4	100
Querétaro	46.0	43.9	22.1	10.1	4.6	15.2	4.1	100
Quintana Roo	48.5	37.8	27.8	13.4	3.7	15.1	2.2	100
San Luis Potosí	52.8	39.3	21.5	14.6	2.5	18.3	3.8	100
Sinaloa	61.9	37.6	20.1	13.0	4.0	22.9	2.4	100
Sonora	55.5	46.5	19.3	11.7	2.8	17.7	2.0	100
Tabasco	58.1	37.6	20.5	16.1	3.4	19.9	2.5	100
Tamaulipas	47.3	46.2	21.7	11.5	3.4	15.6	1.6	100
Tlaxcala	43.4	42.9	23.5	12.2	4.7	13.4	3.3	100
Veracruz	52.3	40.1	21.6	15.3	3.1	18.3	1.6	100
Yucatán	65.1	30.0	22.0	15.7	5.3	25.0	2.0	100
Zacatecas	49.0	43.4	21.7	12.7	3.0	16.6	2.6	100
Estados Unidos Mexicanos	52.5	41.6	20.9	13.4	3.9	18.1	2.1	100
Frecuencia*		6 817.6	3 419.0	2 204.2	634.4	2 974.1	341.0	16 390.3

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.4

Promedio y distribución porcentual del tiempo de espera en la última utilización de servicios ambulatorios curativos, según institución que proporcionó la atención y tamaño de localidad

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera en minutos						Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más	No especificado	
SSA*								
15 000 habitantes o más	56.2	35.1	23.2	15.3	5.0	20.0	1.4	100
1 a 14 999 habitantes	40.3	47.3	21.3	14.0	3.2	12.1	2.1	100
Total	46.9	42.3	22.1	14.5	3.9	15.4	1.8	100
IMSS Solidaridad								
15 000 habitantes o más	89.8	24.2	17.2	12.8	7.2	37.7	0.9	100
1 a 14 999 habitantes	52.6	37.4	23.5	15.1	4.5	17.4	2.1	100
Total	62.3	34.0	21.8	14.5	5.2	22.7	1.8	100
IMSS								
15 000 habitantes o más	86.6	23.4	18.1	15.8	6.4	34.4	1.9	100
1 a 14 999 habitantes	83.9	23.9	19.0	16.4	4.4	34.0	2.3	100
Total	86.1	23.6	18.2	15.9	6.0	34.4	1.9	100
ISSSTE estatal/ISSSTE								
15 000 habitantes o más	80.3	24.5	19.4	15.0	5.9	32.2	3.0	100
1 a 14 999 habitantes	81.7	25.6	16.2	20.8	5.9	30.1	1.4	100
Total	80.6	24.7	18.7	16.3	5.9	31.8	2.6	100
Otras de seguridad social**								
15 000 habitantes o más	46.8	38.4	29.2	16.2	2.4	12.7	1.1	100
1 a 14 999 habitantes	40.2	58.3	12.4	4.5	5.1	15.6	4.1	100
Total	46.0	41.0	27.0	14.6	2.8	13.1	1.5	100
Privadas								
15 000 habitantes o más	26.0	57.7	22.8	10.3	1.6	5.5	2.1	100
1 a 14 999 habitantes	26.9	60.0	20.0	10.0	2.0	6.0	2.0	100
Total	26.3	58.5	21.9	10.2	1.7	5.6	2.1	100
Otras								
15 000 habitantes o más	38.6	50.1	21.4	10.8	3.3	12.6	1.8	100
1 a 14 999 habitantes	30.9	54.7	14.0	9.7	3.8	4.8	13.0	100
Total	37.6	50.7	20.3	10.7	3.4	11.4	3.5	100
No especificado								
15 000 habitantes o más	31.3	53.4	20.8	4.5	3.8	10.1	7.4	100
1 a 14 999 habitantes	18.3	55.9	13.4	3.7	0.4	4.9	21.7	100
Total	26.1	54.5	17.6	4.1	2.3	7.8	13.7	100
Total 15 000 habitantes o más								
Frecuencia***		4 003.4	2 174.0	1 389.1	437.2	2 103.0	196.7	10 303.4
Total 1 a 14 999 habitantes								
Frecuencia***		2 814.3	1 245.0	815.1	197.2	871.0	144.3	6 086.9
Total								
Frecuencia***		6 817.6	3 419.0	2 204.2	634.4	2 974.1	341.0	16 390.3

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.5

Distribución porcentual de usuarios de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, según tiempo de espera y traslado en la última atención, por tamaño de localidad

<i>Tiempo de espera y traslado</i>	<i>Tamaño de localidad</i>		<i>Total</i>
	<i>15 000 habitantes o más</i>	<i>1 a 14 999 habitantes</i>	
0 a 15 minutos	16.8	18.5	17.4
16 a 30 minutos	16.3	16.3	16.3
31 a 60 minutos	24.2	23.6	24.0
61 a 90 minutos	13.2	14.6	13.7
91 minutos o más	27.1	24.1	26.0
No especificado	2.4	2.9	2.6
Total	100.0	100.0	100.0
Frecuencia*	10 303.4	6 086.9	16 390.3

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.6

Promedio y distribución del tiempo total de espera y traslado reportado en la última atención ambulatoria curativa, según entidad federativa

Entidad federativa	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera y traslado en minutos					No especificado	Total
		De 0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
Aguascalientes	66.9	15.8	21.2	25.9	12.6	19.6	4.9	100
Baja California	83.5	17.2	18.2	22.3	12.7	27.1	2.5	100
Baja California Sur	84.9	24.0	19.7	19.7	13.5	21.4	1.7	100
Campeche	92.9	15.5	14.1	23.4	12.2	31.1	3.7	100
Coahuila	81.1	16.2	18.1	22.3	13.8	27.7	1.9	100
Colima	56.0	25.9	20.5	22.8	13.9	14.5	2.4	100
Chiapas	72.1	14.6	19.2	25.0	14.8	23.6	2.8	100
Chihuahua	70.3	19.3	17.6	25.3	16.5	18.6	2.7	100
Distrito Federal	87.1	15.6	11.8	23.4	15.0	31.5	2.7	100
Durango	78.7	23.3	13.5	23.5	10.9	26.0	2.8	100
Guanajuato	72.1	17.3	15.7	25.6	13.2	24.8	3.4	100
Guerrero	73.0	20.7	17.2	25.2	11.2	23.7	2.0	100
Hidalgo	69.2	20.1	17.2	27.9	13.1	19.8	1.9	100
Jalisco	71.5	22.2	17.3	22.2	11.5	25.0	1.8	100
México	82.6	14.2	14.8	23.8	14.4	30.4	2.4	100
Michoacán	69.9	21.5	15.4	23.5	13.6	21.7	4.3	100
Morelos	69.7	14.2	17.7	27.7	17.3	21.2	1.9	100
Nayarit	78.3	23.4	17.8	20.5	11.0	24.9	2.4	100
Nuevo León	78.6	16.7	18.7	21.9	14.9	25.2	2.6	100
Oaxaca	66.5	20.1	19.2	27.2	10.2	21.2	2.1	100
Puebla	72.4	18.5	16.8	27.4	13.4	22.1	1.8	100
Querétaro	73.6	18.2	16.8	23.8	12.3	23.9	5.0	100
Quintana Roo	70.1	15.4	19.3	26.4	14.3	22.2	2.4	100
San Luis Potosí	76.5	15.4	16.2	25.8	12.7	25.5	4.4	100
Sinaloa	87.1	14.9	16.1	22.6	14.0	29.9	2.5	100
Sonora	79.9	22.4	17.8	20.8	11.5	25.1	2.4	100
Tabasco	82.3	15.8	15.8	21.7	17.4	26.2	3.1	100
Tamaulipas	70.7	17.1	22.6	25.8	10.4	22.0	2.1	100
Tlaxcala	65.2	17.2	23.4	21.9	12.2	21.8	3.5	100
Veracruz	81.5	17.6	14.3	23.1	16.0	27.0	2.0	100
Yucatán	88.2	13.8	11.7	23.4	15.1	33.1	2.9	100
Zacatecas	80.4	13.2	18.3	25.5	13.5	26.4	3.1	100
Estados Unidos Mexicanos	77.5	17.4	16.3	24.0	13.7	26.0	2.6	100
Frecuencia*		2 859.1	2 667.4	3 929.7	2 251.6	4 262.1	420.4	16 390.3

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 9.2.7

Promedio y distribución porcentual del tiempo de espera y traslado reportado por utilizadores de servicios ambulatorios curativos, según institución que proporcionó la última atención y tamaño de localidad

Institución a la que pertenece quien lo atendió	Promedio minutos	Porcentaje de tiempo de espera y traslado en minutos					No especificado	Total
		0 a 15	16 a 30	31 a 60	61 a 90	91 o más		
SSA*								
15 000 habitantes o más	75.6	14.3	15.4	27.1	14.4	27.0	1.8	100
1 a 14 999 habitantes	64.7	22.0	18.0	22.7	14.2	20.5	2.6	100
Total	69.2	18.8	16.9	24.5	14.3	23.2	2.3	100
IMSS Solidaridad								
15 000 habitantes o más	109.5	10.4	10.7	18.6	13.9	45.4	1.0	100
1 a 14 999 habitantes	84.0	15.4	13.3	22.0	16.6	29.7	3.1	100
Total	90.8	14.1	12.6	21.1	15.9	33.8	2.5	100
IMSS								
15 000 habitantes o más	109.9	7.6	11.9	20.4	14.8	43.1	2.2	100
1 a 14 999 habitantes	115.8	7.7	10.3	19.5	15.4	44.4	2.7	100
Total	111.0	7.6	11.6	20.2	14.9	43.4	2.3	100
ISSSTE estatal/ISSSTE								
15 000 habitantes o más	105.7	8.9	10.3	20.6	15.6	40.8	3.8	100
1 a 14 999 habitantes	122.4	5.9	11.4	14.3	19.8	46.6	2.0	100
Total	109.6	8.2	10.6	19.1	16.6	42.1	3.4	100
Otras de seguridad social**								
15 000 habitantes o más	69.8	13.8	16.1	31.4	19.3	18.3	1.1	100
1 a 14 999 habitantes	81.0	18.6	18.2	25.3	5.9	27.9	4.1	100
Total	71.2	14.4	16.3	30.7	17.6	19.5	1.5	100
Privadas								
15 000 habitantes o más	46.8	29.1	21.7	26.6	10.7	9.4	2.5	100
1 a 14 999 habitantes	63.3	20.0	17.8	29.1	14.2	16.3	2.6	100
Total	52.1	26.2	20.4	27.5	11.8	11.6	2.5	100
Otras								
15 000 habitantes o más	68.5	18.1	21.2	26.7	9.7	21.3	3.1	100
1 a 14 999 habitantes	93.0	22.1	14.0	16.9	15.2	18.4	13.4	100
Total	71.9	18.7	20.1	25.1	10.5	20.9	4.7	100
No especificado								
15 000 habitantes o más	53.6	19.5	23.4	22.0	6.6	17.9	10.6	100
1 a 14 999 habitantes	44.4	24.1	23.4	14.3	5.4	10.6	22.2	100
Total	49.8	21.5	23.4	18.6	6.1	14.7	15.7	100
Total 15 000 habitantes o más	79.1	16.8	16.3	24.2	13.2	27.1	2.4	100
Frecuencia***		1 734.3	1 676.4	2 496.2	1 361.9	2 791.4	243.2	10 303.4
Total 1 a 14 999 habitantes	74.9	18.5	16.3	23.5	14.6	24.2	2.9	100
Frecuencia***		1 124.8	991.0	1 433.5	889.7	1 470.7	177.2	6 086.9
Total	77.5	17.4	16.3	24.0	13.7	26.0	2.6	100
Frecuencia***		2 859.1	2 667.4	3 929.7	2 251.6	4 262.1	420.4	16 390.3

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Gastos de bolsillo en servicios de salud

C O N T E N I D O

Servicios preventivos

- Gastos de bolsillo por servicios ambulatorios preventivos según entidad federativa
- Gastos de bolsillo en la última atención preventiva, por institución que proporcionó el servicio y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total
- Gastos de bolsillo en la última atención preventiva, por condición de derechohabiencia y distribución porcentual del tipo de gasto, respecto al gasto total.
- Gastos de bolsillo en el hogar por servicios preventivos, según tipo de gasto y cuartil de ingreso.
- Gastos de bolsillo en el hogar por servicios preventivos, según tipo de gasto y número de salarios mínimos.
- Gasto de bolsillo en la última atención preventiva, respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y cuartil de ingreso.
- Gasto de bolsillo de la última atención preventiva en el hogar, respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y número de salarios mínimos.

Servicios curativos

- Gastos de bolsillo por servicios ambulatorios curativos, según entidad federativa.
- Gastos de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa, por institución que proporcionó el servicio, y distribución porcentual del tipo de gasto, con respecto al gasto total.
- Gastos de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa, por condición de derechohabiencia, y distribución porcentual del tipo de gasto, respecto el gasto total.
- Gastos de bolsillo en el hogar por servicios ambulatorios curativos según tipo de gasto y cuartil de ingreso

- Gastos de bolsillo en el hogar, por servicios ambulatorios curativos, según tipo de gasto y número de salarios mínimos.
- Gastos de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y cuartil de ingreso.
- Gastos de bolsillo de la última atención ambulatoria curativa en el hogar, respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y número de salarios mínimos.

Servicios hospitalarios

- Gastos de bolsillo por servicios hospitalarios, por utilizador y hogar, según entidad federativa.
- Gastos de bolsillo del hogar en la última atención hospitalaria por institución que proporcionó el servicio, y distribución porcentual del tipo de gasto respecto al gasto total.
- Gastos de bolsillo del hogar en la última atención hospitalaria, por condición de derechohabiencia, y distribución porcentual del tipo de gasto, respecto al gasto total.
- Gastos de bolsillo del hogar en la última atención hospitalaria, por tipo de gasto y cuartil de ingreso.
- Gastos de bolsillo del hogar en la última atención hospitalaria por tipo de gasto y número de salarios mínimos.
- Gastos de bolsillo en la última atención hospitalaria, respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto e ingreso mensual en el hogar.
- Gastos de bolsillo en el hogar por la última atención hospitalaria, respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y número de salarios mínimos.

Gastos de bolsillo en servicios de salud

Servicios preventivos

- Se estima que los 16.5 millones de mexicanos que utilizaron servicios de salud preventivos en los últimos 12 meses, tuvieron un promedio de gastos de bolsillo de 84.3 pesos, por individuo, en la última atención.
- En 8.9 millones de hogares algunos de sus ocupantes utilizaron algún servicio de salud ambulatorio preventivo.
- En cada uno de estos hogares, en promedio, 1.8 personas solicitaron servicios de salud preventivos.
- El promedio de gasto de bolsillo por hogar, en atención ambulatoria preventiva fue de 149.6 pesos en la última atención.
- Es importante señalar que en las instituciones del sector público no se cobra por las acciones de los programas prioritarios preventivos (ejemplo: vacunación, detección oportuna de cáncer cervicouterino, y otros), sin embargo, esta es la información proporcionada por los encuestados.
- Las entidades con los gastos de bolsillo más altos por individuo atendido son: Sonora (163.6 pesos), Chihuahua (150.2), Baja California Sur (137), Guanajuato (134), Distrito Federal (120) y Morelos (115).
- Las entidades con los gastos de bolsillo más altos por hogar son: Guanajuato (288 pesos), Sonora (271), Chihuahua (238), Baja California Sur (234) y Aguascalientes (224 pesos).
- Las entidades con los gastos de bolsillo más bajos por individuo atendido son: Oaxaca (22 pesos), Chiapas (29), Hidalgo (40), Veracruz (40), Guerrero (43), Campeche (44) y Tabasco (46 pesos).
- Las entidades con los gastos de bolsillo más bajos por hogar son: Oaxaca (30 pesos), Guerrero (73), Veracruz (73), Chiapas (79), Campeche (79) y Tabasco (80 pesos).
- Los gastos de bolsillo por hogar para utilización de servicios preventivos tiene la siguiente distribución por motivo de gasto: 60.7% fue por el costo de la consulta, 16.8% para el pago de medicamentos, 8.5% para traslados y 7.5% para estudios de laboratorio.
- El gasto de bolsillo por hogar para atención preventiva ambulatoria y tipo de institución fue el siguiente: servicios privados (566 pesos), SSA (45), ISSSTE (37), IMSS (31) e IMSS-Solidaridad (21 pesos).
- El promedio de gasto de bolsillo por hogar para servicios ambulatorios preventivos fue ligeramente mayor en los derechohabientes (154 pesos) en relación con los no derechohabientes (138 pesos). La varianza en este último grupo es mayor.

- Los gastos de bolsillo en el hogar por nivel de ingreso en cuartiles, fueron ligeramente mayores en el primer cuartil (86.3 pesos) en relación con el promedio del segundo cuartil (83.5 pesos). Esto es explicable por la menor frecuencia de utilización de instituciones de seguridad social por los hogares con más bajos ingresos.
- Los hogares con ingresos mayores a 4 550 pesos mensuales (IV cuartil) gastaron en promedio tres veces más en gastos de bolsillo para atención preventiva, que en los hogares con ingresos correspondientes a los primeros dos cuartiles.
- De acuerdo con el ingreso del hogar en salarios mínimos mensuales (SMM) los gastos de bolsillo por servicios preventivos fueron los siguientes: menos de 1 SMM, 84.6 pesos, de 1.0 a 1.9 SMM, 82.6 pesos, de 2 a 2.9 SMM, 97.8 pesos, 3 a 4.9 SMM 148.2 pesos, 5 a 9.9 SMM, 215 pesos y más de 10 salarios mínimos mensuales.
- Los gastos de bolsillo para servicios preventivos representan 12.5% del total de ingresos mensuales en los hogares del primer cuartil (de 0 a 1100 pesos de ingreso mensual), para el segundo cuartil representan 5%, para el III cuartil de ingreso 3.8% y para los hogares del IV cuartil (ingresos de 4 550 pesos ó más) representan sólo 3%. Situación semejante se observa al analizar el promedio de gastos de bolsillo por este tipo de atención, en relación con el ingreso del hogar en salarios mínimos.

Servicios curativos

- Se estima que 15 millones de mexicanos utilizaron servicios curativos ambulatorios en los últimos 12 meses, con un promedio de gastos de bolsillo de 145.9 pesos por paciente, en la última atención.
- En nueve millones de hogares, alguno de sus ocupantes utilizó servicios curativos ambulatorios. En cada uno de estos hogares, en promedio, 1.7 personas utilizaron servicios curativos ambulatorios.
- El promedio de gastos de bolsillo por hogar en atención ambulatoria curativa fue de 235.8 pesos en la última atención.
- Las entidades federativas con los gastos de bolsillo por hogar para atención ambulatoria curativa más elevados son: Guanajuato (404 pesos), Aguascalientes (371), Baja California (364), Zacatecas (349) y Michoacán (323 pesos).
- Las entidades federativas con los gastos de bolsillo por hogar para atención ambulatoria curativa más bajos son: Oaxaca (133 pesos), Yucatán (146), Coahuila (170), Nuevo León (171) y Veracruz (176 pesos).

- Los gastos de bolsillo para atención curativa ambulatoria son más elevados que los gastos para atención preventiva.
- Los gastos de bolsillo por hogar para atención ambulatoria curativa, por institución, fueron: servicios privados (509 pesos), SSA (140 pesos), ISSSTE (53), IMSS (49) e IMSS-Solidaridad (35).
- Del total de gastos de bolsillo para atención curativa, 47.2% fueron para medicamentos, 27.2% para el pago de la consulta, 8.3% para traslado, 8.3% para estudios de laboratorio y 9% corresponde a otros gastos.
- Los gastos de bolsillo por hogar destinados a la compra de medicamentos por institución que proporcionó el servicio fueron de: 252 pesos en servicios privados, 74 si la atención fue en la SSA, 12 en el IMSS-Solidaridad, 10 fue en el ISSSTE y sólo seis pesos en el caso de atenderse en el IMSS.
- El costo promedio de la consulta privada fue de 162 pesos; en la SSA, en promedio, les cobran 30 pesos por cuotas de recuperación.
- En general, el gasto de bolsillo por hogar para la atención curativa ambulatoria en los no derechohabientes fue 50% mayor (235 pesos), en relación con los derechohabientes (157 pesos).
- El promedio de gastos de bolsillo por atención curativa según el ingreso del hogar por cuartiles fue: primer cuartil de 205 pesos, semejante al del segundo cuartil (204 pesos), el tercer cuartil fue de 221 pesos y el 25% de los hogares más ricos gastaron 301 pesos.
- Los gastos de bolsillo por hogar para atención ambulatoria curativa por ingresos del hogar en salarios mínimos mensuales (SMM) fueron los siguientes: ingreso del hogar menos de 1 SMM, 202 pesos, entre 1 a 1.9 SMM, el gasto es de 196 pesos, de 2 a 2.9 SMM, 230.4 pesos, de 5 a 9.9, 283.9 pesos, y con ingresos de más de 10 salarios mínimos mensuales por hogar, 404 pesos. Los hogares con más bajos ingresos gastan ligeramente más que el siguiente grupo de ingreso, situación explicable por la población con los ingresos más bajos.
- Aunque los ingresos mensuales por hogar pueden ser diez veces mayores (al comparar los dos extremos de ingresos por hogar), los gastos de bolsillo para atención curativa ambulatoria fueron de sólo el doble en los de mayor ingreso.
- En los hogares con ingresos de menos de un salario mínimo mensual los gastos de bolsillo para atención curativa ambulatoria representan la mitad de todos los ingresos mensuales en el hogar. En cambio, en los hogares que ganan más de 10

salarios mínimos mensuales, estos gastos representan sólo 2.6% de los ingresos mensuales en el hogar.

- De manera semejante, se presentan los resultados de la proporción de gastos de bolsillo en relación con los ingresos del hogar por cuartiles; 25% de los hogares con ingresos más bajos necesitan destinar 47.2% de sus ingresos mensuales para este propósito, y en 25% de los hogares con los mayores ingresos, estos gastos representan sólo, 3.8% de los ingresos mensuales del hogar.

Servicios hospitalarios

- Se estima que 3.1 millones de mexicanos se hospitalizaron en los últimos 12 meses, con un promedio de gastos de bolsillo de 2 105 pesos por paciente, en el último internamiento.
- En 2.8 millones de hogares alguno de sus ocupantes se hospitalizó. En cada uno de estos hogares, en promedio, se hospitalizaron 1.1 personas diferentes.
- El promedio de gastos de bolsillo por hogar para hospitalización es de 2 279 pesos.
- Los gastos de bolsillo por hogar para hospitalización, por institución fueron los siguientes: servicios privados 6 974 pesos, SSA, 1 411 pesos, ISSSTE, 859 pesos, IMSS-Solidaridad, 327 pesos e IMSS, 228 pesos.
- En general, los gastos de bolsillo por hogar en los no derechohabientes fueron casi del doble (3 138 pesos), en relación con los derechohabientes (1 588 pesos).
- El promedio de gasto de bolsillo por hogar para hospitalización en hogares con ingresos de menos de un salario mínimo fue de 2 426 pesos, y este gasto representa el ingreso por hogar de cinco meses.
- El promedio de gasto de bolsillo por hogar para hospitalización en aquellos con ingresos entre uno y menos de dos salarios mínimos fue de 1 674 pesos. Este gasto representa los ingresos de más de un mes de todos los miembros del hogar.
- El 25% de los hogares con los mayores ingresos (IV cuartil) gastaron en promedio 2 938 pesos, y estos gastos representan 30% de los ingresos mensuales de todos los miembros del hogar.
- Los hogares con los ingresos más bajos (primer cuartil) gastan más que los del segundo y tercer cuartil, y estos gastos representan más de una tercera parte del ingreso anual de todos los miembros del hogar.

Figura 10.1.1
Promedio de gastos de bolsillo en servicios ambulatorios preventivos por utilizadores y hogar, según entidad federativa





Figura 10.1.2
Promedio del gasto de bolsillo en la última atención preventiva, por institución que proporcionó el servicio






Figura 10.1.3
Promedio del gasto de bolsillo en la última atención preventiva, por institución que proporcionó el servicio y distribución del tipo de gasto

N* = 8 929 hogares

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionarios de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 10.1.4
Promedio del gasto de bolsillo en la última atención preventiva, por condición de derechohabiente y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

N* = 8 928 hogares

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000


Figura 10.1.5
Promedio del gasto de bolsillo del hogar por servicios preventivos, según tipo de gasto y cuartil de ingreso



N* = 8 928
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 10.1.6
Promedio del gasto de bolsillo en el hogar por servicios preventivos, según tipo de gasto y número de salarios mínimos



N* = 8 928
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 10.1.7
Proporción promedio del gasto de bolsillo en la última atención preventiva con respecto al ingreso mensual, por cuartil de ingreso

N* = 8 928
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000



Figura 10.1.8
Proporción promedio del gasto de bolsillo de la última atención preventiva en el hogar con respecto al ingreso mensual, por número de salarios mínimos

N* = 8 928
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 10.2.1
Promedio de gastos de bolsillo en servicios ambulatorios curativos, por utilizadores y hogar, según entidad federativa





Figura 10.2.2
Promedio de gasto de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa, por institución que proporcionó el servicio






Figura 10.2.3
Promedio de gasto de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa, por institución que proporcionó el servicio y distribución porcentual del tipo de gasto

N* = 8 998 hogares

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 10.2.4
Promedio de gasto de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa, por condición de derechohabiente y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

N* = 8 998 hogares

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000


Figura 10.2.5
Promedio de gasto de bolsillo del hogar por servicios ambulatorios curativos, según cuartil de ingreso



N* = 8 998 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 10.2.6
Promedio de gasto de bolsillo en el hogar por servicios ambulatorios curativos, según tipo de gasto y número de salarios mínimos



N* = 8 998 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA- INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 10.2.7
Proporción promedio del gasto de bolsillo en la última atención ambulatoria con respecto al ingreso mensual, por cuartil de ingreso

N* = 8 998 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 10.2.8
Proporción promedio del gasto de bolsillo en la última atención ambulatoria curativa en el hogar con respecto al ingreso mensual, por número de salarios mínimos

N* = 8 998 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000


Figura 10.3.1
Promedio de gastos de bolsillo por hogar para servicios hospitalarios según entidad federativa



N* = 2 851 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 10.3.2
Promedio de gastos de bolsillo en la última hospitalización por institución



N* = 2 851 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 10.3.3
Promedio de gastos de bolsillo en la última hospitalización por derechohabencia

N* = 2 851 hogares
N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 10.3.4
Promedio de gastos de bolsillo en la última hospitalización por cuartil de ingreso

N* = 2 851 hogares
N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000


Figura 10.3.5
Promedio de gastos de bolsillo del gasto en atención hospitalaria con respecto al ingreso mensual en el hogar, según tipo de gasto e ingreso mensual en el hogar



N* = 2 851 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 10.3.6
Proporción promedio del gasto de bolsillo en la última atención hospitalaria con respecto al ingreso mensual, por cuartiles



N* = 2 851 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000



Figura 10.3.7
Proporción promedio del gasto de bolsillo en el hogar por la última atención hospitalaria con respecto al ingreso mensual, según número de salarios mínimos

N* = 2 851 hogares
 N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 10.1.1
Promedio de gastos de bolsillo en servicios ambulatorios preventivos por utilizador y hogar, según entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia * de utilizadores de servicios preventivos</i>	<i>Promedio de gastos por servicios preventivos</i>	<i>Frecuencia * de hogares que utilizaron servicios preventivos</i>	<i>Promedio de gastos en el hogar por servicios preventivos</i>	<i>Promedio de utilizadores de servicios preventivos por hogar</i>
Aguascalientes	158.6	91.9	72.4	224.0	2.2
Baja California	346.6	106.0	208.5	182.4	1.7
Baja California Sur	66.0	137.3	42.6	234.1	1.6
Campeche	132.2	44.2	74.8	79.2	1.8
Coahuila	349.1	65.6	212.3	109.0	1.6
Colima	92.5	90.2	51.3	161.9	1.8
Chiapas	644.6	29.4	331.7	79.3	1.9
Chihuahua	475.1	150.2	269.6	238.3	1.8
Distrito Federal	1 554.1	119.6	891.4	195.3	1.7
Durango	244.7	88.5	138.3	148.8	1.8
Guanajuato	790.3	134.0	364.5	288.4	2.2
Guerrero	440.7	42.6	243.8	72.5	1.8
Hidalgo	488.7	40.4	244.7	81.6	2.0
Jalisco	1 134.9	90.6	592.9	171.6	1.9
México	2 007.4	93.2	1 050.5	157.2	1.9
Michoacán	533.0	110.2	302.4	185.5	1.8
Morelos	198.3	114.6	114.4	148.0	1.7
Nayarit	178.6	79.5	97.8	147.9	1.8
Nuevo León	666.1	102.3	401.2	175.2	1.7
Oaxaca	644.0	21.7	375.2	35.7	1.7
Puebla	1 050.8	63.5	513.7	113.7	2.0
Querétaro	277.1	64.9	137.7	126.5	2.0
Quintana Roo	179.8	61.4	103.5	107.2	1.7
San Luis Potosí	499.7	76.1	228.0	153.5	2.2
Sinaloa	334.7	114.2	209.4	179.4	1.6
Sonora	318.4	163.6	193.0	270.5	1.6
Tabasco	321.6	45.6	185.8	79.5	1.7
Tamaulipas	511.6	117.2	291.8	203.3	1.8
Tlaxcala	173.1	65.5	88.1	121.5	2.0
Veracruz	1 228.1	40.3	647.2	73.0	1.9
Yucatán	290.6	49.7	161.7	94.6	1.8
Zacatecas	185.9	60.3	88.5	98.0	2.1
Estados Unidos Mexicanos	16 516.8	84.3	8 928.8	149.6	1.8

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.1.2
Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria preventiva por institución que proporcionó el servicio y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

Tipo de gasto	SSA*		IMSS Solidaridad		IMSS		ISSSTE estatal/ISSSTE		Otras de seguridad social		Privadas		Otras		Total	
	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%
Traslado	7.1	16.0	8.6	41.7	13.7	44.1	12.9	34.5	12.9	8.7	20.1	3.6	18.1	18.4	12.6	8.5
Costo de la consulta	13.1	29.3	1.5	7.1	4.3	13.9	3.8	10.1	90.8	61.7	408.1	72.1	41.8	42.4	90.8	60.7
Medicamentos	13.5	30.3	2.9	14.1	3.0	9.5	6.5	17.3	13.1	8.9	83.4	14.7	18.4	18.7	25.2	16.8
Análisis y estudios de laboratorio	5.3	11.8	2.2	10.6	1.9	6.1	1.7	4.5	5.4	3.7	38.3	6.8	12.6	12.7	11.2	7.5
Otros gastos	5.6	12.6	5.5	26.6	8.2	26.4	12.6	33.6	24.9	17.0	15.9	2.8	7.7	7.8	9.7	6.5
Gasto total	44.6	100.0	20.8	100.0	31.1	100.0	37.4	100.0	147.0	100.0	565.9	100.0	98.5	100.0	149.6	100.0

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.1.3
Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria preventiva por condición de derechohabencia y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

Tipo de gasto	Derechohabiente		No derechohabiente		Total	
	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%
Traslado	14.7	9.5	10.4	7.5	12.6	8.5
Costo de la consulta	98.8	64.1	79.8	57.8	90.8	60.7
Medicamentos	20.0	13.0	27.9	20.2	25.2	16.8
Análisis y estudios de laboratorio	9.3	6.0	12.2	8.8	11.2	7.5
Otros gastos	11.4	7.4	7.9	5.7	9.7	6.5
Gasto total	154.2	100.0	138.1	100.0	149.6	100.0

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.1.4
Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria preventiva por tipo de gasto y cuartil de ingreso

Tipo de gasto	I	II	III	IV	Total
	(de 0 a 1 100)	(de 1 101 a 2 383)	(de 2 384 a 4 549)	(de 4 550 y más)	
Traslado	11.1	11.4	11.6	15.9	12.6
Costo de la consulta	41.2	39.8	71.7	194.0	90.8
Medicamentos	18.2	19.9	22.7	37.9	25.2
Análisis y estudios de laboratorio	6.0	6.4	9.0	21.8	11.2
Otros gastos	9.8	6.0	9.4	13.3	9.7
Total gastos	86.3	83.5	124.4	282.8	149.6

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.1.5
Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria preventiva por tipo de gasto y número de salarios mínimos

Tipo de gasto	Salario mínimo mensual en el hogar						Total
	Menor a 1	de 1 a 1.9	2 a 2.9	3 a 4.9	5 a 9.9	Más de 10	
Traslado	11.1	11.3	11.0	12.2	13.7	22.4	12.6
Costo de la consulta	38.7	39.7	55.7	87.2	140.8	347.0	90.8
Medicamentos	18.4	19.3	20.1	24.0	30.7	61.3	25.2
Análisis y estudios de laboratorio	5.8	6.5	6.8	12.4	16.4	33.8	11.2
Otros gastos	10.5	5.7	4.2	12.3	13.4	16.7	9.7
Total gastos	84.6	82.6	97.8	148.2	215.0	481.4	149.6

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.1.6

Proporción promedio de gastos de bolsillo en la última atención ambulatoria preventiva con respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y cuartil de ingreso

<i>Tipo de gasto</i>	<i>Proporción del ingreso mensual gasto en salud</i>				<i>Total</i>
	<i>I (de 0 a 1 100)</i>	<i>II (de 1 101 a 2 383)</i>	<i>III (de 2 384 a 4 550)</i>	<i>IV (de 4 550 y más)</i>	
Traslado	1.9	0.7	0.4	0.2	0.6
Costo de la consulta	5.1	2.5	2.2	2.0	2.7
Medicamentos	2.8	1.2	0.7	0.4	1.1
Análisis y estudios de laboratorio	0.9	0.4	0.3	0.3	0.4
Otros gastos	1.8	0.3	0.3	0.2	0.5
Gasto total	12.5	5.0	3.8	3.0	5.2

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.1.7

Proporción promedio de gastos de bolsillo en el hogar por la última atención ambulatoria preventiva con respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y número de salarios mínimos

<i>Tipo de gasto</i>	<i>Salario mínimo mensual en el hogar</i>						<i>Total</i>
	<i>Menor a 1</i>	<i>de 1 a 1.9</i>	<i>2 a 2.9</i>	<i>3 a 4.9</i>	<i>5 a 9.9</i>	<i>Más de 10</i>	
Traslado	2.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6
Costo de la consulta	4.9	2.9	2.2	2.3	2.0	1.9	2.7
Medicamentos	3.0	1.3	0.8	0.6	0.4	0.4	1.1
Análisis y estudios de laboratorio	0.9	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4
Otros gastos	2.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.5
Total gastos	12.9	5.7	3.9	3.8	3.1	2.8	5.2

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.1

Promedio de gastos de bolsillo (en pesos) en servicios ambulatorios curativos por utilizador y hogar, según entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia * de utilizadores de servicios curativos</i>	<i>Promedio de gastos por servicios curativos</i>	<i>Frecuencia * de hogares que utilizaron servicios curativos</i>	<i>Promedio de gastos en el hogar por servicios curativos</i>	<i>Promedio de utilizadores de servicios curativos por hogar</i>
Aguascalientes	128.0	195.5	71.4	370.9	1.8
Baja California	290.0	256.4	209.0	363.5	1.4
Baja California Sur	60.9	171.0	43.5	242.1	1.4
Campeche	75.1	132.6	51.8	188.6	1.4
Coahuila	371.6	112.3	242.6	170.0	1.5
Colima	87.5	124.8	55.0	203.0	1.6
Chiapas	517.0	129.6	302.3	198.0	1.7
Chihuahua	427.1	185.3	275.3	299.9	1.6
Distrito Federal	1 482.9	147.0	927.7	227.3	1.6
Durango	251.9	130.0	159.1	201.9	1.6
Guanajuato	631.3	233.7	330.2	403.8	1.9
Guerrero	368.9	131.2	220.8	216.0	1.7
Hidalgo	337.4	169.0	217.7	258.8	1.5
Jalisco	1 175.8	152.3	667.8	266.2	1.8
México	2 219.5	130.7	1 081.8	237.2	2.1
Michoacán	574.4	191.7	331.0	323.1	1.7
Morelos	220.9	137.1	126.1	217.9	1.8
Nayarit	170.4	104.9	102.6	184.5	1.7
Nuevo León	689.3	107.7	449.8	171.1	1.5
Oaxaca	459.5	82.0	282.7	133.0	1.6
Puebla	721.7	151.5	436.2	231.0	1.7
Querétaro	196.6	173.9	114.1	307.6	1.7
Quintana Roo	131.1	187.2	91.6	280.6	1.4
San Luis Potosí	294.8	133.1	170.4	203.0	1.7
Sinaloa	423.8	137.9	267.4	212.8	1.6
Sonora	305.0	140.3	211.2	216.7	1.4
Tabasco	349.0	120.9	207.5	204.1	1.7
Tamaulipas	446.4	166.1	312.4	246.0	1.4
Tlaxcala	124.8	159.8	65.2	285.8	1.9
Veracruz	976.9	118.8	667.0	176.4	1.5
Yucatán	300.0	90.5	197.1	145.7	1.5
Zacatecas	224.1	193.2	110.5	349.1	2.0
Estados Unidos Mexicanos	15 033.7	145.9	8 998.9	235.8	1.7

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.2
Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria curativa por institución que proporcionó el servicio y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

Tipo de gasto	SSA*		IMSS-Solidaridad		IMSS		ISSSTE estatal/ISSSTE		Otras de Seguridad social**		Privadas		Otras		Total	
	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%
Traslado	12.6	9.0	7.3	20.9	19.3	39.2	18.0	33.8	20.1	14.2	22.1	4.3	12.8	7.9	19.5	8.3
Costo de la consulta	29.4	21.0	3.0	8.7	2.7	5.5	1.4	2.6	33.6	23.8	162.2	31.9	34.5	21.2	64.2	27.2
Medicamentos	73.8	52.7	12.2	35.1	6.2	12.6	9.8	18.5	73.8	52.3	252.0	49.5	88.4	54.5	111.3	47.2
Análisis y estudios de laboratorio	10.3	7.3	3.6	10.4	2.4	4.9	7.1	13.3	8.5	6.0	44.6	8.8	14.4	8.9	19.6	8.3
Otros gastos	13.9	10.0	8.7	24.9	18.6	37.8	16.9	31.8	5.3	3.8	28.3	5.6	12.2	7.5	21.2	9.0
Gasto total	140.0	100.0	34.8	100.0	49.2	100.0	53.1	100.0	141.3	100.0	509.2	100.0	162.3	100.0	235.8	100.0

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Sedena, Semar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.3

Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención curativa por condición de derechohabencia y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

Tipo de gasto	Derechohabiente		No derechohabiente		Total	
	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%
Traslado	18.9	12.0	19.5	8.3	19.5	8.3
Costo de la consulta	41.7	26.5	64.1	27.3	64.2	27.2
Medicamentos	61.9	39.4	111.0	47.2	111.3	47.2
Análisis y estudios de laboratorio	14.1	9.0	19.6	8.3	19.6	8.3
Otros gastos	20.5	13.1	21.0	8.9	21.2	9.0
Gasto total	157.1	100.0	235.3	100.0	235.8	100.0

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.4

Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria curativa por tipo de gasto y cuartil de ingreso

Tipo de gasto	I	II	III	IV	Total
	(de 0 a 1 100)	(de 1 101 a 2 383)	(de 2 384 a 4 549)	(de 4 550 y más)	
Traslado	25.0	14.9	18.8	20.0	19.5
Costo de la consulta	50.2	52.6	56.4	90.2	64.2
Medicamentos	96.5	98.3	108.1	139.0	111.3
Análisis y estudios de laboratorio	15.1	15.1	19.7	26.7	19.6
Otros gastos	18.1	23.6	17.6	25.1	21.2
Total gastos	205.0	204.4	220.6	301.1	235.8

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.5

Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria curativa por tipo de gasto y número de salarios mínimos mensuales

Tipo de gasto	Proporción del salario mínimo mensual en el hogar						Total
	Menor a 1	de 1 a 1.9	2 a 2.9	3 a 4.9	5 a 9.9	Más de 10	
Traslado	25.1	15.3	19.2	17.1	21.2	20.3	19.5
Costo de la consulta	50.9	51.2	52.1	58.4	85.1	126.4	64.2
Medicamentos	93.2	97.9	113.1	103.2	133.5	178.1	111.3
Análisis y estudios de laboratorio	14.2	16.0	17.3	22.0	21.4	39.1	19.6
Otros gastos	18.5	15.4	28.8	16.7	22.7	39.8	21.2
Total gastos	201.9	195.9	230.4	217.3	283.9	403.8	235.8

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.6

Proporción promedio de gastos de bolsillo en la última atención curativa con respecto al ingreso mensual del hogar, según tipo de gasto en salud y cuartiles de ingreso

Tipo de gasto	Proporción del ingreso mensual en cuartiles				Total
	I (de 0 a 1 100)	II (de 1 101 a 2 383)	III (de 2 384 a 4 549)	IV (de 4 550 y más)	
Traslado	5.8	0.9	0.6	0.3	1.4
Costo de la consulta	11.0	3.2	1.7	1.1	3.4
Medicamentos	22.7	5.9	3.4	1.8	6.7
Análisis y estudios de laboratorio	2.8	0.9	0.6	0.3	1.0
Otros gastos	2.9	1.3	0.6	0.3	1.1
Gasto total	45.1	12.2	6.9	3.8	13.5

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.2.7

Proporción promedio del gasto de bolsillo en el hogar por la última atención ambulatoria curativa con respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y número de salarios mínimos

Tipo de gasto	Menor a 1	de 1 a 1.9	2 a 2.9	3 a 4.9	5 a 9.9	Más de 10	Total
Traslado	6.3	1.1	0.8	0.4	0.3	0.1	1.4
Costo de la consulta	12.0	3.5	2.1	1.5	1.3	0.8	3.4
Medicamentos	24.3	6.7	4.6	2.6	1.9	1.1	6.6
Análisis y estudios de laboratorio	2.9	1.1	0.7	0.5	0.3	0.3	1.0
Otros gastos	3.1	1.1	1.3	0.4	0.3	0.3	1.1
Total gastos	48.7	13.4	9.4	5.6	4.1	2.6	13.5

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.1
**Promedio de gastos de bolsillo (en pesos) en servicios hospitalarios por
 utilizador y hogar, según entidad federativa**

<i>Entidad federativa</i>	<i>Frecuencia * de utilizadores de servicios hospitalarios</i>	<i>Promedio de gastos por servicios hospitalarios</i>	<i>Frecuencia * de hogares que utilizaron servicios hospitalarios</i>	<i>Promedio de gastos en el hogar por servicios hospitalarios</i>
Aguascalientes	26.5	2 263.5	26.5	2 369.9
Baja California	78.0	2 014.6	71.9	2 288.6
Baja California Sur	16.7	1 520.0	16.5	1 544.2
Campeche	19.5	915.8	18.6	949.9
Coahuila	97.8	1 070.0	89.3	1 193.0
Colima	20.5	1 474.9	20.2	1 773.7
Chiapas	60.0	1 617.1	52.8	1 869.3
Chihuahua	105.6	2 627.2	92.8	2 793.7
Distrito Federal	375.8	2 428.3	332.6	2 587.6
Durango	55.0	1 553.3	50.6	1 818.5
Guanajuato	144.1	3 523.4	125.6	3 983.9
Guerrero	68.1	2 155.5	61.4	2 214.8
Hidalgo	68.9	2 459.9	65.2	2 669.9
Jalisco	264.0	2 718.0	245.5	2 909.4
México	384.9	1 896.1	345.4	1 947.8
Michoacán	89.6	2 693.6	82.9	2 969.8
Morelos	45.8	1 713.9	41.1	1 905.6
Nayarit	34.4	1 031.8	32.1	1 149.9
Nuevo León	190.1	1 672.0	165.2	1 870.5
Oaxaca	70.6	1 051.6	61.9	1 082.2
Puebla	138.0	2 535.5	120.3	2 667.6
Querétaro	41.3	2 293.0	37.0	2 662.4
Quintana Roo	30.0	1 721.0	30.4	1 865.9
San Luis Potosí	56.7	2 386.0	50.9	2 529.0
Sinaloa	84.0	1 672.8	76.2	1 826.4
Sonora	79.5	2 447.8	73.0	2 598.9
Tabasco	60.1	1 398.8	56.1	1 456.8
Tamaulipas	129.5	2 114.5	119.4	2 455.6
Tlaxcala	16.7	2 129.0	15.0	2 296.6
Veracruz	202.7	1 435.7	187.1	1 647.3
Yucatán	52.5	1 109.6	50.2	1 208.8
Zacatecas	39.3	3 234.0	37.7	3 404.9
Estados Unidos Mexicanos	3 146.4	2 105.0	2 851.2	2 279.1

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.2
Promedio de gastos de bolsillo por hogar (en pesos) en la última atención ambulatoria curativa por institución que proporcionó el servicio y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

Tipo de gasto	SSA*		IMSS-Solidaridad		IMSS		ISSSTE estatal/ISSSTE		Otras de Seguridad social		Privadas		Otras		No especificado		Total	
	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%
Gasto por hospitalización	1 085.1	76.9	166.9	51.0	51.3	22.5	408.2	47.5	958.8	88.8	6 526.8	93.6	1 797.8	84.6	1 157.1	85.4	1 976.5	86.7
Otros gastos de hospitalización	326.6	23.1	160.2	49.0	176.6	77.5	450.6	52.5	121.0	11.2	447.1	6.4	327.0	15.4	197.0	14.6	302.7	13.3
Gasto total por hospitalización	1 411.0	100.0	327.1	100.0	227.9	100.0	858.7	100.0	1 079.8	100.0	6 974.0	100.0	2 124.9	100.0	1 354.1	100.0	2 279.1	100.0

*Incluye SSA, DDF, INI, DIFEI institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.3

Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención hospitalaria por condición de derechohabiencia y distribución porcentual del tipo de gasto con respecto al gasto total

Tipo de gasto	Derecho- habiente		No derecho- habiente		No especificado		Total	
	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%	Promedio	%
Gastos por hospitalización	1 313.5	82.7	2 803.5	89.3	1 401.7	83.6	1 976.5	86.7
Otros gastos de hospitalización	274.6	17.3	334.3	10.7	275.3	16.4	302.7	13.3
Gasto total por hospitalización	1 588.1	100.0	3 137.7	100.0	1 677.0	100.0	2 279.1	100.0
Frecuencia*	1 610.9		1 251.2		8.5		2 851.2	

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.4

Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención hospitalaria por tipo de gasto y cuartil de ingreso

	I	II	III	IV	Total
	(de 0 a 1 100)	(de 1 101 a 2 383)	(de 2 384 a 4 549)	(de 4 550 y más)	
Gastos por hospitalización	2 059.1	1 543.0	1 675.6	2 567.0	1 976.5
Otros gastos de hospitalización	288.5	246.5	238.5	371.1	302.7
Gasto total por hospitalización	2 347.7	1 789.5	1 914.1	2 938.0	2 279.1
Frecuencia*	511.9	676.6	789.0	789.0	2 851.2

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.5

Promedio de gastos de bolsillo del hogar (en pesos) en la última atención hospitalaria por tipo de gasto y número de salarios mínimos

<i>Tipo de hospitalización</i>	<i>Salario mínimo mensual en el hogar</i>						<i>Total</i>
	<i>Menor a 1</i>	<i>1 a 1.9</i>	<i>2 a 2.9</i>	<i>3 a 4.9</i>	<i>5 a 9.9</i>	<i>Mayor a 10</i>	
Gasto por hospitalización	2 128.0	1 456.8	1 684.6	1 730.4	2 097.8	4 185.2	1 976.5
Otros gastos en hospitalización	298.2	217.6	253.2	247.2	390.4	440.5	302.7
Total de gastos en hospitalización	2 426.2	1 674.4	1 937.7	1 977.6	2 488.2	4 625.7	2 279.1

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.6

Proporción promedio de gastos de bolsillo en la última atención hospitalaria con respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y cuartiles de ingreso

	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>Total</i>
	<i>(de 0 a 1 100)</i>	<i>(de 1 101 a 2 383)</i>	<i>(de 2 384 a 4 549)</i>	<i>(de 4 550 y más)</i>	
Gasto por hospitalización	3.7	0.9	0.5	0.3	0.9
Otros gastos en hospitalización	0.8	0.1	0.1	0.0	0.2
Total de gastos en hospitalización	4.5	1.1	0.6	0.3	1.1

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 10.3.7

Proporción promedio de gastos de bolsillo en el hogar por la última atención hospitalaria con respecto al ingreso mensual, según tipo de gasto y número de salarios mínimos

<i>Total de gasto de hospitalización</i>	<i>Salario mínimo mensual en el hogar</i>						<i>Total</i>
	<i>Menor a 1</i>	<i>1 a 1.9</i>	<i>2 a 2.9</i>	<i>3 a 4.9</i>	<i>5 a 9.9</i>	<i>Mayor a 10</i>	
Gasto por hospitalización	4.2	1.0	0.7	0.4	0.3	0.3	0.9
Otros gastos en hospitalización	0.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2
Total de gastos en hospitalización	5.1	1.2	0.8	0.5	0.4	0.3	1.1

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Percepción de la calidad de los servicios de salud

C O N T E N I D O

Servicios preventivos

- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad de la última atención recibida, por entidad federativa.
- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad de la última atención e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses, según institución que la proporcionó y el resultado de la última atención.
- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses que declararon que la calidad de la última atención fue buena y muy buena, según motivo de la buena calidad e institución a la que pertenece quien lo atendió.
- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses que declararon que la calidad de la última atención en general fue regular, mala y muy mala, según motivo de la mala calidad e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses según motivo por el que no regresaría, e institución que proporcionó la última atención.
- Utilizadores de servicios preventivos en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad del servicio y tiempo de espera para recibir la atención.

Servicios curativos

- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad de la última atención recibida, por entidad federativa.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad de la última atención e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según institución que la proporcionó y el resultado de la última atención.

- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses que declaró que la calidad de la última atención fue buena y muy buena, según motivo de la buena calidad e institución a la que pertenece quien lo atendió.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses que declaró que la calidad de la última atención en general fue regular, mala y muy mala, según motivo de la mala calidad e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según motivo por el que no regresaría, e institución que proporcionó la última atención.
- Utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad del servicio y tiempo de espera para recibir la atención.

Servicios hospitalarios

- Población usuaria de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad de la última atención, por entidad federativa.
- Utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según percepción de la calidad de la última atención e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses que declararon que la última atención fue buena y muy buena, según motivo e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios hospitalarios que declararon que la calidad de la última atención fue regular, mala o muy mala, según motivo e institución que proporcionó el servicio.
- Utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos 12 meses, según motivo por el que no regresaría, e institución que proporcionó la atención.

Percepción de la calidad de los servicios de salud

Servicios preventivos

- De los 18.7 millones de personas que utilizaron servicios preventivos, 16.5 millones (88.2%) consideran que el servicio recibido es bueno o muy bueno, 1.7 millones (9.4%) que es regular y 329 mil (1.8%) usuarios consideran que es malo o muy malo.
- Las entidades federativas que concentran la mayor frecuencia de muy buena percepción del servicio son: Nuevo León (23%), Sonora (22%), Baja California Sur (22%), Chihuahua (20%) y Guanajuato (20%).
- Las entidades federativas que concentran la mayor frecuencia de mala y muy mala percepción del servicio son: Estado de México (3.8%), Baja California Sur (3.5%), Querétaro (3.4%), Distrito Federal (2.6%) y Tabasco (2.6%). Llama la atención que Baja California Sur aparece en los primeros lugares en ambas categorías.
- De los 16.5 millones de personas que recibieron atención preventiva y tienen una percepción buena o muy buena se distribuye por institución de la siguiente manera: SSA (8.7 millones), IMSS (3.1 millones), servicios privados (2.6 millones), IMSS-Solidaridad (1.1 millones) e ISSSTE (362 mil).
- La proporción de la población que utiliza servicios preventivos, y que tiene una buena percepción de los servicios, se distribuye por institución de la siguiente manera: servicios privados (95.5%), SSA (91.3%), IMSS-Solidaridad (88.4%), ISSSTE (78.2%) e IMSS (78.2%).
- La proporción de la población que utiliza servicios preventivos y que tiene una mala o muy mala percepción de los servicios se distribuye por institución de la siguiente manera: ISSSTE (4.6%), IMSS (3.8%), IMSS-Solidaridad (2.1%), SSA (1.0%) y servicios privados (0.8%).
- Los principales motivos referidos por la población para percibir una buena atención preventiva fueron: el buen trato del personal (42%), atención adecuada (26%), buena preparación del personal (13%), tiempo de espera corto (12%), mejoría de salud (8%) y confianza en el personal (7%).

- Los 2.1 millones de personas que recibieron atención preventiva y que tienen una percepción regular o mala del servicio recibido, se distribuyen por institución de la siguiente manera: IMSS (839 mil), SSA (788 mil), servicios privados (168 mil), IMSS-Solidaridad (141 mil) e ISSSTE (99 mil).
- Los principales motivos para percibir una atención preventiva regular o mala fueron los siguientes: espera prolongada (29.4%), no lo atendieron de acuerdo con sus expectativas (22.2%), mal trato (19.7%), mal preparación del médico (8.9%) y material insuficiente (8.6%).
- Los 1.2 millones de personas que, recibieron atención preventiva no regresarían a la misma institución. La contribución de cada una de las instituciones, es la siguiente: IMSS (430 mil), SSA (399 mil), servicios privados (185 mil) e ISSSTE (67 mil).
- Los principales motivos por los que no regresaría a la misma institución fueron: mal trato (23.6%), tiempo de espera prolongado (22.2%), no están de acuerdo con el servicio (8.9%), servicio caro (5.9%) y no había medicamentos o materiales (5%).
- Se observa en general una asociación positiva entre buena percepción de la calidad de los servicios preventivos recibidos con tiempos de espera reducidos.

Servicios curativos

- De los 16.4 millones de personas que utilizaron servicios curativos ambulatorios, 13.5 millones percibieron que los servicios recibidos son muy buenos o buenos, 2.4 millones opinan que es regular y 427 mil que es mala o muy mala.
- Las entidades federativas que concentran la mayor frecuencia de percepción calificada como muy buena de los servicios ambulatorios curativos son: Sonora (23.4%), Chihuahua (22.7%), Baja California Sur (22.0%), Baja California (18.9%) y Nuevo León (18.7%).

- Las entidades federativas que concentran la mayor frecuencia de mala o muy mala percepción de los servicios curativos son: Distrito Federal (5.4%), Baja California Sur (3.8%), Estado de México (3.7%), Nuevo León (3.1%) y Tabasco (3.1%).
- La proporción de la población que utilizan servicios ambulatorios curativos y tienen una buena percepción se distribuye por institución de la manera siguiente: privados (91%), SSA (87%), IMSS-Solidaridad (79%), ISSSTE (71%) e IMSS (68%).
- La proporción de la población que utiliza servicios ambulatorios curativos y tiene una percepción regular o mala, se distribuye por institución de la manera siguiente: IMSS (31.2%), ISSSTE (29%), IMSS-Solidaridad (21%), SSA (13%) y servicios privados (8%).
- De los 16.4 millones de personas que solicitaron atención curativa, 13.7 millones (83.6%) consideran que mejoraron. Esta proporción por institución se distribuye de la siguiente manera: servicios privados (89.2%), SSA (82.7%), IMSS-Solidaridad (82.1%), ISSSTE (80.8%) e IMSS (76.9%).
- Los 13.5 millones de personas que percibieron servicios curativos ambulatorios buenos o muy buenos, se distribuyen por institución de la manera siguiente: privados (4.6 millones), SSA (4.1 millones), IMSS (2.9 millones), ISSSTE (557 mil) e IMSS-Solidaridad (518 mil).
- Los cinco principales motivos de satisfacción por los servicios recibidos fueron: mejoría de la salud (34.3%), buen trato (30.8%), atención acorde con las expectativas (20.8%), preparación del personal (10.8%) y adecuada revisión (10.3%).
- Los 2.8 millones de personas que recibieron atención curativa ambulatoria y no tuvieron adecuada percepción de la atención se distribuyen de la manera siguiente: IMSS (1.3 millones), SSA (617 mil), servicios privados (403 mil), ISSSTE (225 mil) e IMSS-Solidaridad (139 mil).
- Los cinco principales motivos por los que tienen una mala percepción de los servicios curativos ambulatorios fueron: espera prolongada (30.7%), medicamentos ineficaces (21.8%), la atención no fue la esperada (17.6%), mal trato (15.5%) y revisión inadecuada (11.5%).

- Los 1.7 millones de personas que recibieron atención ambulatoria curativa no regresarían a la misma institución. Su distribución fue de la manera siguiente: IMSS (751 mil), servicios privados (376 mil), SSA (322 mil), ISSSTE (132 mil) e IMSS-Solidaridad (70 mil).
- Los cinco principales motivos para no regresar a la misma institución fueron: espera prolongada (18.9%), mal trato (14.8%), desacuerdo con el tratamiento (11.6%), medicamentos ineficaces (7.8%) y desacuerdo con el diagnóstico (7.2%).

Servicios hospitalarios

- De los 3.4 millones de personas hospitalizadas en los últimos 12 meses, 2.9 millones (83.4%) estuvieron satisfechos con el servicio recibido, 397 mil (11.5%) lo consideraron regular y 143 mil (4.1%) lo consideraron como malo o muy malo.
- Las cinco entidades federativas con la mayor proporción de muy buena percepción de los servicios hospitalarios son: Sonora (35.7%), Baja California Sur (32.3%), Aguascalientes (30.6%), Jalisco (30.2%) y Chihuahua (30.2%).
- Las cinco entidades federativas con la mayor proporción de población con mala percepción de los servicios hospitalarios recibidos son los siguientes: Puebla (8.4%), Distrito Federal (7.3%), Quintana Roo (6.9%), Michoacán (5.6%) y Tabasco (5.3%).
- Los servicios privados fueron los mejores calificados, seguidos por la SSA; en cambio los pacientes percibieron una menor calidad en el IMSS y el ISSSTE.
- Los cinco principales motivos de buena atención hospitalaria fueron: buen trato (61.4%), mejoría en la salud (37.2%), buen tratamiento (31.3%), buena preparación del personal (22.8%) y suficiencia en medicamentos y otros materiales (14.8%).
- Los cinco principales motivos de atención regular o mala fueron: atención menor a la esperada (52.1%), mal trato (42.6%), medicamentos y material insuficiente (15.5%), falta de mejoría (12.4%) y personal inexperto (11.9%).

Figura 11.1.1
Distribución porcentual de los utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención recibida, por entidad federativa





Figura 11.1.2
Distribución porcentual de utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención e institución que proporcionó el servicio






Figura 11.1.3
Distribución de usuarios de servicios preventivos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención fue buena y muy buena, según motivo de buena calidad e institución a la que pertenece quien lo atendió

N* = 16 479
 N* = Frecuencia ponderada en miles
 * Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil
 ** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 11.1.4
Distribución de usuarios de servicios preventivos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención fue regular, mala y muy mala, según motivo de la mala calidad e institución que proporcionó el servicio

N* = 2 087
 N* = Frecuencia ponderada en miles
 * Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil
 ** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 11.1.5
Distribución porcentual de utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses, según motivo por el que no regresaría a la institución que proporcionó la última atención



N* = 1 169


N* = frecuencia ponderante en miles

* Incluye SSA-DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 11.2.1
Distribución porcentual de los utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, según percepción de buena calidad en la última atención recibida, por entidad federativa



N* = 16 390

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 11.2.2
Distribución porcentual de utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención e institución que proporcionó el servicio

N* = 16 390
 N* = Frecuencia ponderada en miles
 * Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil
 ** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 11.2.3
Distribución porcentual de utilizadores de servicios ambulatorios curativos en los últimos doce meses, según institución que la proporcionó y el resultado de la última atención

N* = 16 390
 N* = Frecuencia ponderada en miles
 * Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil
 ** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 11.2.4
Distribución de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención fue buena y muy buena, según motivo de buena calidad e institución a la que pertenece quien lo atendió



N* = 13 490


N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 11.2.5
Distribución de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención en general fue regular, mala y muy mala, según motivo e institución a la que pertenece quien lo atendió



N* = 2 822

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 11.2.6
Distribución porcentual de usuarios de servicios curativos en los últimos doce meses, según motivo por el que no regresaría a la institución que proporcionó la última atención

N* = 1 732

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000





Figura 11.3.1
Distribución porcentual de la población usuaria de servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según percepción de buena calidad en la última atención, por entidad federativa

N* = 3 454

N* = Frecuencia ponderada en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 11.3.2
**Distribución porcentual de
 utilizadores de servicios
 hospitalarios en los últimos
 doce meses, según
 percepción de la calidad
 en la última atención
 e institución que
 proporcionó el servicio**



N* = 3 454


N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Figura 11.3.3
Distribución de utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos doce meses que declaró que la última atención fue buena y muy buena, según motivo e institución que proporcionó el servicio



N* = 2 881

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 11.3.4
Distribución de utilizadores de servicios hospitalarios que declaró que la calidad de la última atención fue regular, mala o muy mala, según motivo e institución que proporcionó el servicio

N* = 540

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000




Figura 11.3.5
Distribución de utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según motivo por el que no regresaría a la institución que le proporcionó la atención

N* = 746

N* = Frecuencia ponderada en miles

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Semar y Sedena

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios de salud. México, 2000

Cuadro 11.1.1

Distribución porcentual de los utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención por entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Muy buena</i>	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala y muy mala</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Aguascalientes	17.2	69.5	8.6	1.4	3.3	100
Baja California	18.3	70.4	9.0	2.3	0.0	100
Baja California Sur	22.0	66.1	8.1	3.5	0.2	100
Campeche	6.6	80.9	11.3	1.0	0.1	100
Coahuila	16.9	74.1	7.8	0.9	0.3	100
Colima	12.5	79.2	7.0	0.8	0.5	100
Chiapas	2.6	90.4	5.6	0.9	0.5	100
Chihuahua	20.2	71.7	7.1	0.6	0.4	100
Distrito Federal	16.8	68.9	10.3	2.6	1.4	100
Durango	9.8	80.4	8.5	1.0	0.3	100
Guanajuato	19.9	67.9	10.1	1.2	0.9	100
Guerrero	5.5	87.6	4.6	2.1	0.1	100
Hidalgo	9.3	83.1	6.6	0.6	0.4	100
Jalisco	15.8	72.8	8.9	1.8	0.7	100
México	13.7	68.5	13.0	3.8	1.0	100
Michoacán	7.0	82.9	8.4	1.3	0.4	100
Morelos	15.8	70.3	11.9	1.3	0.7	100
Nayarit	11.6	80.3	6.7	1.2	0.2	100
Nuevo León	22.6	65.3	9.4	1.8	0.9	100
Oaxaca	7.0	85.6	6.2	1.0	0.2	100
Puebla	6.0	82.2	10.6	1.1	0.1	100
Querétaro	11.0	70.9	13.6	3.4	1.1	100
Quintana Roo	7.5	78.7	11.6	1.9	0.3	100
San Luis Potosí	13.0	73.4	11.6	1.7	0.3	100
Sinaloa	15.1	77.3	6.5	1.0	0.1	100
Sonora	22.1	70.3	6.3	0.6	0.7	100
Tabasco	8.6	76.3	12.1	2.6	0.4	100
Tamaulipas	12.2	78.8	7.6	1.1	0.3	100
Tlaxcala	8.4	73.9	14.8	1.1	1.8	100
Veracruz	7.1	83.2	8.2	1.2	0.3	100
Yucatán	7.7	76.7	13.8	1.8	0.0	100
Zacatecas	14.8	73.6	9.3	1.8	0.5	100
Estados Unidos Mexicanos	12.5	75.7	9.4	1.8	0.6	100
Frecuencia*	2 340.6	14 138.3	1 758.3	328.6	114.1	18 679.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.1.2

Distribución porcentual de utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención e institución que proporcionó el servicio

<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>	<i>Muy buena</i>	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala y muy mala</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Secretarías de Salud estatales y otras gubernamentales de población abierta*	10.4	80.9	7.2	1.0	0.5	100
IMSS Solidaridad	4.8	83.6	9.3	2.1	0.2	100
IMSS	9.2	69.0	17.4	3.8	0.6	100
ISSSTE estatal/ISSSTE	13.7	64.5	16.9	4.6	0.3	100
Otras de seguridad social**	22.6	67.0	9.2	1.2	0.0	100
Privadas	26.4	67.1	5.2	0.8	0.5	100
Otras	18.9	71.2	5.4	2.7	1.8	100
No especificado	13.5	72.4	5.2	0.7	8.2	100
Total	12.5	75.7	9.4	1.8	0.6	100
Frecuencia***	2 340.6	14 138.3	1 758.3	328.6	114.1	18 679.9

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.1.3
Distribución de utilizadores de servicios ambulatorios preventivos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención fue buena y muy buena, según motivo de buena calidad e institución a la que pertenece quien lo atendió

Motivo de buena calidad en general	SSA*	IMSS		IMSS Solidaridad	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social**			Total
		Privadas	Otras			No especificado			
El personal lo trato bien /es amable / cortés	44.8	44.6	40.8	44.9	32.0	32.3	32.8	31.7	41.6
Lo atendieron como debe ser / como esperaba	24.8	33.0	26.9	20.9	26.0	25.7	25.8	30.3	2
Personal bien preparado	12.2	8.4	13.1	11.3	21.7	17.1	14.2	12.8	13.0
Tiempo de espera corto	11.7	10.1	12.4	11.1	14.9	12.0	12.9	16.0	11.8
Buenos resultados en su salud	8.8	6.5	6.8	8.1	11.2	15.7	8.9	11.2	8.4
Le tiene confianza al personal	6.6	6.8	5.2	4.7	10.6	10.6	6.3	6.2	7.0
Lo revisaron bien	5.1	2.2	7.9	9.0	5.4	7.2	5.3	4.0	5.9
Es barato	5.4	4.5	2.9	2.5	0.1	2.5	2.4	4.6	4.2
La curación o tratamiento estuvo bien	3.2	1.4	4.8	4.9	4.1	7.1	5.3	4.1	4.1
Medicamentos / materiales y equipo suficientes / limpio	3.0	1.4	4.8	7.2	8.8	7.2	5.0	0.8	4.0
Le explicaron bien lo que tiene o cómo usar las medicinas	2.5	4.1	4.0	3.4	4.4	4.6	3.8	1.1	3.3
Le dedicaron suficiente tiempo en la consulta	2.1	1.4	2.9	3.3	4.6	5.5	2.3	1.5	2.8
Buen horario / dan servicio cuando se necesita	2.7	3.9	3.3	2.3	1.7	2.2	2.8	1.1	2.8
Conoce al personal de hace tiempo	1.6	1.8	1.7	2.7	3.2	5.8	1.4	1.9	2.3
Otro	2.9	5.5	2.8	1.2	0.9	1.6	10.6	4.4	2.9
Total***	137.3	135.5	140.1	137.3	149.6	157.1	139.8	131.6	139.9
	8 728.7	1 096.8	3 097.4	361.9	158.8	2 625.7	227.9	181.9	16 479.0

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100.0% debido a que incluyen más de un motivo de buena calidad de la atención

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.1.4
Distribución de utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención fue regular, mala y muy mala, según motivo de la mala calidad e institución que proporcionó el servicio

Motivo de mala calidad de la atención	SSA**	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social***	Privadas	Otras	No especificado	Total
Esperó mucho	25.8	35.2	33.2	42.0	18.5	17.3	27.8	16.5	29.4
No lo atendieron como esperaba	22.5	22.7	21.6	26.9	32.8	20.2	30.8	0.0	22.2
Lo trataron mal	17.1	18.6	24.6	19.3	22.3	8.8	22.4	0.8	19.7
El médico está mal preparado	7.3	5.7	10.2	4.3	19.1	14.1	4.5	1.7	8.9
Material insuficiente o de mala calidad	11.1	7.2	7.0	9.3	6.6	6.5	6.1	14.0	8.6
No lo revisaron	6.9	4.4	9.3	5.8	14.7	11.3	6.6	12.7	8.1
No le sirvieron los medicamentos	5.6	7.5	6.8	6.5	4.5	15.5	3.8	33.8	7.5
La consulta fue apresurada	7.2	5.6	7.2	6.6	7.0	5.8	5.2	0.0	6.9
No le conviene el horario / no atienden cuando se necesita	7.4	9.0	5.8	7.5	1.5	3.2	3.6	1.7	6.4
Le tiene desconfianza	4.6	0.8	5.5	5.4	0.0	2.8	0.0	5.2	4.5
No le explicó/no le dijo que tenía	3.6	11.6	3.9	1.8	0.0	7.2	7.3	3.0	4.4
Lo lastimaron / lo curaron o inyectaron mal	4.6	3.1	3.5	0.7	5.3	4.9	0.7	6.0	3.9
Le cambian de médico	2.0	3.4	2.1	1.2	5.7	3.6	0.0	5.2	2.3
Es caro	0.7	0.1	0.6	0.0	4.1	10.0	0.0	0.0	1.3
Otro	8.5	15.2	5.9	5.3	0.0	12.0	18.2	18.9	8.1
Total*	134.8	149.8	147.2	142.6	142.1	143.1	137.0	119.5	142.3
Frecuencia***	788.2	141.1	839.1	99.4	18.4	167.9	20.3	12.5	2 086.9

* Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100.0% debido a que incluyen más de un motivo de regular, mala y muy mala calidad de la atención

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Sedena, Semar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.1.5
Distribución porcentual de utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses según motivo por el que no regresaría e institución que proporcionó la última atención

Motivo por el que no regresaría	SSA*	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social**	Privadas	Otras	No especificado	Total
Lo trataron mal	23.0	24.7	28.2	34.0	35.5	10.2	26.0	22.0	23.6
Lo hicieron esperar mucho	16.6	24.5	31.4	41.7	1.4	8.0	16.7	8.5	22.2
En desacuerdo con el servicio	9.5	8.4	7.1	2.4	3.6	12.5	24.7	21.0	8.9
Servicio caro	3.7	1.2	0.0	0.3	1.5	28.0	8.4	0.0	5.9
No había medicamentos / materiales	7.5	7.8	3.8	6.0	0.0	1.3	2.0	0.0	5.0
En desacuerdo con Diagnóstico	5.4	0.2	4.9	1.5	15.4	4.0	0.0	0.0	4.8
Estaba lejos	4.8	9.6	1.5	1.4	0.0	3.0	0.0	28.3	3.1
No le sirve el medicamento	1.9	0.8	2.8	1.0	0.0	6.8	0.0	5.1	2.9
No se curó	1.2	1.6	1.0	0.2	0.0	1.8	0.0	6.1	1.2
Lo refirieron a otro lado	0.9	0.2	2.0	0.0	0.0	2.2	4.3	0.0	1.5
Generalmente cerrado	2.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.8
Otro	15.5	9.8	12.1	8.2	28.5	19.0	17.9	5.5	14.2
No especificado	8.0	11.0	5.1	3.3	14.1	3.0	0.0	3.5	5.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Frecuencia***	399.0	52.3	430.0	66.6	8.1	185.3	15.1	12.6	1 169.0

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Sedena, Semar

*** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.1.6

Distribución porcentual de utilizadores de servicios preventivos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad del servicio y tiempo de espera para recibir la atención

<i>Percepción de la calidad en general</i>	<i>0 a 15 min</i>	<i>16 a 30 min</i>	<i>31 a 60 min</i>	<i>61 a 90 min</i>	<i>91 min o más</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Muy bueno	63.3	17.5	8.9	1.7	6.0	2.6	100
Bueno	59.6	19.1	9.8	1.7	7.9	1.9	100
Regular	36.0	20.6	14.5	4.9	22.5	1.5	100
Malo	30.6	15.1	19.7	4.6	29.6	0.4	100
No especificado	38.4	9.2	5.4	7.2	3.1	36.7	100
Total	57.2	18.9	10.3	2.1	9.4	2.1	100
Frecuencia*	10 697.2	3 536.0	1 915.7	390.5	1 748.3	392.3	18 679.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.1
Distribución porcentual de los utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad de la última atención por entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Muy buena</i>	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala y muy mala</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Aguascalientes	17.4	67.1	12.2	2.6	0.7	100
Baja California	18.9	65.9	12.0	2.6	0.6	100
Baja California Sur	22.3	62.4	11.4	3.8	0.1	100
Campeche	11.3	71.0	15.1	2.3	0.3	100
Coahuila	17.5	64.7	14.7	2.7	0.4	100
Colima	13.5	73.0	10.8	2.3	0.4	100
Chiapas	3.7	82.5	11.4	2.4	0.0	100
Chihuahua	22.7	64.7	10.2	2.0	0.4	100
Distrito Federal	14.2	63.7	15.9	5.4	0.8	100
Durango	9.6	73.3	14.7	1.5	0.9	100
Guanajuato	17.3	65.3	14.9	1.9	0.6	100
Guerrero	6.5	81.9	8.8	2.5	0.3	100
Hidalgo	8.0	77.3	13.3	0.7	0.7	100
Jalisco	17.2	65.4	14.8	1.6	1.0	100
México	12.6	66.4	16.9	3.7	0.4	100
Michoacán	8.8	76.0	13.2	1.6	0.5	100
Morelos	13.9	63.9	19.5	2.5	0.2	100
Nayarit	12.0	72.9	12.3	2.4	0.4	100
Nuevo León	18.7	67.3	10.6	3.1	0.3	100
Oaxaca	8.9	80.2	9.3	1.1	0.5	100
Puebla	7.6	73.1	16.9	2.2	0.2	100
Querétaro	16.3	60.7	19.3	3.0	0.7	100
Quintana Roo	9.6	70.5	17.1	2.4	0.4	100
San Luis Potosí	13.3	69.8	14.6	1.9	0.5	100
Sinaloa	17.4	69.4	11.6	1.4	0.2	100
Sonora	23.4	64.6	10.3	1.4	0.3	100
Tabasco	9.5	70.0	16.8	3.1	0.6	100
Tamaulipas	16.7	67.3	13.2	2.6	0.2	100
Tlaxcala	11.1	70.9	16.4	1.2	0.4	100
Veracruz	9.5	70.0	18.3	1.5	0.7	100
Yucatán	9.2	71.6	17.3	1.9	0.0	100
Zacatecas	12.4	70.3	15.2	1.9	0.2	100
Estados Unidos Mexicanos	13.3	69.0	14.6	2.6	0.5	100
Frecuencia*	2 176.7	11 310.9	2 394.9	427.5	80.3	16 390.3

* Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.2

Distribución porcentual de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención e institución que proporcionó el servicio

<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>	<i>Muy buena</i>	<i>Buena</i>	<i>Regular</i>	<i>Mala y muy mala</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
SSA*	10.4	76.4	11.4	1.5	0.3	100
IMSS Solidaridad	8.4	70.3	17.5	3.5	0.3	100
IMSS	9.2	59.2	25.4	5.8	0.4	100
ISSSTE estatal/ISSSTE	9.9	61.1	23.8	4.9	0.3	100
Otras de seguridad social**	14.9	68.0	15.4	1.6	0.1	100
Privadas	20.4	71.1	7.3	0.6	0.6	100
Otras	14.4	72.8	9.9	1.2	1.7	100
No especificado	9.4	70.3	12.2	1.6	6.5	100
Total	13.3	69.0	14.6	2.6	0.5	100
Frecuencia***	2 176.7	11 310.9	2 394.9	427.5	80.3	16 390.3

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.3

Distribución porcentual de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses, según institución que la proporcionó y el resultado de la última atención

<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>	<i>Mejóro mucho</i>	<i>Mejóro</i>	<i>No cambió</i>	<i>Empeoró</i>	<i>Empeoró mucho</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
SSA*	6.1	76.6	16.3	0.6	0.0	0.4	100
IMSS Solidaridad	4.8	77.3	16.7	0.9	0.0	0.3	100
IMSS	5.2	73.7	19.9	0.8	0.0	0.4	100
ISSSTE estatal/ISSSTE	7.0	73.8	18.2	0.5	0.0	0.5	100
Otras de seguridad social**	6.9	75.9	15.7	0.9	0.2	0.4	100
Privadas	9.7	79.5	9.8	0.7	0.0	0.3	100
Otras	11.6	72.9	14.5	0.2	0.0	0.8	100
No especificado	11.5	66.8	16.9	0.0	0.0	4.8	100
Total	7.2	76.4	15.3	0.7	0.0	0.4	100
Frecuencia***	1 177.6	12 529.4	2 501.6	109.2	5.9	66.7	16 390.3

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.4
Distribución de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención fue buena y muy buena, según motivo de buena calidad e institución a la que pertenece quien lo atendió

Motivo de buena calidad en general	SSA*	IMSS		IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social**		Privadas	Otras	No especificado	Total
Buenos resultados en su salud / se curó	32.3	38.5	26.3	27.8	39.0	41.3	30.9	36.4	34.3			
El personal lo trató bien	34.5	27.7	33.5	32.6	32.6	26.3	27.0	25.5	30.8			
Lo atendieron como esperaba	20.7	22.1	24.6	22.2	23.1	18.1	19.4	25.9	20.8			
Personal bien preparado	9.5	9.6	11.2	10.9	15.3	12.1	8.2	6.4	10.8			
Lo revisaron bien	9.9	4.6	12.0	11.6	4.4	10.3	11.8	8.8	10.3			
La curación o tratamiento estuvo bien	6.7	8.1	8.4	10.5	8.1	9.8	10.4	7.8	8.5			
Tiempo de espera corto	7.5	9.1	7.3	6.9	13.8	8.7	8.7	9.2	8.1			
Le tiene confianza al personal	5.1	5.1	4.2	6.3	4.2	9.3	7.8	6.4	6.5			
Le explicaron bien lo que tiene o cómo usar las medicinas	6.0	7.2	5.5	4.1	5.0	5.8	5.7	7.9	5.8			
Medicamentos / materiales y equipo suficientes	3.8	4.7	5.5	8.6	5.6	4.2	11.1	3.5	4.8			
Es barato	6.2	3.3	2.3	1.9	1.3	3.0	4.2	8.3	3.8			
Le dedicaron suficiente tiempo en la consulta	3.2	1.9	3.9	3.3	4.7	3.7	4.8	1.6	3.5			
Conoce al personal de hace tiempo	2.0	1.8	2.6	3.0	2.6	4.8	1.4	1.7	3.1			
Buen horario / dan servicio cuando se necesita	2.7	2.6	1.8	2.2	1.1	1.5	1.4	6.3	2.0			
Otro	1.9	3.2	1.4	1.4	1.1	0.9	3.7	0.0	1.5			
Total***	151.8	149.3	150.6	153.4	161.9	159.8	156.4	155.6	154.6			
Frecuencia****	4 140.7	517.9	2 898.0	556.9	212.1	4 656.9	425.4	79.7	13 490.0			

*Incluye SSA, DDFI NI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100.0% debido a que se consideraron hasta tres motivos de buena calidad de la atención

****Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.5
Distribución de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses que declaró que la calidad de la última atención en general fue regular, mala y muy mala, según motivo de la mala calidad e institución que proporcionó el servicio

Motivo de mala calidad de la atención	SSA**	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social***	Privadas	Otras	No especificado	Total
Esperó mucho	31.0	39.3	37.0	30.1	30.2	9.1	14.6	28.3	30.7
No le sirvió la medicina/los medicamentos no le aliviaron	20.6	21.7	17.9	23.8	23.3	32.0	40.1	31.8	21.8
No lo atendieron como esperaba	17.3	15.5	17.5	22.5	32.6	15.5	13.4	20.0	17.6
Lo trataron mal/fue grosero	14.7	23.3	19.4	12.6	6.2	4.4	11.6	16.3	15.5
No lo revisaron/ no lo checaron	7.6	12.2	13.8	10.0	11.5	11.3	10.4	6.7	11.5
Material/medicinas o equipo insuficiente o son de mala calidad, sucio	11.8	6.4	9.3	14.3	20.8	2.3	10.2	4.0	9.3
La consulta fue muy corta o apresurada	9.8	6.3	7.9	9.2	0.4	7.3	0.2	0.0	7.9
El médico está mal preparado	5.5	6.3	8.6	7.2	3.8	10.4	3.3	13.0	7.8
No le conviene el horario/no atienden cuando se necesita	6.3	5.6	5.1	4.2	0.0	3.7	19.4	12.9	5.3
No le explicó/ho le dijo que tenía	4.1	2.3	6.0	6.2	5.3	5.4	5.3	0.0	5.3
Le cambian de médico	4.9	3.5	4.9	7.1	4.8	2.4	0.5	4.2	4.5
Le tiene desconfianza	2.7	1.1	3.8	3.4	5.7	3.5	4.6	5.4	3.4
Es caro	1.7	1.2	0.4	0.0	0.2	10.8	5.2	3.5	2.3
Lo lastimaron/lo curaron o inyectaron mal	0.4	0.7	0.4	0.1	0.0	2.0	6.5	0.0	0.7
Otro	6.1	7.1	5.1	7.4	1.1	6.1	2.4	3.5	5.6
Total*	144.5	152.6	157.1	157.9	145.8	126.0	147.6	149.6	149.2
Frecuencia****	617.7	138.6	1 327.5	224.6	43.3	402.8	54.1	13.8	2 822.4

*Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100.0% debido a que se consideraron hasta tres motivos de regular, mala y muy mala calidad de atención

**Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

***Incluye Pemex, Sedena, Semar

****Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.6

Distribución porcentual de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses, según motivo por el que no regresaría e institución que proporcionó la última atención

Motivo por el que no regresaría	SSA*	IMSS Solidaridad	IMSS	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social**	Privadas	Otras	No especificado	Total
Lo hicieron esperar mucho	12.9	21.8	29.9	25.9	3.0	2.3	2.7	6.1	18.9	
Lo trataron mal	7.4	18.1	22.0	19.3	18.2	4.3	17.3	11.2	14.8	
En desacuerdo con el tratamiento	10.2	12.6	9.8	6.1	11.6	17.7	15.4	2.0	11.6	
No le sirve el medicamento	8.7	6.2	6.3	8.8	3.8	9.0	9.7	29.1	7.8	
En desacuerdo con el diagnóstico	9.6	3.1	7.7	5.1	1.8	6.8	2.5	0.8	7.2	
Servicio caro	3.7	0.0	0.1	0.1	0.3	27.8	12.9	8.7	7.2	
No había medicamentos / materiales	10.6	12.7	5.8	11.8	4.2	1.4	6.2	4.0	6.4	
No se curó	5.9	11.0	3.9	1.9	16.0	11.4	4.6	9.4	6.2	
Estaba lejos	4.0	3.8	1.5	1.2	0.8	4.9	0.4	3.7	2.7	
Lo refirieron a otro lado	3.1	0.3	0.1	0.8	0.0	1.1	2.9	0.0	1.0	
Generalmente cerrado	2.8	0.0	0.1	0.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	
Otro	12.2	5.7	8.7	10.9	40.3	7.3	19.0	13.7	9.8	
No especificado	8.9	4.6	4.0	7.8	0.0	5.2	6.4	11.4	5.6	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Frecuencia***	322.3	69.9	751.3	132.4	21.2	375.7	48.0	11.1	1 731.9	

* Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

** Incluye Pemex, Sedena, Semar

*** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.2.7

Distribución porcentual de utilizadores de servicios curativos en los últimos doce meses, según percepción de la calidad del servicio y tiempo de espera para recibir la atención

<i>Percepción de la calidad en general</i>	<i>0 a 15 min</i>	<i>16 a 30 min</i>	<i>31 a 60 min</i>	<i>61 a 90 min</i>	<i>91 min o más</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Muy bueno	57.4	18.6	10.4	2.5	9.2	1.9	100
Bueno	44.0	22.1	13.6	3.4	15.0	1.9	100
Regular	20.9	18.4	15.4	7.2	35.8	2.3	100
Malo	17.5	11.2	16.2	4.2	49.0	1.9	100
No especificado	27.8	22.1	6.5	1.3	9.2	33.1	100
Total	41.6	20.9	13.4	3.9	18.1	2.1	100
Frecuencia*	6 817.6	3 419.0	2 204.2	634.4	2 974.1	341.0	16 390.3

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.3.1

Distribución porcentual de utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según percepción de la calidad en la última atención por entidad federativa

<i>Entidad federativa</i>	<i>Muy bueno</i>	<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Malo y muy malo</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
Aguascalientes	30.6	52.4	11.5	4.8	0.7	100
Baja California	28.4	56.5	9.0	5.1	1.0	100
Baja California Sur	32.3	51.3	12.0	3.2	1.2	100
Campeche	14.5	67.5	15.3	2.7	0.0	100
Coahuila	25.5	60.8	10.8	1.6	1.3	100
Colima	21.0	63.9	11.9	1.8	1.4	100
Chiapas	8.3	78.0	7.7	3.6	2.4	100
Chihuahua	30.2	59.1	6.6	2.6	1.5	100
Distrito Federal	27.2	53.1	12.0	7.3	0.4	100
Durango	24.0	64.1	6.8	4.5	0.6	100
Guanajuato	24.5	62.6	11.9	0.6	0.4	100
Guerrero	9.5	76.2	8.7	3.2	2.4	100
Hidalgo	17.8	67.9	10.0	3.2	1.1	100
Jalisco	30.2	57.5	9.4	2.4	0.5	100
México	19.6	59.4	15.9	4.7	0.4	100
Michoacán	22.2	58.4	11.6	5.6	2.2	100
Morelos	19.1	59.2	16.4	4.8	0.5	100
Nayarit	22.4	63.4	11.5	1.4	1.3	100
Nuevo León	24.3	57.1	13.5	4.7	0.4	100
Oaxaca	9.1	77.3	11.0	1.3	1.3	100
Puebla	21.3	56.8	10.3	8.4	3.2	100
Querétaro	20.6	59.6	14.9	2.9	2.0	100
Quintana Roo	20.2	59.1	13.8	6.9	0.0	100
San Luis Potosí	23.5	59.4	12.6	2.9	1.6	100
Sinaloa	27.6	60.6	9.3	0.7	1.8	100
Sonora	35.7	52.2	7.9	4.0	0.2	100
Tabasco	13.0	67.2	13.8	5.3	0.7	100
Tamaulipas	23.5	63.1	7.7	5.3	0.4	100
Tlaxcala	21.1	58.2	15.2	2.4	3.1	100
Veracruz	16.0	68.6	11.0	3.3	1.1	100
Yucatán	16.0	68.6	10.8	2.5	2.1	100
Zacatecas	23.1	56.1	17.0	2.8	1.0	100
Estados Unidos Mexicanos	22.8	60.6	11.5	4.1	1.0	100
Frecuencia*	786.4	2 094.5	397.2	143.0	34.0	3 454.9

*Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.3.2

Distribución porcentual de utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según percepción de la calidad de la última atención e institución que proporcionó el servicio

<i>Institución a la que pertenece quien lo atendió</i>	<i>Muy Bueno</i>	<i>Bueno</i>	<i>Regular</i>	<i>Malo y muy malo</i>	<i>No especificado</i>	<i>Total</i>
SSA*	19.7	66.3	9.8	3.4	0.8	100
IMSS Solidaridad	15.5	69.4	11.6	2.3	1.2	100
IMSS	18.5	59.2	14.6	6.3	1.4	100
ISSSTE estatal/ISSSTE	16.5	63.1	10.7	8.4	1.3	100
Otras de seguridad social**	32.7	57.3	8.6	0.0	1.4	100
Privadas	32.8	56.4	9.1	1.4	0.3	100
Otras	25.3	63.0	7.6	2.7	1.4	100
No especificado	32.2	46.0	15.5	2.5	3.8	100
Total	22.8	60.6	11.5	4.1	1.0	100
Frecuencia***	786.4	2 094.5	397.2	143.0	34.0	3 454.9

*Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

**Incluye Pemex, Sedena, Semar

***Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.3.3

Distribución de utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos doce meses que declaró que la última atención fue buena y muy buena, según motivo e institución que proporcionó el servicio

Motivo de buena y muy buena calidad de la atención*	SSA**	IMSS Solidaridad	IMSS	IMSS	ISSSTE estatal/ISSSTE	Otras de seguridad social***	Privadas	Otras	No especificado	Total
Lo trataron bien	64.9	62.6	62.7	61.5	53.6	55.3	70.5	67.6	61.4	
Buenos resultados en salud	29.6	20.7	34.8	34.8	29.6	32.2	34.1	30.4	32.2	
Operación o tratamiento estuvieron bien	28.3	36.8	31.9	29.1	35.0	33.7	28.5	30.1	31.3	
Personal bien preparado	22.0	15.8	19.6	22.6	37.7	27.6	16.3	25.4	22.8	
Medicamento, material y equipo suficiente / limpio	13.4	13.2	13.3	14.1	17.3	18.0	17.8	15.1	14.8	
Personal con experiencia	11.6	13.5	11.7	12.2	13.4	17.8	8.7	9.8	13.2	
Barato	7.2	7.0	4.5	1.0	3.6	2.8	5.0	1.9	4.6	
Otro	2.4	7.6	4.3	7.7	6.7	5.2	20.3	8.5	4.8	
Total	179.3	177.2	182.7	182.9	197.0	192.6	201.1	188.8	185.0	
Frecuencia****	770.0	66.0	962.5	166.3	58.4	757.5	61.9	58.2	2 880.8	

* Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100.0% debido a que se incluyen hasta tres motivos de buena y muy buena calidad de la atención

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Sedena, Semar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.3.4
Distribución de utilizadores de servicios hospitalarios que declaró que la calidad de la última atención fue regular, mala o muy mala según motivo e institución que proporcionó el servicio

Motivo de regular, mala o muy mala calidad de la atención	SSA**	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ISSSTE	Otras de seguridad social***	Privadas	Otras	No especificado	Total
No lo atendieron como esperaba	53.4	61.4	55.2	48.1	59.1	41.3	53.0	49.4	52.1
Lo trataron mal	46.0	45.6	46.1	36.7	29.1	32.0	30.5	42.5	42.6
El material /medicinas o equipo es insuficiente o de mala calidad	16.8	7.8	16.0	25.5	18.8	7.9	0.0	25.6	15.5
Malos resultados en su salud/ no se curó/ no mejoró/ no se alivió	13.8	18.5	10.6	25.7	3.4	10.0	0.0	16.4	12.4
El personal no tiene experiencia	14.9	3.1	12.1	7.2	16.1	10.3	0.0	18.8	11.9
La operación o tratamiento fue malo	9.6	17.2	12.4	15.0	6.0	8.8	0.0	8.9	11.2
Es caro el servicio	11.1	0.0	0.5	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0	6.8
Otro	15.5	21.3	12.6	15.1	9.1	7.5	66.1	20.4	13.7
Total*	181.1	174.9	165.6	173.3	141.6	143.7	149.6	181.9	166.2
Frecuencia****	118.5	10.8	257.9	40.0	5.6	86.7	7.2	13.4	540.1

* Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100.0% debido a que se incluyen hasta tres motivos de regular, mala y muy mala calidad de la atención

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Sedena, Semar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000

Cuadro 11.3.5
Distribución utilizadores de servicios hospitalarios en los últimos doce meses, según motivo por el que no regresaría e institución que proporcionó la atención

Motivo por el que no regresaría*	SSA**	IMSS Solidaridad	IMSS	ISSSTE estatal/ ISSSTE	Otras de seguridad social***	Privadas	Otras	No especificado	Total
Lo trataron mal	47.7	50.4	56.5	38.8	54.8	18.9	29.3	61.2	42.0
Era caro el servicio	19.5	2.9	1.1	0.2	0.0	57.1	24.0	7.3	21.7
No estuvo de acuerdo con el tratamiento	15.2	18.1	16.1	15.7	41.0	6.6	0.0	8.7	12.9
No había medicamentos / materiales	14.4	7.0	14.3	28.1	10.9	1.3	0.0	14.3	11.0
No estuvo de acuerdo con el diagnóstico	15.4	9.3	12.7	1.8	9.3	4.3	0.0	23.1	9.8
No mejoró	5.4	7.0	8.5	4.6	33.7	3.9	0.0	6.6	6.3
Estaba lejos de su casa	9.5	7.0	5.0	3.2	11.8	6.5	0.0	4.4	6.2
No dejaron entrar a su familia	6.3	16.2	7.4	6.3	0.0	0.7	0.0	0.0	5.0
Otros	22.4	24.9	31.5	31.6	13.3	16.7	39.2	21.9	
Total*	155.7	142.7	153.0	130.1	174.6	116.1	92.5	147.5	114.9
Frecuencia****	156.1	12.2	315.4	48.2	8.6	184.6	7.7	13.6	746.3

* Los porcentajes se presentan por columna y suman más del 100% debido a que se incluyen hasta tres motivos por el que no regresaría al mismo hospital

** Incluye SSA, DDF, INI, DIF, Institutos Nacionales y Hospital Civil

*** Incluye Pemex, Sedena, Semar

**** Frecuencia en miles

Fuente: SSA-INSP. Encuesta Nacional de Salud. Cuestionario de utilización de servicios. México, 2000



Glosario de términos



Glosario de términos

Aborto. La expulsión o extracción del producto de la concepción antes del período de viabilidad, establecido en 20 semanas.

Accesibilidad. Es el grado de ajuste entre las características de la población y las de los recursos en el proceso de búsqueda y obtención de la atención a la salud. Existen cuatro formas de accesibilidad:

- Geográfica. Grado de ajuste entre la distribución espacial de la población y la de los recursos, los cuales se deben localizar cerca de donde la población vive.
- Financiera. Grado en que los ingresos de los usuarios potenciales alcanzan para pagar el precio de los servicios, incluyen el precio monetario directo, costo de transporte y el valor del tiempo utilizado en buscar y obtener atención.
- Organizativa. Grado de ajuste entre el tipo de organización y la utilización de servicios, incluye los obstáculos para su uso.
- Cultural. Es la distancia entre los prestadores y los usuarios potenciales en aspectos elementales como el idioma, las creencias sobre salud y enfermedad, etcétera.

Accidente. Suceso desagradable, repentino e inesperado (véase «lesión»).

Alfabeta. Persona de 15 años y más de edad que sabe leer y escribir un recado.

Alfabetismo. Condición que distingue a la población de 15 años y más de edad, según sea alfabeto o analfabeto.

Analfabeto. Persona de 15 años y más de edad que no sabe leer y escribir un recado.

Antecedentes de incapacidad. Causa que incapacita a la persona que padece alguna afección o problema de salud, que le impide realizar algunas o todas las actividades de la vida diaria, como asistir a la escuela, al trabajo o realizar labores domésticas. El antecedente de incapacidad se refiere al último año.

Area geostatística básica (AGEB). Constituye la unidad básica del marco geostatístico, cuyo perímetro está representado generalmente por calles, avenidas, brechas y, en ocasiones, por rasgos físicos naturales y/o culturales, normalmente reconocibles y perdurables en el terreno. Con base en sus características, las AGEB se dividen en urbanas y rurales.

Asma. Enfermedad crónica de las vías respiratorias, caracterizada por episodios repetidos de disnea (dificultad para respirar), los cuales se desencadenan y se exacerbaban por condiciones climáticas (frío, humedad), ambientales (contaminación, humo) y emocionales (ansiedad, estrés). Los accesos pueden ser graves, requiriendo hospitalizaciones frecuentes y tratamiento prolongado con medicamentos. Se observa más frecuentemente en niños en edad escolar, y en la edad adulta.

Atención médica. Servicio médico profesional que proporciona un médico o personal capacitado, y que es ofrecido en instituciones de salud o establecimientos destinados para ello, con el propósito de mejorar el estado de salud de la población o de ofrecer otro tipo de servicios encaminados al bienestar físico y emocional.

ATP III. Tercer Reporte del Panel de Expertos del Programa Nacional de Educación del Colesterol para la Detección, Evaluación y Tratamiento de los Niveles altos de Colesterol en Sangre en Adultos (Panel de Tratamiento en Adultos III) (ATP III, por sus siglas en inglés).

- Calidad de la atención. Grado de mejoría esperada en el nivel de salud, que es atribuible a la atención recibida. Para el análisis de la calidad de la atención se deben considerar tres dimensiones:
- Estructura. Se consideran todos los recursos humanos, materiales y financieros. Por el diseño de la encuesta sólo se consideraron los recursos materiales.

- Proceso. Se considera todo lo que los médicos y otros proveedores de servicios de salud hacen por los pacientes, incluyendo la habilidad con la que llevan a cabo la atención; también se incluyen las acciones que realizan los individuos para sí mismos.
- Resultado. Se toma en cuenta todo aquello que se obtiene para el paciente en términos de un cambio en el estado de salud, ya sea de manera positiva o negativa, y que se pueda atribuir a la atención.
- La encuesta sólo identifica la calidad de la atención desde el punto de vista y criterio de los usuarios de los servicios.

Cáncer. Grupo de enfermedades crónicas graves, frecuentemente fatales, en las cuales un grupo de células anormales prolifera excesivamente. Se caracteriza por pérdida grave de peso, dolores intensos y pérdida del apetito. Requiere tratamiento y hospitalizaciones prolongadas.

Cobertura institucional reportada. Se considera a la utilización de servicios que declara la población en las distintas instituciones, de acuerdo con su condición de aseguramiento.

Cobertura real. Es el número de personas que hacen uso de los servicios de salud, según sus necesidades de atención.

Condición de habla indígena. Situación que distingue a la población de 15 y más años de edad, según declare hablar o no alguna lengua indígena.

Contenido de la atención. Son las acciones que el profesional de salud lleva a cabo durante la atención del paciente. En la encuesta el contenido de la atención se valora desde el enfoque del usuario.

Condición de aseguramiento. Característica que distingue a las personas respecto a su adscripción a instituciones de seguridad social. Este criterio permite clasificar a la población en asegurados y no asegurados.

Condición en el trabajo. Se consideran cuatro categorías:

- Asalariado. Persona no propietaria que trabaja a cambio de un salario, sueldo o jornal en efectivo o en especie. Se incluyen los obreros, empleados, jornaleros o peones de campo y empleados agropecuarios.
- No asalariado. Persona no propietaria cuyo ingreso está formado por el producto de su trabajo, sin que establezca relación salarial con empresas, instituciones o patrones.
- Propietario no empleador. Persona poseedora de medios de producción de alto valor, que los trabaja por cuenta propia, y no emplea mano de obra en forma regular, siendo su propio aporte de fuerza de trabajo el principal. Los campesinos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que tengan como actividad principal el cultivo de su propia tierra se ubican en ésta condición.
- Propietario o empleador. Son personas que poseen medios de producción de alto valor, que trabajan su propio negocio empleando a una persona o más, a cambio de una remuneración en efectivo o en especie.

Cuartos. Son los espacios de la vivienda, cerrados o separados por paredes de cualquier material, como son: dormitorio, sala, comedor, sala-comedor, estancia, estudio, cuarto de servicio y otros cuartos que se destinan para alojar personas. Se incluye la cocina cuando ésta es usada como dormitorio. No se incluye el baño.

Cuarto para cocinar. Cuarto que se dedica para la preparación de los alimentos. Si es utilizado también como dormitorio, se contabiliza como cuarto para dormir.

Cuarto para dormir. Son los espacios de la vivienda, cerrados o separados por paredes de cualquier material, que se usan normalmente como dormitorio. Se incluye cualquier cuarto (sala, comedor, cocina, estancia, cuarto de servicio, etc.), siempre y cuando éste sea utilizado habitualmente para dormir.

Dengue. Enfermedad infecciosa aguda, ocasionada por un virus, la cual se caracteriza por fiebre alta y persistente, dolor y malestar en el cuerpo, disminución del apetito y cansancio. Es transmitida por un mosquito -llamado *Aedes aegypti*- que vive en agua estancada y «pica» de noche. La enfermedad cura en aproximadamente 10 días, aunque existe una variedad «hemorrágica» que puede ser fatal.

Derechohabiente a servicio médico. Persona que tiene la posibilidad de recibir atención médica, como resultado de una prestación laboral, como beneficiario designado por el derechohabiente o como miembro

de una institución (PEMEX, SEDENA, SEMAR, etc.) Se incluye a quienes hayan adquirido un seguro facultativo (voluntario) en el IMSS.

Diabetes. Diagnosticada por la presencia de cualquiera de las siguientes condiciones:

- Diagnóstico previo realizado por un médico, independientemente del nivel de la glucosa en sangre al momento de la entrevista.
- Glucosa capilar de ayuno (sin consumo de alimento en las 8 a 12 horas previas a la toma de muestra de sangre capilar) \approx 126 mg/dl.
- Glucosa capilar en cualquier momento del día \approx 200 mg/dl.

Diarrea. Trastorno gastrointestinal caracterizado por deposiciones líquidas y frecuentes. Según la OMS, debe considerarse como diarrea en prescolares cuando el niño presenta tres o más evacuaciones líquidas en 24 horas.

Drenaje. Es una obra con sistema de tubería subterráneo que permite la eliminación de aguas negras. La tubería puede estar conectada al drenaje de la calle, a la fosa séptica o bien, desaguar directamente al suelo.

Duración de la atención. Es el tiempo que el profesional de la salud dedica a la atención de su paciente. En la encuesta se estimó de acuerdo con los tiempos que percibieron y reportaron los usuarios.

Edad. Número de años cumplidos o vividos por la persona, desde la fecha de su nacimiento hasta el momento de la entrevista.

Empleado. Persona que desempeña una labor predominantemente no manual a las órdenes de un empleador público o privado, y que no participa de manera directa en la producción de mercancías.

Enfermedades exantemáticas. Son enfermedades infecciosas que se observan más frecuentemente en la niñez y se caracterizan por producir «ronchas» o «manchas» en la piel, las cuales son pasajeras (exantema) y desaparecen junto con la enfermedad en un lapso de 15 días aproximadamente. Se acompañan de fiebre, disminución del apetito, malestar general e incluso pérdida observable de peso, sobre todo en niños. Entre ellas se encuentran: varicela, sarampión, rubeola, escarlatina, etcétera.

Entidad federativa. Unidad geográfica mayor en la división político-administrativa del país. El territorio nacional se divide en 31 estados y un Distrito Federal.

Estado conyugal. Es la situación de las personas al momento de la encuesta, con relación a las leyes y costumbres de unión o matrimonio del país:

- Unión libre. Es la persona que se unió con otra sin haber contraído un matrimonio civil o religioso.
- Casado. Es la persona que ha contraído matrimonio, ya sea conforme a la ley, de acuerdo con una institución religiosa o de acuerdo con ambas, y que vive actualmente con su cónyuge.
- Viudo(a). Es la persona que ha perdido a su esposa(o) o compañera(o) por fallecimiento, y no se ha vuelto a casar, ni a unir libremente.
- Divorciado(a). Es la persona que habiendo estado casada por lo civil, se separó de su cónyuge mediante una sentencia de divorcio dictada por la autoridad competente, y no se ha vuelto a casar ni a unir libremente.
- Separado(a). Es la persona que vive sin esposa(o) después de haber estado casado(a), sin existir una sentencia de divorcio dictada por la autoridad competente o quienes, habiendo estado unidos libremente o casados sólo por lo religioso, se encuentran separados.
- Soltero(a). Es la persona que nunca ha contraído matrimonio o nunca ha estado unido libremente.

Estado de salud percibido. Es la condición de salud que declara por sí mismo el individuo o el responsable del hogar.

Factores de riesgo. Es el conjunto de fenómenos de los cuales depende la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad.

Factores habilitadores. Elementos que inciden en el poder de utilización de servicios de salud en la población. De acuerdo con los objetivos de la encuesta se consideran el ingreso y la condición de aseguramiento.

- Factores predisponentes.** Son las características de la población que inciden en la propensión de la utilización de servicios de salud. Entre ellos encontramos la edad, el sexo, etcétera.
- Fiebre.** Aumento de la temperatura corporal por arriba de 38°C. Por lo general es un signo de infección aguda y se acompaña de cefalea (dolor de cabeza) y malestar general. En los niños se observa hipertemia (piel caliente), enrojecimiento del cuerpo acompañado de una sensación anormal de frío y sudoración).
- Fosa séptica.** Es el tipo de construcción que, conectada a otra fosa por drenajes o conductos rudimentarios, permite la eliminación de las aguas negras.
- Fumador.** Aquella persona que reporta haber fumado más de 100 cigarros en su vida.
- Hepatitis.** Infección del hígado ocasionada por el virus de la hepatitis. Es una enfermedad contagiosa, caracterizada por un comienzo insidioso con fiebre y malestar, pérdida del apetito, dolor abdominal y náuseas. Posteriormente, aparece una coloración anormal en la orina y las heces e ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosas), la cual puede durar semanas. Suele transmitirse por mala higiene del agua y de los alimentos; cura gradualmente en un mes, aproximadamente.
- Hipertensión.** Diagnosticada por la presencia de cualquiera de las siguientes condiciones:
- Diagnóstico previo realizado por un médico, independientemente del nivel de la tensión arterial al momento de la entrevista.
 - Presión arterial tomada en dos ocasiones: sistólica, mayor a 160 mmHg y/o diastólica mayor o igual a 90 mmHg.
- Hogar.** Unidad doméstica formada por una o más personas unidas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación, es decir que comparten un mismo gasto para la comida.
- Hipercolesterolemia.** De acuerdo a la ATP III niveles de colesterol total en sangre superiores a los deseables (<200mg/dl).
- Informante adecuado.** El jefe o jefa del hogar, su cónyuge o una persona residente habitual de la vivienda que conoce la información de todos los residentes y tiene 15 años o más de edad.
- Ingreso.** Son las percepciones monetarias o en especie obtenidas por diversas fuentes: salario, sueldo o jornal, intereses por inversiones bancarias o por préstamos en dinero a terceros, ganancias, dividendos, renta por alquiler de inmuebles o maquinaria, honorarios por trabajo profesional, jubilación, pensión u otras.
- Ingresos por trabajo.** Percepción total monetaria (dinero) que obtiene la persona ocupada por su(s) trabajo(s) o el desempeño de una actividad económica.
- Intervención quirúrgica.** Cualquier procedimiento médico en el que se utilicen técnica, procedimientos e instrumentos propios de la cirugía (operación).
- IRA.** Acrónimo de infección respiratoria aguda. Cualquier afección de las vías respiratorias que por lo general se acompaña de rinorrea (secreción nasal), a veces de fiebre y malestar general, en ocasiones de dolor inflamación de la garganta (ver anginas) u oídos, cuando es de vías respiratorias altas. Por lo general, dichas infecciones son de origen viral y muy contagiosas. Comúnmente se les conoce como «catarro» o «gripa». Si la infección es de vías respiratorias bajas (bronquitis o neumonía) suele ser ocasionada por bacterias, es más severa, se acompaña de fiebre y tos -la cual es productiva, con esputo verdoso y muy persistente-, puede haber dolor torácico y en ocasiones dificultad para respirar. En niños pequeños -y a veces en adultos- si no recibe tratamiento a tiempo puede llegar a ser fatal.
- Jefe del hogar.** Es la persona miembro del hogar que es reconocida por los demás integrantes del mismo como la cabeza del hogar, por ser el principal sostén económico por su edad o por alguna otra característica.
- Lesión.** Daño físico u orgánico, ocasionado por un accidente o hecho de violencia. Aunque frecuentemente se confunden los términos, el «accidente» es la causa de la «lesión»; por ejemplo: el accidente puede ser el caer de una escalera, la lesión puede ser una fractura (rotura de un hueso) en la pierna. Entre las lesiones

por accidentes más frecuentes se encuentran: contusiones (golpes), hematomas (moretones), escoriaciones (raspaduras, peladas), heridas (cortaduras), fracturas, quemaduras, etcétera.

Lengua indígena. Conjunto de idiomas que históricamente son herencia de diversas etnias del continente americano y que se hablan en nuestro país.

Letrina. Excavación en el suelo de aproximadamente uno a dos metros de profundidad, construida para la eliminación de los desechos humanos; se encuentra fuera de la vivienda y retirada de las tomas o pozos de agua para beber. Puede ser cubierta con una tapa, ya sea de madera o cemento.

Leucemia. Un tipo de cáncer en la sangre en la cual existe una proliferación excesiva de leucocitos (glóbulos blancos) anormales. Es una enfermedad grave, requiere tratamiento prolongado y hospitalizaciones frecuentes. Dependiendo del tipo de leucemia y de la edad del paciente puede ser fatal.

Localidad. Todo lugar ocupado con una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre. Las localidades urbanas son aquellas con una población de 15 000 o más habitantes, y las localidades rurales aquellas con menos de 15 000 habitantes.

Manzana. Grupo de viviendas y/o edificios, predios, lotes o terrenos destinados a uso habitacional, comercial, industrial, entre otros. Están delimitadas por calles, andadores o vías peatonales y, en las periferias, por brechas, veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas o predios y otros rasgos que definen su superficie.

Miembros del hogar. Son las personas que habitan normalmente en la vivienda y comparten un mismo gasto para comer.

Morbilidad. Es el número de personas que enferman en una población y un tiempo determinado. Enfermedad.

Morbilidad aguda o reportada. Son enfermedades o padecimientos reportados en los últimos 15 días. Por el diseño de la encuesta, la información se obtuvo preguntando a la persona responsable del hogar o a un informante mayor de 15 años de edad sobre la morbilidad de cada uno de los integrantes del hogar.

Morbilidad crónica. Enfermedades o padecimientos con más de 15 días de duración. Por lo general son padecimientos que duran meses o años e incluso toda la vida.

Mosaico. Es una superficie rellena de piedras o vidrios generalmente de varios colores, que sirve como recubrimiento de pisos y paredes.

Motivo de atención. Causa por la cual una persona solicita atención en los servicios de salud. En la encuesta únicamente se indagó sobre la utilización de servicios de salud en los 15 días previos al levantamiento.

Municipio o delegación. División territorial político-administrativa de una entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, las 16 delegaciones son equivalentes a los municipios.

Nacido muerto. Es el producto de la gestación obtenido por parto o cesárea, a partir de los seis meses de embarazo, que al momento de nacer no muestra signo de vida (respirar, llorar, movilidad, latidos del corazón, pulsación del cordón umbilical).

Nacido vivo. Es el producto de la gestación obtenido por parto o cesárea, a partir de los seis meses de embarazo que al nacer muestra signos de vida (llorar, respirar, movilidad, latidos del corazón)

Necesidad de atención. Es la búsqueda de servicios de salud ante una situación de molestia, enfermedad o de carácter preventivo.

Necesidades de salud. Subconjunto de condiciones de salud y enfermedad que socialmente se ha determinado que requieren de una respuesta en forma de atención. Cualquier proceso vital (nacimiento, crecimiento, desarrollo, etcétera) se considera como una condición de salud.

Negocio, establecimiento o empresa. Es el elemento del que se surte un particular para participar en el proceso económico, ya sea de actividades de producción, comercialización, almacenamiento, servicio de diversa índole, etcétera.

Nivel de instrucción. Se define como el año (grado) de estudios más alto alcanzado (terminado o aprobado) por una persona, dentro de algunos de los niveles del Sistema Educativo Nacional (o equivalente) que son: nivel básico (prescolar y primaria), nivel medio básico (secundaria, carreras técnicas o comerciales, con

antecedentes de primaria), nivel medio superior (preparatoria, bachillerato, normal básico y carreras técnicas o comerciales, con antecedentes de secundaria); nivel superior (licenciatura, ingeniería, carreras técnicas, con antecedentes de preparatoria y posgrado).

Obrero. Es la persona que desempeña una labor predominantemente manual al servicio de un patrón o empresa (pública o privada) y que realiza tareas directamente productivas (relacionadas con la producción de mercancías).

Obesidad. Definida por un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kg/m².

Obesidad abdominal. Circunferencia de cintura mayor de 102 cm en hombres, y de 88 cm en mujeres.

Ocupación (oficio o profesión). Es la actividad productiva de una persona o grupo de ellas.

Parentesco. Lazo o vínculo, sea de consanguinidad o afinidad (derivado de un matrimonio o unión), que tiene cada miembro del hogar con el jefe de éste.

Partera o comadrona. Persona que ha adquirido la habilidad de diagnosticar, curar o controlar la salud o ciertas enfermedades, sin elementos científicos. Principalmente se dedican al cuidado de las mujeres embarazadas y de los niños, aunque también pueden revisar otros aspectos, entre los que está proporcionar anticonceptivos.

Patrón o empresario. Es la persona que durante el período de referencia dirigió sólo o asociado, un establecimiento a su cargo, y en el cual empleó a una o más personas por un sueldo, salario u otro tipo de pago.

Piso. Elemento de construcción o material predominante, que cubre o tiene la mayor parte de la superficie de los cuartos de la vivienda

Población abierta. Conjunto de personas que no son derechohabientes en alguna de las instituciones públicas o privadas de salud (IMSS, ISSSTE, etc.) y que son responsabilidad de la Secretaría de Salud.

Predio. Es la hacienda, tierra o posesión inmueble dedicada generalmente a uso agrícola, pecuario o forestal.

Propietario de tierra. Para clasificar a una persona como propietario es necesario que tenga el derecho sobre el uso y usufructo de la tierra, es decir, que tenga la posesión legal de ésta, y disponga de ella en el momento que desee, aun en el caso que esté pagándola en abonos.

Profesional independiente. Es la persona que, teniendo un título profesional, ejerce su profesión sin depender de ninguna institución o centro de trabajo.

Rama de actividad. Se clasifican como:

- Agricultura. Lo relacionado con el cultivo de la tierra y productos agrícolas.
- Ganadería. Cría de animales. Incluye especies menores y mayores.
- Silvicultura. Explotación de recursos forestales (selvas y bosques).
- Pesca. Explotación de recursos del mar.
- Artesanías. Producción doméstica de bienes de consumo directo u ornato, mediante herramientas simples.
- Manufactura. Comprende todas las actividades de transformación de materias primas.
- Comercio. Puede ser formal, y se refiere a la venta de bienes en local establecido, con existencia de activos mercantiles de alto valor; o informal, que es la venta en forma ambulante de bienes de escaso valor.
- Servicios. Incluye toda actividad del sector terciario de la economía con excepción del comercio.
- Construcción. Se incluyen obras de albañilería e instalaciones de inmuebles, como las sanitarias, hidráulicas, telefónicas, eléctricas y de gas, entre otras.
- Otras. Si considera que la ocupación no es ubicable en alguna de las ramas estipuladas, anotar esta clave.

Percepción del estado de salud. Es la forma como la persona define su estado de salud en el momento de la entrevista.

Período de referencia. Es el lapso en el que se le pide al individuo entrevistado recordar algún evento. En la encuesta, este período fue de dos semanas, para la utilización de servicios ambulatorios y de un año previo, para los servicios hospitalarios.

Remedio casero. Son los recursos a los que acude una persona para aliviar su molestia o enfermedad, sin que intervengan medicinas de patente.

Residentes habituales del hogar. Son las personas, miembros del hogar, que habitualmente duermen en la vivienda, se encuentran o no residiendo en el hogar al momento de la encuesta.

Residentes habituales del hogar temporalmente ausentes. Son las personas, miembros del hogar, que habitualmente duermen en la vivienda pero que al momento de la encuesta se encuentran ausentes del hogar, por un período no mayor de seis meses, ya sea por vacaciones, enfermedad, trabajo o algún otro motivo, cualquiera que sea su edad. Estos se consideran parte del hogar.

Residentes del hogar temporalmente presentes (visitantes). Son las personas que al momento de la encuesta se encuentran presentes en el hogar, por un periodo no mayor de seis meses, y declaran tener o estar buscando otro lugar de residencia.

Salario, sueldo o jornal. Es la remuneración en dinero, que se paga a una persona como precio del trabajo realizado, y que implica una relación laboral.

- Honorarios. Es el pago que se efectúa al prestador de servicios técnicos o profesionales que trabaja en forma independiente.

- Pago en especie. Representa un ingreso de los trabajadores y propietarios por su participación en el proceso productivo, que no es recibido como ingreso monetario, sino como la entrega de mercancías o la prestación de servicios.

Salario mínimo. Pago o remuneración (mensual) en dinero con que se retribuye a los trabajadores por su ocupación o trabajo.

Servicios de salud. Conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de proteger y conservar la salud de la población, independiente del tipo de servicios médicos que se proporcione; esto es tanto, a nivel de atención a enfermedades, como en lo referente a la presentación de servicios encaminados al bienestar físico y emocional de la población, tales como tratamientos dentales, cirugía estética, atención psicológica, etcétera.

Sexo. Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

Servicio médicos de seguridad social. Son servicios médicos que brindan instituciones de seguridad social como:

- IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
- ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
- PEMEX Petróleos Mexicanos
- SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
- SEMAR Secretaría de Marina Nacional

Servicios médicos pagados por la empresa. Son servicios médicos privados que paga la empresa, como por ejemplo, los empleados de los bancos pueden atenderse con médicos privados y los gastos los cubre la empresa donde trabaja.

Seguro privado de gastos médicos. Es el contrato por el cual una persona o sociedad (asegurador) se compromete a indemnizar a otra (asegurado) por los gastos médicos derivados de la utilización de servicios médicos, por atención de una enfermedad.

Servicios de salud curativos. Son aquellos que se utilizan en presencia de una enfermedad, síntoma o molestia.

Servicios de salud tradicionales. Servicios que están firmemente arraigados en la cultura local y por consiguiente tienen la aceptación y el apoyo de la comunidad. Reciben diferentes nombres según la cultura y el tipo de arte curativo que llevan a cabo: comadronas, curanderos, brujos, yerberos, rezadores, hueseros, sobadores, adivinos, etcétera.

Servicios de salud preventivos. Son los servicios de salud que se brindan con el fin de evitar la presencia de enfermedades: por ejemplo, los servicios de vacunación, atención prenatal, atención al niño sano, atención dental preventiva, detección oportuna del cáncer, etcétera.

Síndrome metabólico. De acuerdo con la OMS es la presencia de diabetes o intolerancia a la glucosa y/o resistencia a la insulina, y al menos dos de los siguientes factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia y microalbuminuria (Alberti y Zimmet, 1998).

Sobrepeso. Definido por un índice de masa corporal entre 25 y 29.9 kg/m².

Trabajo o empleo principal. Es aquel al que la persona ocupada durante el período de referencia, dedicó el mayor número de horas trabajadas o derivó la mayor parte o la totalidad de sus ingresos.

Trabajador familiar. Es la persona que trabaja en un rancho, taller, negocio u otro tipo de establecimiento dirigido por (o propiedad de) algún miembro de su familia o alguna persona con la cual tenga un parentesco cercano.

Trabajador por cuenta propia. Es la persona que durante el período de referencia trabajó sola o asociada en su propio negocio o establecimiento, o ejerció alguna profesión u oficio, sin recibir sueldo o salario de un patrón, empresa o institución, y sin emplear a persona alguna mediante remuneración, aun cuando pudo haber empleado a trabajadores familiares y/o aprendices, sin dar ningún pago a cambio.

Trabajo remunerado. Se le llama así a las tareas o actividades de carácter económico que realiza un individuo a cambio de recibir un pago en dinero o en especie, ya sea en forma de salario, sueldo o jornal, comisión, propinas, pago a destajo, honorarios, etcétera.

Trabajo no remunerado. Se refiere a las tareas o actividades de carácter económico que realiza un individuo, sin recibir pago alguno por ellas.

Utilización general. Uso de los servicios de salud que hizo la población en los 15 días previos al levantamiento de la información.

Vivienda. Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, donde viven una o más personas, duermen, preparan sus alimentos, comen y se protegen del medio ambiente. Además, la entrada a la vivienda debe ser independiente, es decir, que sus ocupantes puedan entrar o salir de ella sin pasar por el interior de los cuartos de otra vivienda.

- Vivienda particular. Esta destinada al alojamiento de una o más familias, grupos de personas o una sola persona, y puede estar ocupada en el momento de realizar la encuesta. Entre las viviendas particulares, destacan:

- Vivienda de construcción fija. Es aquella que fue construida para habitarse permanentemente como casa sola (unifamiliares), departamento, cuarto o cuartos y construcciones adaptadas con propósito de alojamiento, tales como el (los) cuarto(s) donde vive el prefecto de una escuela, o donde vive el párroco de una iglesia, etcétera.

- Vivienda móvil. Son los vagones de ferrocarril, trailers, remolques, barcos, carpas o tiendas de campaña que no se usan únicamente como transporte transitoriamente, para vacaciones.

- Refugio natural. Es toda vivienda que se improvisa en cuevas, puentes, tubos de drenaje y similares y se encuentra habitada en el momento de realizar la encuesta.

- Vivienda colectiva. Vivienda destinada a servir como alojamiento habitual a personas sujetas a una subordinación de carácter administrativo y obligadas a cumplir normas de convivencia, en virtud de estar relacionadas por un objetivo público o algún interés personal común, tales como razones de salud, disciplina, orden, enseñanza, religión, trabajo, alojamiento o asistencia social.

Las viviendas colectivas se clasifican en:

- Hotel, motel, albergue, posada, mesón.

- Pensión, casa de huéspedes, casa de asistencia.

- Hospital, sanatorio, clínica, casa de salud.
- Orfanatorio, hospicio, asilo, casa-cuna, casa hogar.
- Internado escolar, residencia estudiantil.
- Convento, monasterio, seminario, congregación religiosa.
- Cárcel, prisión, reclusorio, reformatorio, consejo-tutelar.
- Centro de rehabilitación para infractores, correccional, penitenciaria, colonia penal. Campamento de trabajo, barraca de trabajadores, plataforma petrolera.
- Cuartel, campamento, guarnición, base, destacamento de policía, militar o naval.
- Otro (campamento de refugiados o damnificados, burdel, prostíbulo y dormitorio público).

Vivienda con agua entubada. Es la vivienda que dispone de agua a través de un sistema entubado, conectado a tomas de agua de redes públicas de abastecimiento o de otras fuentes. Pueden darse las siguientes situaciones: las viviendas que disponen de agua entubada dentro de las mismas y las que disponen de agua entubada fuera de ellas, pero dentro de los edificios o predios donde se encuentran ubicadas.

Vivienda con drenaje. Es la vivienda que cuenta con un sistema higiénico para la eliminación principalmente de residuos humanos, el cual, si es colectivo, se encuentra conectado al alcantarillado de la comunidad por tubería o zanja.

Vómito. Expulsión brusca y súbita del contenido gástrico por la boca.

Encuesta Nacional de Salud 2000

I. Vivienda, población y utilización de servicios de salud

Se terminó de imprimir en los talleres de
Sistemas Editoriales y Administrativos,
bajo la supervisión de la Subdirección de
Comunicación Científica y Publicaciones del
Instituto Nacional de Salud Pública.
El tiraje consta de 2 000 ejemplares.

